


# “FACTORES DE RIESGO DETERMINANTES DEL ABORTO ESPONTÁNEO EN MUJERES DEL SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL 2022”

## INTRODUCCION

El aborto espontáneo es la muerte de un embrión o feto antes de la semana 20 de embarazo y es uno de los graves problemas de mortalidad materna en los países subdesarrollados, el principal objetivo de esta investigación fue determinar los factores de riesgo del aborto espontáneo en mujeres atendidas en el servicio de gineco- obstetricia del Hospital San Vicente de Paúl. Se realizó un estudio cuantitativo, no experimental y de corte transversal en una muestra de 55 mujeres que sufrieron aborto espontáneo y acudieron al Hospital San Vicente de Paúl. Para ello, se elaboró una ficha de recolección de datos, en base a los datos de las historias clínicas proporcionadas por el hospital.



**Autora:** Erika Gisela Hernández Padilla

**Directora:** Msc. Gladys Edelмира Morejón

## MÉTODO

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental debido a que se basa en estudiar u observar acontecimientos naturales, en este caso los factores de riesgo que determinan el aborto espontáneo, y de corte transversal.

## OBJETIVO

Determinar las causas y los factores de riesgo del aborto espontáneo en mujeres atendidas en el servicio de gineco-obstetricia del Hospital San Vicente de Paúl

## RESULTADOS

### Características sociodemográficas

NIEL DE INSTRUCCIÓN	Secundaria	45.70%
	Tercer Nivel	27.30%
ETNIA	Mestizo	75.90%
	Afro ecuatoriana	11.00%
EDAD	21-25	32.20%
	26-30	21.60%

### Factores de riesgo

Complicaciones maternas	Amenaza de aborto	13.1%
	Depresión	10.6%
Hábitos psicobiológicos	Mala alimentación	17.6%
	Tabaquismo	6.9%
Frecuencia de paridad	Primigesta	66.5%
Antecedentes patológicos personales	Hipertensión arterial	29.8%
	Diabetes mellitus tipo II	1.6%
Antecedentes patológicos familiares	Diabetes mellitus tipo II	16.3%
	Obesidad	12.7%

### Causas del aborto

Causas ginecológicas	Pielonefritis	4.90%
	Vaginitis	3.30%
	Infección vías urinarias	23.30%
	Síndrome ovario poli quístico	6.10%
Causas obstétricas	Embarazo anembrionado	6.90%
	Embarazo molar	5.30%
	Incompetencia cervical	6.50%
	Embarazo ectópico	27.80%
	Partos prematuros	4.10%

## CONCLUSIÓN

En base a los resultados podemos referir que existen causas y factores en común entre las mujeres con aborto espontáneo, que de ser tomados a consideración a su debido tiempo podrían ser controlables evitando así complicaciones durante el embarazo, además se considera importante socializar la información obtenida en esta investigación y concientizar a las gestantes para mermar la incidencia del aborto espontáneo entre la población.

## DISCUSIÓN

En un estudio realizado en Maranhão 2021 se obtuvo que las principales causas de aborto espontáneo, son de etiología bastante heterogénea, y muchas veces no se identifican las causas., datos que se asemejan a los de nuestro estudio ya que los mayores porcentajes no tenían factores de riesgo sin embargo cabe recalcar que entre las mujeres jóvenes con instrucción secundaria, la hipertensión arterial y las primigestas sobresalen con respecto a los demás factores

## BIBLIOGRAFÍA

- Clinic M. Aborto espontáneo - Diagnóstico y tratamiento [Internet]. 2020 [cited 2022 Jul 18]. Available from: <https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/pregnancy-loss-miscarriage/diagnosis-treatment/drc-20354304>
- Córdoba A, Niño I. Factores de riesgo obstetrico, clínico y puerperio en el embarazo en mujeres ed edad fértil. Univ Coop Colomb 2021:1-9