

7. RECOMENDACIONES

La levadura, pese al no observar resultados de incidencia estadística en mejorar los parámetros productivos en los cuyes; se logró obtener buenos resultados en el incremento de pesos, especialmente en los machos alcanzando pesos de animales vivos entre 961 gramos y 1110 gramos logrados en la investigación en el tiempo establecido de 70 días. Por tal razón se recomienda manejar un sistema de alimentación similar al que se realizó en este ensayo y reducir el periodo de permanencia en las jaulas que muchas veces están hasta los 4 meses, produciendo pérdidas económicas al productor.

La levadura puede estar sujeta en función del tiempo de consumo, esto se observaría principalmente en los animales de reproducción; por cuanto se recomienda realizar investigaciones en este tipo de animales y comprobar la incidencia del producto en mejorar los parámetros productivos en los cuyes.

Los parámetros técnicos de mortalidad manejados en explotaciones, indican hasta un 15% entre la fase de recría y engorde, pero en la investigación se manejó con porcentaje del 6,11% que técnicamente no afecta la productividad de la explotación. Razón por lo que es recomendable aplicar los parámetros de bioseguridad y control preventivo de parásitos y enfermedades de la misma forma como se realizó en este trabajo.

Para determinar la incidencia o verificar los resultados obtenidos en esta investigación, en recomendable efectuar estudios similares.

Se recomienda utilizar mezclas forrajeras para mejorar la palatabilidad y cubrir los requerimientos nutricionales de las diferentes etapas de producción de cuyes.