

6. RECOMENDACIONES

- Para la propagación de patrones de rosa se recomienda la utilización del estimulante Raiza a una dosis de 1,5cc/l., con el sustrato compuesto de tierra negra más pomina.
- Realizar la desinfección de las estacas con un fungicida sistémico, para disminuir la presencia de enfermedades, que puedan causar la muerte de las estacas.
- Investigar sobre el enraizamiento de porta injertos con mayor tiempo de inmersión con los estimulantes utilizados.
- Realizar investigaciones con sustratos similares o que contengan mayor porosidad en su estructura ya que se podría obtener mayor desarrollo radicular.
- Probar el estimulante Raiza a mayores dosis ya que utilizando la dosis alta no bajo su rendimiento y mantiene un crecimiento progresivo en el desarrollo radicular.
- Desarrollar una investigación con productos a base citoquininas con una concentración mayor a la del producto More que es de 0.009%, debido a que las citoquininas ayudan a la formación de raíces.
- Para próximas investigaciones buscar nuevas alternativas de sustratos que tengan mayor cantidad de poros al en relación al sustrato 1 (tierra negra mas casajo).

- Se recomienda dar seguimiento a las estacas en el lugar definitivo para observar si la cantidad de raíces tienen influencia en el prendimiento de los injertos y la formación de las plantas.
- Para disminuir el costo de producción se recomienda buscar estacas con menor precio ya que este rubro equivale al 83% del valor de la estaca enraizada y así se podría mejorar las ganancias para los productores.