





PROBABILIDADES Y ESTADÍSTICA EMPLEANDO LAS TIC

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	E	n(E)		P(E)							
2	a	10									
3	b	15									
4	c	20	=B6-B2-B3-B5								
5	d	5									
6	S	50									
7	A	30	=B2+B4	3/5	=B7/B6						
8	B	35	=B3+B4	7/10	=B6/B6						
9											
10	B/A	20	=B4	2/3	=B10/B7						
11	A/B	20	=B4	2/5	=B11/B6						
12				2/5	=D7*D10	$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B/A)$					
13											
14	A/B	20	=B4	4/7	=B14/B8						
15	B/A	20	=B4	2/5	=B15/B6						
16				2/5	=D8*D14	$P(B \cap A) = P(B) \cdot P(A/B)$					



Autor:
Mario O. Suárez I.

PROBABILIDADES Y ESTADÍSTICA EMPLEANDO LAS TIC

	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	n(E)		P(E)						
2	6								
3	2	=B10-B6							
4	10								
5	8	=B12-B6							
6	4		2/25	=B6/B13					
7	6	=B11-B6							
8	4	=B13-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B9							
9	10								
10	6		3/25	=B10/SBS13					
11	10		1/5	=B11/SBS13					
12	12		6/25	=B12/SBS13					
13	50								
14	20	=B2+B3+B5+B6		2/5	=B14/SBS13				
15	22	=B3+B4+B6+B7		11/25	=B15/SBS13				
16	22	=B5+B6+B7+B8		11/25	=B16/SBS13				
17	40	=B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8		4/5	=B17/SBS13				
18				4/5	=D14+D15+D16-D10-D11-D12+D6				
19					P(AUBUC) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A∩B) - P(B∩C) - P(A∩C) + P(A∩B∩C)				

Distribución Estadísticas

Test ChiCuadrado

Filas 2 Columnas 3

Fila % Columna % Frecuencia esperada Contribución X²

65	68	62
35	32	38
100	100	62

Resultado

Test ChiCuadrado

gib 2

X² 0.7912

P 0.6733

15/03/2017 23:26:07

Gráfica C de C1

Resultados de la prueba para la gráfica C de C1

TENDENCIA: El punto fuerte más allá de 3,00 desviaciones estándar de la línea central. Se genera fallos en los puntos: 3, 7, 9.

ADVERTENCIA: Si se actualiza la gráfica con los nuevos datos, los

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
1	3								
2	4								
3	3								
4	5								
5	16								
6	1								
7	6								
8	9								
9	9								

AUTOR:
Mgs. Mario Orlando Suárez Ibujés

IBARRA-ECUADOR
2018

AUTOR

Mgs. Mario Orlando Suárez Ibijés

Asesor Educativo en la Coordinación Zonal 1- Educación

Profesor en la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Técnica del Norte

Correo electrónico: mariosuarezibujes@gmail.com ; mosuarez@utn.edu.ec

Teléfono: 0985619601, 062632166

PARES REVISORES

MSc. Ricardo Wenceslao Carrera Jiménez

Docente en la Universidad Católica del Ecuador, Sede Ibarra

Correo electrónico: ricardowmat@gmail.com

Teléfono: 0983462827, 062601230

Mgs. Stalin Marcelo Arciniegas Aguirre

Docente en la Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra

Correo electrónico: smarciniegas@pucesi.edu.ec

Teléfono: 0980405985, 062615500

DERECHOS RESERVADOS DEL AUTOR:

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI)

Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos

Derecho de Autor N° 044207

ISBN 1ra Edición 978-9942-20-184-3

ISBN 2da Edición 978-9942-35-254-5

ISBN: 978-9942-35-254-5



Impreso de portada y encuadernado: Imprenta GRAFICOLOR

Segunda Edición

Esta obra no puede ser reproducida total ni parcialmente por ningún medio sin expreso consentimiento previo y por escrito del autor.

DEDICATORIA

Con amor infinito en expansión para
mi esposa Dyana Rivera, el amor de mi vida y de todas mis vidas,
para mis hijos Emily Monserrath y Mathías Josué, la continuación de mi existencia,
por ser mi fuente de inspiración y mi más anhelado sueño hecho realidad.
Y para mis padres Bertha Ibujés y Segundo Suárez, por su ejemplo de lucha constante.

AGRADECIMIENTO

Mi gratitud y reconocimiento a las autoridades de la Universidad Técnica del Norte y a las autoridades de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas por el incondicional apoyo brindado. Y a los docentes pares revisores por sus valiosas sugerencias de mejora

CONTENIDOS

	Página
CONTRAPORTADA	<i>i</i>
DEDICATORIA	<i>iii</i>
AGRADECIMIENTO	<i>iv</i>
CONTENIDOS	<i>v</i>
PRESENTACIÓN	<i>vii</i>
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA	<i>viii</i>
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN A LA PROBABILIDAD	9
1.1 Análisis Combinatorio	10
A Factorial	
B Permutaciones	12
C Combinaciones	14
1.2 Conceptos básicos	17
A Experimento	
B Experimento aleatorio	
C Espacio muestral	
D Punto muestral	
E Evento o Suceso	
i Evento cierto	
ii Evento imposible	
iii Evento probable	
F Probabilidad	
i Empírica	
ii Teórica	19
G Posibilidades	29
1.3 Reglas de la probabilidad	34
A Teoría de Conjuntos	
B Regla de la adición de probabilidades	39
i Regla general para eventos no mutuamente excluyentes	
ii Regla particular o especial para eventos mutuamente excluyentes	46
C Regla de la multiplicación de probabilidades	55
i Regla general para eventos dependientes	
ii Regla particular o especial para eventos independientes	67
1.4 Probabilidad total y teorema de Bayes	72
A Probabilidad total	
B Teorema de Bayes	
CAPÍTULO II: DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD	76
2.1 Distribuciones Discretas	77
A Introducción	
B La media y la varianza de las distribuciones discretas	78
C Distribución Binomial	81
D Distribución de Poisson	104
E Distribución Hipergeométrica	110
2.2 Distribuciones Continuas	113
A Introducción	
B Distribución Exponencial	
C Distribución Uniforme	116
D Distribución Normal	122

CAPÍTULO III: ESTIMACIÓN DE INTERVALOS DE CONFIANZA	140
3.1 Estimación del intervalo de confianza para la media (σ conocida)	142
3.2 Estimación del intervalo de confianza para la media (σ desconocida).- Distribución t de Student	146
3.3 Estimación del intervalo de confianza para una proporción	159
3.4 Determinación del tamaño de la muestra	163
A Determinación del tamaño de la muestra para la media	
B Determinación del tamaño de la muestra para la proporción	165
 CAPÍTULO IV: PRUEBA DE HIPÓTESIS	168
4.1 Prueba de Hipótesis para medias	169
A Prueba medias de una muestra	171
B Prueba medias de dos muestras	179
4.2 Análisis de Varianza	183
A Estimación interna de varianza	184
B Estimación intermediente de varianza	
C La razón F de Fisher	185
4.3 Prueba de Hipótesis para proporciones	194
A Prueba de proporciones de una muestra	195
B Prueba de proporciones de dos muestras	198
C Prueba de proporciones de k muestras.- Ji Cuadrado	201
D Bondad de ajuste de la prueba Ji Cuadrado	215
 CAPÍTULO V: APLICACIONES DE GRÁFICAS ESTADÍSTICAS EN EL CONTROL DE LA CALIDAD	219
5.1 Introducción	
5.2 Gráficas de control para variables	
A La gráfica R	
B La gráfica \bar{X}	
5.3 Gráficas de control para atributos	227
A La gráfica p	
B La gráfica c	232
 SOLUCIONARIO DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA	235
 FORMULARIO SOBRE CONOCIMIENTOS ESTADÍSTICOS PREVIOS	249
 TABLAS DE DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD	285
Nº 1 Distribución Binomial	
Nº 2 Distribución de Poisson	289
Nº 3 Distribución Normal	292
Nº 4 Distribución t de Student	293
Nº 5 Distribución de Fisher	294
Nº 6 Distribución χ^2	296
 BIBLIOGRAFÍA	297
 DATOS BIOGRÁFICOS DEL AUTOR	299

PRESENTACIÓN

La Estadística en la antigüedad era empleada en asuntos del Estado tales como en los censos de población o bienes, organizados por el poder político con fines militares o fiscales. La Estadística en la actualidad es utilizada en todos los campos de saber humano, así por ejemplo, en los juegos de azar se emplea conocimientos de las probabilidades estadísticas, los investigadores utilizan conocimientos estadísticos para probar hipótesis, los gerentes de las empresas usan gráficos estadísticos para el control de la calidad de los servicios y productos que la empresa oferta, etc.

El objetivo del presente libro es incursionar a los lectores en la resolución de ejercicios y problemas de aplicación de las probabilidades y de la Estadística en diversos casos de la vida cotidiana de manera manual y recurriendo al uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) tales como Excel, Winstats, Graph, GeoGebra y Minitab. Se presentan ejemplos ilustrativos prácticos que han sido cuidadosamente seleccionados y resueltos didácticamente, paso a paso, empleando un lenguaje matemático de fácil comprensión.

En cada capítulo constan los resultados de aprendizaje que se espera que el lector sea capaz de lograr, los contenidos a tratar y las tareas de interaprendizaje. Los contenidos y las tareas de interaprendizaje se han desarrollado de manera secuencial interrelacionadas entre sí. En el primer capítulo se desarrolla la introducción a la probabilidad (análisis combinatorio, conceptos básicos y reglas de la probabilidad), en el segundo capítulo se desarrollan las distribuciones de probabilidad discretas (binomial, Poisson e hipergeométrica) y continuas (exponencial, uniforme y normal), el tercer capítulo está dedicado a la estimación de intervalos de confianza (para la media, para la proporción y el tamaño de la muestra), en el cuarto capítulo se desarrolla la prueba de hipótesis (Z prueba, t prueba, Razón F de Fisher y Ji cuadrado) y en el quinto capítulo se desarrollan las aplicaciones de gráficas estadísticas en el control de la calidad (gráficas para variables y para atributos). Al final del libro se presenta el solucionario de la evaluación diagnóstica, un formulario con ejemplos ilustrativos resueltos sobre conocimientos estadísticos previos (cálculo de frecuencias, regla de Esturges, medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de forma, correlación y regresión) y culmina con las tablas de distribución de probabilidades elaboradas Empleando Excel.

Los contenidos y procesos didácticos de interaprendizaje del presente libro son el fruto de la práctica en el aula durante algunos años de labor docente tanto en nivel secundario como universitario y que han sido publicados como artículos didácticos en <http://es.scribd.com/mariosuarezibujes>, http://www.monografias.com/usuario/perfiles/mario_suarez_7/monografias, teniendo miles de visitas y comentarios positivos de diferentes partes del mundo, por lo que se infiere que el presente libro en su segunda edición seguirá teniendo la aceptación por parte de los lectores y continuará aportando en la mejora significativa del proceso de interaprendizaje de las probabilidades y de la Estadística.

Convencido de que ninguna obra humana es perfecta, serán ustedes estimados lectores, los que con sus sugerencias seguirán contribuyendo en mejorar la presente propuesta didáctica de interaprendizaje de las probabilidades y de la Estadística empleado las TIC.

El Autor

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

OBJETIVO: Verificar los resultados de aprendizaje previos adquiridos por l@s lectores a través del presente cuestionario para emitir juicios de valor y tomar decisiones.

INSTRUCCIONES:

Estimado lector:

- ✓ La evaluación tiene una duración de 2 horas.
- ✓ Cada pregunta tiene una valoración de dos puntos.
- ✓ No se otorgará valoración a una respuesta correcta que no esté acompañada de un proceso de solución escrito.
- ✓ Emplee hojas adicionales y un esferográfico para resolver el presente cuestionario.
- ✓ Lea cuidadosamente el cuestionario y conteste empleando sus conocimientos previos.

¡Éxito!

CUESTIONARIO

- 1) Elabore un diagrama de caja y bigotes dada la siguiente distribución: 6, 9, 9, 12, 12, 12, 15 y 17
- 2) Calcule la moda en forma gráfica empleando un histograma con los siguientes datos:

Intervalo o Clase	f
10-19	3
20-29	7
30-39	15
40-49	12
50-59	8

- 3) Calcule el punto centroide con los datos de la siguiente tabla sobre la altura en centímetros (X) y los pesos en kilogramos (Y) de una muestra de estudiantes varones tomada al azar del segundo semestre de una universidad. Estimar el valor de Y cuando $X = 200$. Elabore las gráficas respectivas

X	152	157	162	167	173	178	182	188
Y	56	61	67	72	70	72	83	92

- 4) Calcule y grafique la ecuación de la parábola $Y = a_0 + a_1X + a_2X^2$ por el método de los mínimos cuadrados dada la siguiente tabla sobre la población de un país. Estimar la población para el año 2020:

Año	1960	1965	1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010
Población (millones)	4,52	5,18	6,25	7,42	8,16	9,12	10,92	11,62	12,68	13,12	13,97

- 5) Calcule la ecuación de la recta de tendencia por el método de los semipromedios, pronostique la tendencia de ventas para el 2011, elabore el diagrama de dispersión, y grafique la recta de tendencia con los siguientes datos sobre las ventas en millones de dólares de la Empresa D & M

Año(X)	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Ventas(Y)	1,5	1,8	2	1,5	2,2	2	3	2,8	2,4	2,9	3

Nota: La solución de la presente evaluación se encuentra al final del libro

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN A LA PROBABILIDAD

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL CAPÍTULO

Al finalizar el presente capítulo el lector podrá evidenciar que:

- ✓ Identifica las características, propiedades y aplicaciones del análisis combinatorio, de las probabilidades y de las posibilidades.
- ✓ Utiliza algoritmos del análisis combinatorio, de las probabilidades y de las posibilidades para resolver ejercicios y problemas de aplicación de manera manual y empleando Excel.
- ✓ Plantea y resuelve ejercicios y problemas de aplicación sobre análisis combinatorio, probabilidades y posibilidades de manera manual y utilizando Excel.

CONTENIDOS

- ✓ Análisis Combinatorio: Factorial, Permutaciones y Combinaciones
- ✓ Conceptos básicos: Experimento, Experimento Aleatorio, Espacio Muestral, Evento o Suceso, Probabilidad y Posibilidad.
- ✓ Reglas de la Probabilidad: Regla de la adición (para eventos no mutuamente excluyentes y para eventos mutuamente excluyentes) y regla de la multiplicación (para eventos dependientes y para eventos independientes)
- ✓ Probabilidad Total y Teorema de Bayes

1.1) ANÁLISIS COMBINATORIO

A) FACTORIAL

La factorial está relacionada con el cálculo del número de maneras en las que un conjunto de cosas puede arreglarse en orden.

El número de maneras en el que las n cosas pueden arreglarse en orden es:

$$n! = n(n - 1)(n - 2) \dots \dots 1$$

Donde $n!$ se llama el factorial de n y $0!$ se define como 1

Ejemplos ilustrativos

1) Calcular $7!$

Solución:

$$n! = n(n - 1)(n - 2) \dots \dots 1$$

$$7! = 7(7 - 1)(7 - 2)(7 - 3)(7 - 4)(7 - 5)1$$

$$7! = 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$$

$$7! = 5040$$

Empleando Excel se calcula de la siguiente manera:

a) Insertar función. Seleccionar la categoría Matemáticas y trigonométricas. Seleccionar la función FACT

	A	B	C	D	E
1	Factorial	Respuesta			
2	7	=			
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

b) Clic en Aceptar. En el cuadro de diálogo de Argumentos de la función, en el recuadro correspondiente a Número seleccionar la celda correspondiente al factorial a calcular (A2).

	A	B	C	D	E
1	Factorial	Respuesta			
2	7	=FACT(A2)			
3					
4					
5					
6					
7					
8					

c) Clic en Aceptar

	A	B
1	Factorial	Respuesta
2	7	5040

2) Calcular 3!4!

Solución:

$$3!4! = (3 \cdot 2 \cdot 1)(4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1) = 144$$

Empleando Excel se calcula como indica la siguiente figura:

	A	B	C
1	Factorial	Respuesta	
2	3		
3	4		
4	3!4! =	144	

3) Si un conjunto de 6 libros se colocan en un estante. ¿De cuántas formas es posible ordenar estos libros?

Solución:

$$n! = n(n - 1)(n - 2) \dots \dots 1$$

$$6! = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$$

$$6! = 720$$

B) PERMUTACIONES

En muchos casos se necesita saber el número de formas en las que un subconjunto de un grupo completo de cosas puede arreglarse en orden. Cada posible arreglo es llamado permutación. Si un orden es suficiente para construir otro subconjunto, entonces se trata de permutaciones.

El número de maneras para arreglar r objetos seleccionados a la vez de n objetos en orden, es decir, el número de diferentes *ordenamientos* de n elementos tomados r a la vez es:

$${}_n P_r = n(n-1)(n-2) \dots (n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

Notas:

Si $n = r$, entonces la permutación se transforma en factorial, es decir:

$${}_n P_n = \frac{n!}{(n-n)!} = \frac{n!}{0!} = n!$$

Cuando los elementos se ordenan alrededor de un objeto formando una cerrada, se llama *permutación circular*, y su ecuación es:

$$P_{c(n)} = (n-1)!$$

Si el número de maneras para arreglar r objetos seleccionados a la vez de n objetos en orden, de los cuales algunos r objetos se repiten, se llama *permutación con elementos repetidos*, y su ecuación es:

$${}_n P_{r_1, \dots, r_r} = \frac{n!}{(r_1)! (r_2)! \dots (r_r)!}$$

Ejemplos ilustrativos:

1) Calcular ${}_7 P_3$


Solución:

$n = 7$ y $r = 3$, entonces aplicando la fórmula se obtiene:


$${}_n P_r = \frac{n!}{(n-r)!} \Rightarrow {}_7 P_3 = \frac{7!}{(7-3)!} = \frac{7!}{4!} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 7 \cdot 6 \cdot 5 = 210$$

Empleando Excel se calcula de la siguiente manera:


a) Insertar función. Seleccionar la categoría de Estadísticas. En función seleccionar la opción PERMUTACIONES.



b) Clic en Aceptar. En el cuadro de diálogo de Argumentos de la función, en el recuadro Número seleccionar la celda correspondiente a n (B1), en el recuadro de Tamaño seleccionar la celda correspondiente a r (B2).



c) Clic en Aceptar



Los cálculos empleando GeoGebra se muestran en la siguientes figuras: En programa GeoGebra, Entrada: se escribe nPr y aparece nPr[<Número>, <Número>]. Se escribe los números 7 y 3, quedando nPr[7,3]. Enter



2) ¿De cuántas maneras distintas se pueden ubicar 7 personas alrededor de una mesa circular?

Solución: Se trata de una permutación circular

$$P_{c(n)} = (n - 1)! = P_{c(7)} = (7 - 1)! = 6! = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 720$$

3) ¿Cuántos arreglos literales pueden obtenerse con las letras de la palabra AEREOLINEA?

Solución: Como se pide calcular una permutación con elementos repetidos. Los elementos ordenados en orden alfabético son: A A E E E I L N O R, donde la A se repite dos veces y la E tres veces, entonces:

$$n P_{r_1, \dots, r_r} = \frac{n!}{(r_1)! (r_2)! \dots (r_r)!} \Rightarrow 10 P_{2;3} = \frac{10!}{(2)! (3)!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 302400$$

C) COMBINACIONES

En muchas situaciones no interesa el orden de los resultados, sino sólo el número de maneras en las que r objetos pueden seleccionarse a partir de n cosas, sin consideración de orden. Si dos subconjuntos se consideran iguales debido a que simplemente se han reordenado los mismos elementos, entonces se trata de combinaciones.

El número de maneras para arreglar r objetos seleccionados a la vez de n objetos, sin considerar el orden, es decir, el número de *agrupamientos* de n elementos tomados r a la vez es:

$${}_nC_r = \binom{n}{r} = \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-r+1)}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

Ejemplos ilustrativos:

1) Calcular ${}_7C_3$

Solución:

$n = 7$ y $r = 3$, entonces aplicando la fórmula se obtiene:

$${}_nC_r = \frac{n!}{r!(n-r)!} \Rightarrow {}_7C_3 = \frac{7!}{3!(7-3)!} = \frac{7!}{3!4!}$$

$${}_7C_3 = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{(3 \cdot 2 \cdot 1)(4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1)} = 7 \cdot 5 = 35$$

Empleando Excel se calcula de la siguiente manera:

a) Insertar función. Seleccionar la categoría de Matemáticas y trigonométricas. En función seleccionar la opción COMBINAT

	A	B	C	D	E
1	n	7			
2	r	3			
3	${}_7C_3$	=			
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

b) Clic en Aceptar. En el cuadro de diálogo de Argumentos de la función, en el recuadro Número seleccionar la celda correspondiente a n (B1), en el recuadro de Tamaño seleccionar la celda correspondiente a r (B2).

	A	B	C	D	E
1	n	7			
2	r	3			
3	7C_3	B1;B2)			
4					
5					
6					
7					
8					
9					

c) Clic en Aceptar

	A	B	C
1	n	7	
2	r	3	
3	7C_3	35	

2) ¿Cuántas triángulos se pueden formar con 6 puntos no colineales?

Solución:

Se pide calcular 6C_3 , entonces,

$${}^nC_r = \frac{n!}{r!(n-r)!} \Rightarrow {}^6C_3 = \frac{6!}{3!(6-3)!} = \frac{6!}{3!3!} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{(3 \cdot 2 \cdot 1)(3 \cdot 2 \cdot 1)} = 5 \cdot 4 = 20$$

Los cálculos empleando GeoGebra se muestran en la siguiente figura:

Se escribe en Entrada: Número y aparece NúmeroCombinatorio[<Número n (o valor numérico)>, <Número r (o valor numérico)>]. Digitar el 6 y el 3, y queda NúmeroCombinatorio[6,3]. Enter

Entrada:

Número C: NúmeroCombinatorio[6, 3]

TAREA DE INTERAPRENDIZAJE N° 1

1) Realice un organizador gráfico (mapa conceptual, organigrama, mentefacto, etc.) sobre el análisis combinatorio.

2) Resuelva de manera manual, empleando Excel y GeoGebra

2.1) $3!$

6

2.2) $6!$

720

2.3) ${}_4P_3$

24

2.4) ${}_5P_2$

20

2.5) ${}_5C_2$

10

2.6) $\binom{6}{2}$

15

3) En la fórmula de la permutación, ¿qué valor debe tener r para que la permutación sea igual a la factorial?. Ilustre su respuesta con un ejemplo

n

4) Realice los cálculos de manera manual y empleando Excel para que compruebe las siguientes igualdades:

$$4.1) 7! = {}_7P_7 \quad 4.2) \binom{7}{0} = \binom{7}{7} \quad 4.3) \binom{7}{3} - \binom{6}{3} = \binom{6}{2}$$

5) Don Albertito desea parquear 4 automóviles en su garaje, uno a continuación de otro. Calcule el número de resultados posibles de parquear dichos automóviles. Realice los cálculos de manera manual y empleando GeoGebra

24

6) Se desea ordenar 3 libros en un estante, pero solo hay espacio para 2 libros. Calcule el número de resultados posibles de ordenar los mencionados libros. Realice los cálculos de manera manual y empleando Excel

6

7) ¿Cuántos triángulos se pueden formar con 9 puntos no colineales?. Realice los cálculos de manera manual y empleando GeoGebra

84

8) ¿De cuántas maneras posibles se puede formar con 7 personas una comisión de 3 miembros?. Realice los cálculos de manera manual y empleando Excel

35

9) Cree y resuelva dos ejercicios de aplicación de permutación circular y dos de permutación con elementos repetidos. Resuelva de manera manual y empleando GeoGebra.

10) Consulte en la biblioteca o en el internet sobre la importancia de las permutaciones y combinaciones, y presente la consulta mediante un organizador gráfico.

1.2) CONCEPTOS BÁSICOS

A) EXPERIMENTO.- Es toda acción sobre la cual vamos a realizar una medición u observación, es decir cualquier proceso que genera un resultado definido.

B) EXPERIMENTO ALEATORIO.- Es toda actividad cuyos resultados no se determinan con certeza. Ejemplo: lanzar una moneda al aire. No podemos determinar con toda certeza ¿cuál será el resultado al lanzar una moneda al aire?, por lo tanto constituye un experimento aleatorio.

C) ESPACIO MUESTRAL (S).- Es un conjunto de *todos los resultados posibles* que se pueden obtener al realizar un experimento aleatorio. Ejemplo: sea el experimento E: lanzar un dado y el espacio muestral correspondiente a este experimento es: $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

D) PUNTO MUESTRAL.- Es un elemento del espacio muestral de cualquier experimento dado.

E) EVENTO O SUCESO.- Es todo subconjunto de un espacio muestral. Se denotan con letras mayúsculas: A, B, etc. Los resultados que forman parte de este evento generalmente se conocen como “*resultados favorables*”. Cada vez que se observa un resultado favorable, se dice que “*ocurrió*” un evento. Ejemplo: Sea el experimento E: lanzar un dado. Un posible evento podría ser que salga número par. Definimos el evento de la siguiente manera: $A = \text{sale número par} = \{2, 4, 6\}$, resultados favorables $n(E) = 3$

Los eventos pueden ser:

i) Evento cierto.- Un evento es cierto o seguro si se realiza siempre. Ejemplo: Al introducirnos en el mar, en condiciones normales, es seguro que nos mojaremos.

ii) Evento imposible.- Un evento es imposible si nunca se realiza. Al lanzar un dado una sola vez, es imposible que salga un 10

iii) Evento probable o aleatorio.- Un evento es aleatorio si no se puede precisar de antemano el resultado. Ejemplo: ¿Al lanzar un dado, saldrá el número 3?

F) PROBABILIDAD.- Es el conjunto de posibilidades de que un evento ocurra o no en un momento y tiempo determinado. Dichos eventos pueden ser medibles a través de una escala de 0 a 1, donde el evento que no pueda ocurrir tiene una probabilidad de 0 (evento imposible) y un evento que ocurra con certeza es de 1 (evento cierto).

La probabilidad de que ocurra un evento, siendo ésta una medida de la posibilidad de que un suceso ocurra favorablemente, se determina principalmente de dos formas: empíricamente (de manera experimental) o teóricamente (de forma matemática).

i) Probabilidad empírica.- Si E es un evento que puede ocurrir cuando se realiza un experimento, entonces la probabilidad empírica del evento E, que a veces se le denomina *definición de frecuencia relativa de la probabilidad*, está dada por la siguiente fórmula:

$$P(E) = \frac{\text{número de veces que ocurre el evento } E}{\text{número de veces que se realizó el experimento}}$$

Nota: P(E), se lee probabilidad del evento E

Ejemplo ilustrativos

1) En el año 2010, nacieron en un hospital 100 hombres y 150 mujeres. Si una persona fue seleccionada aleatoriamente de los registros de nacimientos de ese año, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido mujer?

Solución:

Ya que las probabilidades de que nazcan hombres o mujeres no son iguales, y por tener información específica experimental que respalda este hecho, se calcula empleando la fórmula de la probabilidad experimental

$$P(E) = \frac{\text{número de veces que ocurre el evento } E}{\text{número de veces que se realizó el experimento}}$$

$$P(\text{Mujeres}) = \frac{\text{número de nacimientos de mujeres}}{\text{número total de nacimientos}} = \frac{150}{100 + 150} = \frac{150}{250} = \frac{3}{5} = 0,6 = 60\%$$

Nota: la respuesta puede estar expresada como fracción, como un número decimal y como un porcentaje.

2) La siguiente tabla muestra el número de cajas y el número de artículos dañados por caja que un comerciante recibió. Calcular la probabilidad para cada resultado individual

N° de cajas	N° de artículos dañados
50	0
40	2
10	3

Solución:

Ya que las probabilidades de defectos por caja no son iguales, y por tener información específica experimental que respalda este hecho, se calcula empleando la definición de frecuencia relativa de la probabilidad.

N° de cajas	N° de artículos dañados	P(E)
50	0	$P(0) = 50/100 = 1/2 = 0,5 = 50\%$
40	2	$P(2) = 40/100 = 2/5 = 0,4 = 40\%$
10	3	$P(3) = 10/100 = 1/10 = 0,1 = 10\%$
100		$1 = 100\%$

Los cálculos empleando Excel se muestran en la siguiente figura:

	A	B	C	D
1	N° de cajas	N° de artículos dañados	P(E)	
2	50	0	0,5	=A2/\$A\$5
3	40	2	0,4	=A3/\$A\$5
4	10	3	0,1	=A4/\$A\$5
5	100	=SUMA(A2:A4)	1	=SUMA(C2:C4)

Nota:

La respuesta 0,5 significa que existe una probabilidad de 0,5 o del 50% de que 0 artículos en cualquier caja dada estuviera dañado

La respuesta 0,4 significa que existe una probabilidad de 0,4 o del 40% de que 2 artículos en cualquier caja dada estuviera dañado

La respuesta 0,1 significa que existe una probabilidad de 0,1 o del 10% de que 3 artículos en cualquier caja dada estuviera dañado

La suma de las probabilidades individuales siempre es igual a 1 que en porcentaje es igual al 100%

ii) Probabilidad teórica.- Si todos los resultados en un espacio muestral S finito son igualmente probables, y E es un evento en ese espacio muestral, entonces la probabilidad teórica del evento E está dada por la siguiente fórmula, que a veces se le denomina la *definición clásica de la probabilidad*, expuesta por Pierre Laplace en su famosa Teoría analítica de la probabilidad publicada en 1812:

$$P(E) = \frac{\text{número de resultados favorables}}{\text{número total de posibles resultados}} = \frac{n(E)}{n(S)}$$

Ejemplos ilustrativos

1) En cierta rifa de un automóvil se venden 5000 boletos. Calcular la probabilidad de ganarse el automóvil

1.1) Si se compran 20 boletos.

1.2) Si se compran todos los boletos

1.3) Si no se compran boletos

Solución:

Ya que el espacio muestral S (5000 boletos) es finito, y los resultados de cada boleto son igualmente probables, se calcula empleando la fórmula de la definición clásica de la probabilidad

$$P(E) = \frac{\text{número de resultados favorables}}{\text{número total de resultados posibles}} = \frac{n(E)}{n(S)}$$

$$1.1) P(20) = \frac{20}{5000} = \frac{1}{250} = 0,004 = 0,4\%$$

$$1.2) P(5000) = \frac{5000}{5000} = 1 = 100\%$$

$$1.3) P(0) = \frac{0}{5000} = 0 = 0\%$$

2) Calcular la probabilidad de obtener un número impar en el lanzamiento de un dado

Solución:

Espacio muestral = $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, entonces, $n(S) = 6$

Resultados favorables = $\{1, 3, 5\}$, entonces, $n(E) = 3$

$$P(E) = \frac{\text{número de resultados favorables}}{\text{número total de resultados posibles}} = \frac{n(E)}{n(S)} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} = 0,5 = 50\%$$

3) En un ánfora existe 10 fichas amarillas, 6 rojas y 4 azules.

3.1) ¿Qué probabilidad existe de sacar una ficha amarilla en un primer intento?

3.2) ¿Qué probabilidad existe de sacar una ficha no roja en un primer intento?

Solución:

$$n(S) = 10 + 6 + 4 = 20$$

$$3.1) n(E) = 10$$

$$P(E) = \frac{\text{número de resultados favorables}}{\text{número total de resultados posibles}} = \frac{n(E)}{n(S)}$$

$$P(A) = \frac{10}{20} = \frac{1}{2} = 0,5 = 50\%$$

3.2) Si $P(E)$ es la probabilidad de que ocurra el evento E y $P(\bar{E})$ la probabilidad de que no ocurra el evento E . Debido a que la suma de las probabilidades siempre da como resultado 1, es decir, $P(E) + P(\bar{E}) = 1$, por lo que se tiene: $P(\bar{E}) = 1 - P(E)$,

Calculando la probabilidad de sacar una ficha roja se obtiene:

$$n(E) = 6$$

$$P(E) = \frac{\text{número de resultados favorables}}{\text{número total de resultados posibles}} = \frac{n(E)}{n(S)}$$

$$P(R) = \frac{6}{20} = 0,3$$

Calculando la probabilidad de sacar una ficha no roja se obtiene:

$$P(\bar{E}) = 1 - P(E)$$

$$P(\bar{R}) = 1 - P(R)$$

$$P(\bar{R}) = 1 - 0,3 = 0,7$$

4) En una urna existe 10 bolas numeradas con los números dígitos.

4.1) ¿Qué probabilidad existe de sacar una bola enumerada con un número múltiplo de 3?

4.2) ¿Qué probabilidad existe de sacar una bola enumerada con un número divisor de 6?

Solución:

$$P(E) = \frac{\text{número de resultados favorables}}{\text{número total de resultados posibles}} = \frac{n(E)}{n(S)}$$

Espacio muestral = $S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, entonces, $n(S) = 10$

4.1)

Resultados favorables = $\{3, 6, 9\}$, entonces, $n(E) = 3$

$$P(\text{Múltiplo de 3}) = \frac{3}{10}$$

4.2)

Resultados favorables = {1, 2, 3, 6}, entonces, $n(E) = 4$

$$P(\text{Divisor de } 6) = \frac{4}{10} = \frac{2}{5} = 0,4 = 40\%$$

5) De una urna que contiene 2 bolas rojas y 3 azules

5.1) Se extrae una bola, calcular la probabilidad de que la bola sea

a) Roja

b) Azul

Solución:

Número total de resultados posibles = $n(S) = 2 + 3 = 5$

a) Roja (R)

Número de resultados favorables = $n(E) = 2$

Remplazando valores en la fórmula de la probabilidad teórica se tiene

$$P(E) = \frac{\text{número de resultados favorables}}{\text{número total de resultados posibles}} = \frac{n(E)}{n(S)} \Rightarrow P(R) = \frac{2}{5}$$

b) Azul (A)

Número de resultados favorables = $n(E) = 3$

Remplazando valores en la fórmula de la probabilidad teórica se tiene

$$P(E) = \frac{\text{número de resultados favorables}}{\text{número total de resultados posibles}} = \frac{n(E)}{n(S)} \Rightarrow P(A) = \frac{3}{5}$$

5.2) Se extraen simultáneamente dos bolas, calcular la probabilidad de que las dos sean

a) Azules

b) Rojas

c) Diferente color

Designando por R_1, R_2 , las bolas rojas y por A_1, A_2, A_3 las azules se tiene el siguiente espacio muestral:

$R_1R_2, R_1A_1, R_1A_2, R_1A_3$

R_2A_1, R_2A_2, R_2A_3

A_1A_2, A_1A_3

A_2A_3

Entonces, $n(S) = 4 + 3 + 2 + 1 = 10$

a) Azules

Resultados favorables = $\{A_1A_2, A_1A_3, A_2A_3\}$, entonces, $n(E) = 3$

$$P(E) = \frac{\text{número de resultados favorables}}{\text{número total de resultados posibles}} = \frac{n(E)}{n(S)}$$

$$P(AA) = \frac{3}{10}$$

Otra forma de resolver este ejercicio es la siguiente:

El espacio muestral se calcula aplicando la fórmula de la combinación, es decir,

$$n(S) = {}_n C_r = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

En donde:

n = número total de bolas = $2 + 3 = 5$

r = número de bolas azules motivo de probabilidad = 2

Entonces, remplazando valores en la fórmula de la combinación se obtiene:

$$n(S) = {}_5 C_2 = \frac{5!}{2!(5-2)!} = \frac{5!}{2!3!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{(2 \cdot 1)(3 \cdot 2 \cdot 1)} = 5 \cdot 2 = 10$$

El número de resultados favorables se calcula aplicando la fórmula de la combinación, es decir,

$$n(E) = {}_n C_r = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

En donde:

n = número total de bolas azules = 3

r = número de bolas azules motivo de probabilidad = 2

Entonces, remplazando valores en la fórmula de la combinación se obtiene:

$$n(E) = {}_3 C_2 = \frac{3!}{2!(3-2)!} = \frac{3!}{2!1!} = \frac{3 \cdot 2 \cdot 1}{(2 \cdot 1)(1 \cdot 1)} = 3$$

Remplazando valores en la fórmula de la probabilidad se tiene:

$$P(E) = \frac{\text{número de resultados favorables}}{\text{número total de resultados posibles}} = \frac{n(E)}{n(S)}$$

$$P(AA) = \frac{n(E)}{n(S)} = \frac{{}_3 C_2}{{}_5 C_2} = \frac{3}{10}$$

Los cálculos empleando Excel aplicando combinaciones se muestran en la siguiente figura:

	A	B	C	D	E
1	P(AA)	3/10	=COMBINAT(3;2)/COMBINAT(5;2)		

b) Rojas

Resultados favorables = $\{R_1R_2\}$, entonces, $n(E) = 1$

$$P(RR) = \frac{n(E)}{n(S)} = \frac{1}{10}$$

Otra forma de resolver este ejercicio es la siguiente:

$$P(RR) = \frac{n(E)}{n(S)} = \frac{{}_2C_2}{{}_5C_2} = \frac{1}{10} = 0,1$$

Los cálculos empleando GeoGebra aplicando combinaciones se muestran en la siguiente figura:



c) Diferente color

Resultados favorables = $\{R_1A_1, R_1A_2, R_1A_3, R_2A_1, R_2A_2, R_2A_3\}$, entonces, $n(E) = 6$

$$P(E) = \frac{n(E)}{n(S)} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$$

Otra forma de resolver este ejercicio es la siguiente:

$$P(E) = \frac{n(E)}{n(S)} = \frac{{}_2C_1 \cdot {}_3C_1}{{}_5C_2} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$$

Los cálculos empleando Excel aplicando combinaciones se muestran en la siguiente figura:

	A	B	C	D	E	F	G
1	P(E)	3/5	=COMBINAT(2;1)*COMBINAT(3;1)/COMBINAT(5;2)				

5.3) Se extraen simultáneamente tres bolas, calcular la probabilidad de que las tres sean

- Dos rojas y una azul
- Una roja y dos azules
- Tres azules

Solución:

Designando por R_1, R_2 , las bolas rojas y por A_1, A_2, A_3 las azules se tiene el siguiente espacio muestral:

- $R_1R_2A_1, R_1R_2A_2, R_1R_2A_3$
- $R_1A_1A_2, R_1A_1A_3$
- $R_1A_2A_3$
- $R_2A_1A_2, R_2A_1A_3$
- $R_2A_2A_3$
- $A_1A_2A_3$

Entonces, $n(S) = 3 + 2 + 1 + 2 + 1 + 1 = 10$

a) Dos rojas y una azul


Resultados favorables = $\{R_1R_2A_1, R_1R_2A_2, R_1R_2A_3\}$, entonces, $n(E) = 3$

$$P(E) = \frac{n(E)}{n(S)} = \frac{3}{10}$$

Otra forma de resolver este ejercicio es la siguiente:

$$P(E) = \frac{n(E)}{n(S)} = \frac{{}_2C_2 \cdot {}_3C_1}{{}_5C_3} = \frac{3}{10} = 0,3$$

Los cálculos empleando GeoGebra escribiendo NúmeroCombinatorio en Entrada se muestran en la siguiente figura:



b) Una roja y dos azules

Resultados favorables = $\{R_1A_1A_2, R_1A_1A_3, R_1A_2A_3, R_2A_1A_2, R_2A_1A_3, R_2A_2A_3\}$, entonces, $n(E) = 6$

$$P(E) = \frac{n(E)}{n(S)} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$$

Otra forma de resolver este ejercicio es la siguiente:

$$P(E) = \frac{n(E)}{n(S)} = \frac{{}_2C_1 \cdot {}_3C_2}{{}_5C_3} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$$

c) Tres azules


Resultados favorables = $\{A_1A_2A_3\}$, entonces, $n(E) = 1$

$$P(E) = \frac{n(E)}{n(S)} = \frac{1}{10}$$

Otra forma de resolver este ejercicio es la siguiente:

$$P(E) = \frac{n(E)}{n(S)} = \frac{{}_3C_3}{{}_5C_3} = \frac{1}{10} = 0,1$$

Los cálculos empleando GeoGebra se muestran en la siguiente figura:



5.4) Se extraen simultáneamente cuatro bolas, calcular la probabilidad de que las cuatro sean

a) Dos rojas y dos azules

b) Una roja y tres azules

Solución:

Designando por R_1, R_2 , las bolas rojas y por A_1, A_2, A_3 las azules se tiene el siguiente espacio muestral:

$R_1R_2A_1A_2, R_1R_2A_1A_3, R_1R_2A_2A_3, R_1A_1A_2A_3, R_2A_1A_2A_3$

Entonces, $n(S) = 5$

a) Dos rojas y dos azules

Resultados favorables = $\{R_1R_2A_1A_2, R_1R_2A_1A_3, R_1R_2A_2A_3\}$, entonces, $n(E) = 3$

$$P(E) = \frac{n(E)}{n(S)} = \frac{3}{5}$$

Otra forma de resolver este ejercicio es la siguiente:

$$P(E) = \frac{n(E)}{n(S)} = \frac{{}_2C_2 \cdot {}_3C_2}{{}_5C_4} = \frac{3}{5}$$

b) Una roja y tres azules

Resultados favorables = $\{R_1A_1A_2A_3, R_2A_1A_2A_3\}$, entonces, $n(E) = 2$

$$P(E) = \frac{n(E)}{n(S)} = \frac{2}{5}$$

Otra forma de resolver este ejercicio es la siguiente:

$$P(E) = \frac{n(E)}{n(S)} = \frac{{}_2C_1 \cdot {}_3C_3}{{}_5C_4} = \frac{2}{5}$$

6) De una urna que contiene 6 bolas rojas y 5 negras se extraen simultáneamente dos bolas, calcular la probabilidad de que:

6.1) Las dos sean rojas

6.2) Las dos sean negras

6.3) De diferente color

Solución:

6.1)

$$P(E) = \frac{\text{número de resultados favorables}}{\text{número total de resultados posibles}} = \frac{n(E)}{n(S)}$$

$$P(RR) = \frac{n(E)}{n(S)} = \frac{{}_6C_2}{{}_{11}C_2} = \frac{\frac{6!}{2!(6-2)!}}{\frac{11!}{2!(11-2)!}} = \frac{\frac{6!}{2!4!}}{\frac{11!}{2!9!}} = \frac{\frac{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{(2 \cdot 1)(4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1)}}{\frac{11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{(2 \cdot 1)(9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1)}} = \frac{15}{55} = \frac{3}{11}$$

Empleando Excel:

	A	B	C	D	E
1	P(RR)	3/11	=COMBINAT(6;2)/COMBINAT(11;2)		

6.2)

$$P(NN) = \frac{n(E)}{n(S)} = \frac{{}_5C_2}{{}_{11}C_2} = \frac{\frac{5!}{2!(5-2)!}}{\frac{11!}{2!(11-2)!}} = \frac{\frac{5!}{2!3!}}{\frac{11!}{2!9!}} = \frac{\frac{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{(2 \cdot 1)(3 \cdot 2 \cdot 1)}}{\frac{11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{(2 \cdot 1)(9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1)}} = \frac{10}{55} = \frac{2}{11}$$

Empleando GeoGebra



6.3)

$$P(E) = \frac{n(E)}{n(S)} = \frac{{}_6C_1 \cdot {}_5C_1}{{}_{11}C_2} = \frac{\frac{6!}{1!(6-1)!} \cdot \frac{5!}{1!(5-1)!}}{\frac{11!}{2!(11-2)!}} = \frac{\frac{6!}{1!5!} \cdot \frac{5!}{1!4!}}{\frac{11!}{2!9!}} = \frac{30}{55} = \frac{6}{11} = 0,55$$

7) De una urna que contiene 6 fichas rojas, 5 negras y 9 azules, Elizabeth extrae simultáneamente tres fichas, calcular la probabilidad de que las 3 fichas extraídas por Elizabeth sean:

7.1) Rojas

7.2) 2 rojas y una negra

7.3) De diferente color

Solución:

7.1) Rojas

$$P(E) = \frac{\text{número de resultados favorables}}{\text{número total de resultados posibles}} = \frac{n(E)}{n(S)}$$

$$P(RRR) = \frac{n(E)}{n(S)} = \frac{{}_6C_3}{{}_{20}C_3} = \frac{20}{1140} = \frac{1}{57}$$

7.2) 2 rojas y una negra

$$P(E) = \frac{\text{número de resultados favorables}}{\text{número total de resultados posibles}} = \frac{n(E)}{n(S)}$$

$$P(RRN) = \frac{n(E)}{n(S)} = \frac{{}_6C_2 \cdot {}_5C_1}{{}_{20}C_3} = \frac{15 \cdot 5}{1140} = \frac{75}{1140} = \frac{5}{76}$$

7.3) De diferente color

$$P(E) = \frac{\text{número de resultados favorables}}{\text{número total de resultados posibles}} = \frac{n(E)}{n(S)}$$

$$P(E) = \frac{n(E)}{n(S)} = \frac{{}_6C_1 \cdot {}_5C_1 \cdot {}_9C_1}{{}_{20}C_3} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 9}{1140} = \frac{270}{1140} = \frac{9}{38}$$


8) En una ferretería existen 6 galones de pintura roja, 5 de pintura naranja, 9 de pintura amarillo y 10 de pintura blanca. Bertha compra aleatoriamente cuatro galones de pintura, calcular la probabilidad de que los galones comprados por Bertha sean de diferente color.

Solución:

$$P(E) = \frac{\text{número de resultados favorables}}{\text{número total de resultados posibles}} = \frac{n(E)}{n(S)}$$

$$P(E) = \frac{n(E)}{n(S)} = \frac{{}_6C_1 \cdot {}_5C_1 \cdot {}_9C_1 \cdot {}_{10}C_1}{{}_{30}C_4} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 9 \cdot 10}{27405} = \frac{2700}{27405} = \frac{20}{203} = 0,09852 = 9,852\%$$

Empleando GeoGebra



9) Se lanzan simultáneamente tres monedas, calcular la probabilidad de que se obtengan dos caras y un sello.

Solución:

Designando por C = cara y por S = sello se tiene:

Espacio muestral = S = {CCC, CCS, CSC, SCC, CSS, SCS, SSC, SSS}, entonces, n(S) = 8

Resultados favorables = { CCS, CSC, SCC }, entonces, n(E) = 3

$$P(2C \text{ y } 1nS) = \frac{3}{8}$$

Todas las probabilidades individuales se representan en la siguiente tabla:

Monedas			n(E)	P(E)
1ra	2da	3ra		
C	C	C	1	1/8
C	C	S	3	3/8
C	S	S	3	3/8
S	S	S	1	1/8
Total			8	1

Interpretación:

La probabilidad de obtener 3 caras al lanzar simultáneamente tres monedas es de $1/8$, es decir, $P(CCC) = 1/8$

La probabilidad de obtener 2 caras y un sello al lanzar simultáneamente tres monedas es de $3/8$, es decir, $P(CCS) = 3/8$

La probabilidad de obtener una cara y 2 sellos al lanzar simultáneamente tres monedas es de $3/8$, es decir, $P(CSS) = 3/8$

La probabilidad de obtener 3 sellos al lanzar simultáneamente tres monedas es de $1/8$, es decir, $P(SSS) = 1/8$

Nota:

El número 8 (espacio muestral), se calcula empleando la ecuación 2^n

$$2^n = 2^3 = 8$$

En donde n es el número de monedas que se lanzan

Los números 1, 3, 3, 1 se calculan mediante el siguiente esquema conocido con el nombre de “Triángulo de Pascal”, el cual está relacionado directamente con el Teorema del Binomio de Newton.


Este triángulo tiene como primera fila un 1, como segunda fila dos 1. Para las demás filas, la suma de cada par de números adyacentes de la fila anterior se ubica por debajo de ellos. Se añade un 1 en cada extremo.

Teorema del Binomio de Newton	Triángulo de Pascal
$(C+S)^0 = 1$	1
$(C+S)^1 = C + S$	1 1
$(C+S)^2 = C^2 + 2CS + S^2$	1 2 1
$(C+S)^3 = C^3 + 3C^2S + 3CS^2 + S^3$	1 3 3 1

En donde:

$$C^3 = CCC; 3C^2S = CCS + CSC + SCC; 3CS^2 = CSS + SCS + SSC; S^3 = SSS$$

10) Si un dado se clava de manera aleatoria en el objeto cuadrado que se muestra en la siguiente figura, ¿cuál es la probabilidad de que caiga en la región sombreada?



Solución:

Calculando el área del círculo:

$$AO = \pi r^2 \Rightarrow AO = \pi(4\text{cm})^2 = 3,14 \cdot 16\text{cm}^2 = 50,24\text{cm}^2$$

Calculando el área del cuadrado:

Si el radio de la circunferencia es 4cm, entonces el lado del cuadrado es 8 cm, es decir,

$$\text{Si } r = 4\text{cm} \Rightarrow \ell_{\square} = 8\text{cm}$$

Por lo tanto, el área del cuadrado es:

$$A_{\square} = \ell^2 = (8\text{cm})^2 = 64 \text{ cm}^2$$

Calculando el área de la región sombreada:

Se obtiene al restar el área del círculo de la del cuadrado

$$A_{\blacksquare} = A_{\square} - A_{\circ}$$

$$64\text{cm}^2 - 50,24\text{cm}^2 = 13,76 \text{ cm}^2$$

Calculando la probabilidad:

$$P(E) = \frac{\text{número de resultados favorables}}{\text{número total de resultados posibles}} = \frac{n(E)}{n(S)}$$

$$P(E) = \frac{\text{área sombreada}}{\text{área total}} = \frac{13,76 \text{ cm}^2}{64 \text{ cm}^2} = 0,215 = 21,5\%$$

G) POSIBILIDADES

Las posibilidades comparan el número de resultados favorables con el número de resultados desfavorables. Si todos los resultados de un espacio muestral son igualmente probables, y un número n de ellos son favorables al evento E , y los restantes m son desfavorables a E , entonces las **posibilidades a favor de E son de $n(E)$ a $m(E)$** , y las **posibilidades en contra de E son de $m(E)$ a $n(E)$**

Ejemplos ilustrativos:

1) A Mathías se le prometió comprar 6 libros, tres de los cuales son de Matemática. Si tiene las mismas oportunidades de obtener cualquiera de los 6 libros, determinar las posibilidades de que le compren uno de Matemática.

Solución:

Número de resultados favorables = $n(E) = 3$

Número de resultados desfavorables = $m(E) = 3$

Posibilidades a favor son $n(E)$ a $m(E)$, entonces,

Posibilidades a favor = 3 a 3, y simplificando 1 a 1.

Nota: A las posibilidades de 1 a 1 se les conoce como “igualdad de posibilidades” o “posibilidades de 50-50”

2) Dyanita compró 5 boletos para una rifa de su lugar de trabajo en la que el ganador recibirá un computador. Si en total se vendieron 1000 boletos y cada uno tiene la misma oportunidad de salir ganador, ¿cuáles son las posibilidades que Dyanita tiene en contra de ganarse el computador?

Solución:

Número de resultados favorables = $n(E) = 5$

Número de resultados desfavorables = $m(E) = 1000 - 5 = 995$

Posibilidades en contra son $m(E)$ a $n(E)$, entonces,

Posibilidades en contra = 995 a 5, o de 199 a 1.

3) Emily participará en una lotería, en donde las posibilidades de ganar son de 1 a 999. ¿Cuál es la probabilidad que tiene Emily de ganar la lotería?

Solución:

Como las posibilidades a favor = 1 a 999 y se sabe que las posibilidades a favor son $n(E)$ a $m(E)$, entonces,

Número de resultados favorables = $n(E) = 1$

Número de resultados desfavorables = $m(E) = 999$

Como el número total de resultados posibles = $n(S) = n(E) + m(E) = 1 + 999 = 1000$, y aplicando la fórmula de la probabilidad:

$$P(E) = \frac{\text{número de resultados favorables}}{\text{número total de resultados posibles}} = \frac{n(E)}{n(S)}$$

Se obtiene:

$$P(\text{Ganar}) = \frac{1}{1000} = 0,003 = 0,1\%$$

TAREA DE INTERAPRENDIZAJE N° 2

- 1) Realice un organizador gráfico sobre los conceptos básicos
- 2) Consulte sobre la biografía de Laplace y realice un organizador gráfico de la misma.
- 3) Consulte sobre la biografía de Blaise Pascal y realice un organizador gráfico de la misma.
- 4) Consulte sobre la biografía de Newton y realice un organizador gráfico de la misma.

5) Calcular las siguientes probabilidades

- | | |
|--|-------|
| 5.1) Obtener 4 lanzando un solo dado | 1/6 |
| 5.2) Obtener una reina al extraer una carta de una baraja estándar de 52 cartas | 1/13 |
| 5.3) Obtener cara al lanzar una moneda | 1/2 |
| 5.4) No obtener un rey al extraer una carta de una baraja estándar de 52 cartas | 12/13 |
| 5.5) Escoger el 3 de entre todos los numerales de la Chakanapi Yupaywan Pukllana. Consulte este juego en https://es.scribd.com/document/380961444/Juego-Matematico-en-la-Cruz-Andina-Chakanapi-Yupaywan-Pukllana | 1/3 |

6) Se tiene la información acerca de los ingresos mensuales por venta de material didáctico de la papelería D & M en los últimos 12 meses. Calcular la probabilidad para cada resultado individual de manera manual y empleando Excel

Meses	Ingresos (\$)
1	500
2	600
2	700
4	800
3	900

$$P(500) = 1/12 ; P(600) = 1/6; P(700) = 1/6; P(800) = 1/3; P(900) = 1/4$$

- 7) En una urna existe 10 bolas numeradas con los números dígitos. ¿Qué probabilidad existe de sacar una bola enumerada con un número primo? 40%
- 8) En una ánfora existe fichas numeradas del 0 al 30. ¿Qué probabilidad existe de sacar una ficha enumerada con un número perfecto? 6,45%
- 9) Sea una caja que contiene 3 bolas rojas, 5 blancas y 4 azules, calcule la probabilidad de que al sacar una bola ésta sea:
- 9.1) Roja 1/4
- 9.2) Blanca 5/12
- 9.3) No Azul 2/3
- 10) En una mesa existen 5 cartas, de las cuales solo 2 son reyes. Se escogen simultáneamente dos cartas. Calcular la probabilidad de obtener
- 10.1) Dos reyes 1/10
- 10.2) Al menos un rey 7/10
- 11) La empresa D & M desea contratar 2 nuevos empleados. Si existen candidatos para los cargos 3 mujeres y 5 hombres, y a cada candidato se le da igual consideración, calcular la probabilidad de manera manual y empleando GeoGebra de que los 2 nuevos empleados sean:
- 11.1) Mujeres 10,714%
- 11.2) Hombres 35,714%
- 11.3) Diferente sexo 53,571 %
- 12) Un recipiente contiene esferográficos, 3 de color rojo, 2 de color negro y uno de color azul. Se extrae simultáneamente 3 esferográficos, calcular la probabilidad de que los 3 esferográficos sean:
- 12.1) Dos rojos y un azul 3/20
- 12.2) Dos negros y un azul 1/20
- 12.3) Diferente color 3/10
- 13) De una caja que contiene 3 bolas rojas, 5 blancas y 4 azules se extraen simultáneamente cinco bolas, calcular la probabilidad aplicando combinaciones de manera manual y empleando GeoGebra de que las cinco bolas sean:
- 13.1) Dos rojas, dos blancas y una azul 5/33
- 13.2) Una roja, dos blancas y dos azules 5/22

14) En un ramo de rosas existen 8 rosas de color rojo, 4 de color blanco, 5 de color amarillo y 3 de color naranja. Mathías escoge aleatoriamente siete rosas, calcular la probabilidad de manera manual y empleando Excel de que las rosas escogidas por Mathías sean:

- 14.1) Siete rojas 0,01%
 14.2) Cuatro rojas y tres amarillas 0,903 %
 14.3) Dos rojas, dos blancas, dos amarillas y una naranja 6,502%

15) Se lanzan simultáneamente dos dados, calcular la probabilidad de que se obtenga:

- 15.1) Dos 4 1/36
 15.2) Ningún 4 25/36
 15.3) Al menos un 4 11/36


16) Se lanzan simultáneamente cuatro monedas, calcular la probabilidad de que se obtengan

- 16.1) 4 caras 1/16
 16.2) Una cara y 3 sellos 1/4
 16.3) El mismo evento 3/8

17) Se lanzan simultáneamente cinco monedas, calcular la probabilidad de que se obtengan


- 17.1) 2 caras y 3 sellos 5/16
 17.2) 4 caras y un sello 5/32
 17.3) El mismo evento 0

18) Si un dardo se clava de manera aleatoria en el objeto circular que se muestra en la siguiente figura, ¿cuál es la probabilidad de que caiga en la región sombreada?




0,5

19) Si un dardo se clava de manera aleatoria en el objeto cuadrado de lado 4 cm que se muestra en la siguiente figura, ¿cuál es la probabilidad de que caiga en la región sombreada?




50%

20) Si un dardo se clava de manera aleatoria en el objeto circular de diámetro 4 cm que se muestra en la siguiente figura, ¿cuál es la probabilidad de que caiga en la región sombreada?



$$\frac{2}{\pi}$$

21) Si un dardo se clava de manera aleatoria en el objeto cuadrado de lado 4 cm que se muestra en la siguiente figura, ¿cuál es la probabilidad de que caiga en la región sombreada?



$$\frac{\pi - 2}{2}$$

22) Dyanita tiene una probabilidad de 0,1% de ganar una lotería. ¿Qué posibilidades de ganar la lotería tiene Dyanita?

1 a 999

23) Mathías dice a Emily: Voy a lanzar seis monedas al aire, si todas caen cara y o si todas caen cruz te daré un dólar, pero si caen de alguna otra manera, tú me das 10 centavos de dólar . Calcule las posibilidades de que pierda Emily.

31 a 1

24) Mathías dice a Emily: Si al lanzar las semillas de maíz del juego de la Chakanapi Yupaywan Pukllana, todas las semillas caen con la parte del germen visible te daré un dólar, pero si caen de alguna otra manera, tú me das 5 centavos de dólar. Calcule las posibilidades de que gane Emily.

1 a 63

25) Plantee y resuelva 3 problemas de aplicación sobre probabilidad teórica.

26) Consulte en la biblioteca o en el internet sobre la importancia de las probabilidades, y presente la consulte a través de un organizador gráfico.

1.3) REGLAS DE LA PROBABILIDAD

A) TEORÍA DE CONJUNTOS

i) DEFINICIONES BÁSICAS

Conjunto.- A Georg Cantor se le atribuye la paternidad de la teoría de conjuntos. Intuitivamente un conjunto es una colección de objetos, los objetos que forman un conjunto se llaman elementos del conjunto. Sin embargo, en Matemática el concepto de conjunto es considerado primitivo y no se da una definición de éste, por lo que la palabra conjunto debe aceptarse lógicamente como un término no definido.

Notación.- Todo conjunto se escribe entre llaves y se le denota mediante letras mayúsculas, sus elementos se separan mediante comas.

Ejemplo: El conjunto de las vocales a, e, i, o, u se puede escribir así:

$$V = \{a, e, i, o, u\}$$

Relación de pertenencia.- Para indicar que un elemento pertenece a un conjunto se emplea el símbolo \in . Si un elemento no pertenece a un conjunto se emplea el símbolo \notin

Ejemplo: Del conjunto $V = \{a, e, i, o, u\}$

$a \in V$ Se lee a pertenece al conjunto V

$b \notin V$ Se lee b no pertenece al conjunto V

Nota: El símbolo \in es una estilización de la letra griega ϵ empleada para abreviar la palabra “ $\epsilon\sigma\tau\iota$ ” que significa “es” en griego.

Observación:

1) Dos conjuntos son iguales si y solamente si tienen los mismos elementos

2) Equivalentemente, si dos conjuntos son distintos, debe haber un elemento que pertenece a uno de ellos pero no al otro

3) Dado que un conjunto queda determinado por los objetos que contiene, el orden en la lista y las repeticiones (no se acostumbra a repetir los elementos) no cuentan

Ejemplo: Los conjuntos $\{a, e\}$, $\{e, a\}$, $\{a, e, a\}$ son tres maneras de denotar a un mismo conjunto, cuyos únicos elementos son a y e

Relación de inclusión.- Un conjunto está incluido en otro conjunto, si y solo si, cuando todo elemento de un conjunto también pertenece al otro conjunto.

Ejemplo:

Dado $A = \{2,4,6,8\}$ y $B = \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$, entonces:

$A \subset B$, se lee:

A es subconjunto de B

A está contenido en B

A es parte de B

$B \supset A$, se lee:

B es superconjunto de A

B incluye a A

B contiene a A

Observación:

Todo conjunto está incluido en sí mismo, es decir, todo conjunto es subconjunto de sí mismo.

$\forall A$, se cumple $A \subset A$, se lee: para todo A se cumple que A es subconjunto de A

El conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto. $\forall A, se cumple \emptyset \subset A$, se lee: para todo A se cumple que \emptyset es subconjunto de A

El símbolo \in se emplea solo para elementos de un conjunto y el símbolo \subset solo para conjuntos

Cardinalidad de un conjunto.- Para comprender el concepto de cardinalidad es necesario hacernos las siguientes preguntas: ¿Qué significa la frase: “En esta aula hay 22 personas”? ¿Qué significa el “número de elementos de un conjunto”? De alguna forma tenemos la sensación de andar en círculos: contar significa dar el número de elementos, pero el número de elementos se obtiene contando. Detrás del contar hay una noción más básica, esta es la *equinumerosidad*, intuitivamente, tener la misma cantidad de elementos. Para saber si dos conjuntos tienen el mismo número de elementos, no se necesita siquiera conocer el concepto de número. La siguiente historia imaginaria es bien conocida.

Un pastor prehistórico tiene un rebaño de ovejas. Obviamente este individuo no sabe “contar” y sabe nada de aritmética. Cada mañana cuando saca su rebaño a pastar pone en un canasto una piedra por cada oveja que sale. Al regresar en la noche, saca una piedra por cada oveja que entra al corral. Si sobran piedras habrá perdido al menos una oveja descarriada y deberá ir a buscarla, si faltan piedras, parió una oveja y habrá fiesta. Vemos que sin saber nada de matemática nuestro primitivo pastor puede manejar un problema de conteo. A veces es más importante saber si dos conjuntos son equinumerosos, que saber su número de elementos.

Dos conjuntos son equinumerosos o equipotentes si a cada elemento de cada conjunto le corresponde un único elemento del otro, sin que sobren elementos en ningún de ellos. Se obtiene así la noción intuitiva de tener la misma cantidad de elementos.

El *cardinal o la cardinalidad* de un conjunto A es el número de elementos que tiene el conjunto y suele simbolizarse como $n(A)$

Ejemplo:

Dado el conjunto $A = \{a, b\}$ su cardinal $n(A) = 2$

Dado el conjunto $B = \{a, b, b, a, a, a\}$ su cardinal $n(B) = 2$

Determinación de conjuntos.- Hay dos formas de determinar un conjunto, por Extensión y por Comprensión

Por extensión.- Un conjunto está determinado por extensión cuando se describe el conjunto nombrando cada uno de sus elementos.

Ejemplos:

$A = \{1, 2, 3, 5, 5, 6, 7, 8, 9\}$

$B = \{a, e, i, o, u\}$

Por comprensión.- Un conjunto está determinado por comprensión cuando se nombra una propiedad, una regla o una característica común a los elementos del conjunto.

Ejemplos:

$A = \{\text{Números dígitos}\}$

$B = \{\text{Vocales}\}$

Lenguaje:

$C = \{x/x \text{ es dígito}\}$

Se lee así: C es el conjunto formado por los elementos x tal que x es un dígito

$D = \{x \in \mathbb{R} / -3 < x \leq 7\}$

Se lee así: D igual al conjunto de todos los números x elementos de los números reales tales que menos tres (-3) es menor a x, y, x a su vez es menor o igual que siete (7).

ii) CLASES DE CONJUNTOS

a) Por el número de elementos

Conjunto vacío o conjunto nulo.- Es un conjunto que no tiene elementos. Se simboliza por \emptyset o $\{ \}$

Ejemplo:

$$A = \{\text{Números enteros cuyo cuadrado es menor que } -7\} = \emptyset = \{ \}$$

Conjunto unitario.- Es un conjunto que tiene un solo elemento

Ejemplo:

$$A = \{x/x \text{ es primo par}\}$$

El único número primo par es el 2, por lo tanto $A = \{2\}$

$$B = \{x \in \mathbb{Z}/2x - 6 = 0\}$$

El número x elemento de los números enteros que cumple la condición es 3, por lo tanto $B = \{3\}$

$$C = \{x \in \mathbb{Z}/x^2 = 9 \wedge x > 0\}$$

El único número que cumple la condición es 3, por lo tanto $C = \{3\}$

$$D = \{x/3 < x \leq 4 \wedge x \in \mathbb{Z}\}$$

El único número que cumple la condición es 4, por lo tanto $D = \{4\}$

Conjunto finito.- Es aquel que tiene limitado número de elementos

Ejemplo:

$$A = \{\text{Números dígitos}\} = \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$$

$$B = \{x/x \text{ es un número entero par positivo menor que } 10\} = \{2,4,6,8\}$$

$$C = \{x \in \mathbb{Z}/x^2 = 9\} = \{-3,3\}$$

$$D = \{x \in \mathbb{Z}/-2 \leq x < 5\} = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4\}$$

Conjunto infinito.- Es aquel que tiene ilimitado número de elementos

Ejemplo:


$$A = \{x/x \text{ es un número primo}\}$$

$$B = \{x/x \geq 3\}$$

Conjunto universal.- Es un conjunto referencial que contiene a todos los elementos de un situación particular, generalmente se le representa por la letra U

Ejemplo:

El universo o conjunto universal de todos los números es el conjunto de los números complejos




b) Por la comparación entre conjuntos

Conjuntos comparables.- Un conjunto A es comparable con otro conjunto B si entre dichos conjuntos existe una relación de inclusión, es decir, A y B son comparables si $A \subset B$

Ejemplo:

$A = \{2,4,6\}$; $B = \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$, entonces $A \subset B$



Observe que A está incluido en B, por lo tanto A y B son comparables

Conjuntos iguales.- Dos conjuntos son iguales si tienen los mismos elementos, simbólicamente se escribe así: $A = B \Leftrightarrow A \subset B \wedge B \subset A$


Ejemplo: $A = \{x/x^2 = 4\}$ y $B = \{x/(x+2)(x-2) = 0\}$

Resolviendo la ecuación de cada conjunto se obtiene en ambos casos que x es igual a 2 o -2, es decir:

$A = \{-2,2\}$ y $B = \{-2,2\}$, por lo tanto $A = B$

Conjuntos disjuntos o excluyentes.- Son aquellos conjuntos que no tienen elementos comunes

Ejemplo: $A = \{x \in \mathbb{Z}/2 \leq x \leq 10\}$; $B = \{x \in \mathbb{Z}/x \text{ es impar positivo menor o igual que } 11\}$



Como se puede observar los conjuntos A y B no tienen elementos comunes, por lo tanto son conjuntos disjuntos.

Conjunto de conjuntos.- Es un conjunto cuyos elementos son todos conjuntos

Ejemplo:

$A = \{\{0\}, \{2,4,6,8\}, \{1,3,5,7,9\}\}$

Conjunto potencia.- Es aquel conjunto que está formado por todos los subconjuntos que es posible formar con los elementos de un conjunto dado.

Dado el conjunto A cuyo número de elementos (cardinal) es $n(A)$, el cardinal de su conjunto potencia $P(A)$ es aquella potencia de base 2 con exponente $n(A)$, es decir, $n[P(A)] = 2^{n(A)}$

Ejemplo:

Sea $A = \{1,2,3\}$

Los subconjuntos de A son $\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1,2\}, \{1,3\}, \{2,3\}, \{1,2,3\}, \emptyset$

Por lo tanto $P(A) = \{\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1,2\}, \{1,3\}, \{2,3\}, \{1,2,3\}, \emptyset\}$, y contando el número de elementos se obtiene $n[P(A)] = 8$

Aplicando $n[P(A)] = 2^{n(A)}$ también se obtiene $n[P(A)] = 2^3 = 8$

Observación: Subconjunto propio.- Se dice que A es subconjunto propio de B, si y solo si:

$A \subset B \wedge A \neq B$. El número de subconjuntos propios de A se calcula aplicando


Número de subconjuntos propios de A = $2^{n(A)} - 1$

ii) OPERACIONES CON CONJUNTOS

En los siguientes diagramas de Venn, la región sombreada es la solución a cada operación dada.


Unión o reunión

$$A \cup B = \{x/x \in A \vee x \in B\}$$




Intersección

$$A \cap B = \{x/x \in A \wedge x \in B\}$$




Diferencia

$$A - B = \{x/x \in A \wedge x \notin B\}$$




Diferencia simétrica

$$A \triangle B = (A - B) \cup (B - A) = (A \cup B) - (A \cap B)$$



Complemento

Complemento de $A = A' = A^c = \bar{A} = \{x / x \notin A\}$




B) REGLA DE LA ADICIÓN DE PROBABILIDADES

i) REGLA GENERAL PARA EVENTOS NO MUTUAMENTE EXCLUYENTES

Si A y B son dos eventos no mutuamente excluyentes (eventos intersecantes), es decir, de modo que ocurra A o bien B o ambos a la vez (al mismo tiempo), entonces se aplica la siguiente regla para calcular dicha probabilidad:

$$P(A \text{ o } B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$
$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$



En donde:

El conectivo lógico “o” corresponde a la “unión” en la teoría de conjuntos ($o = \cup$)

El conectivo “y” corresponde a la “intersección” en la teoría de conjuntos ($y = \cap$)

El espacio muestral (S) corresponde al conjunto universo en la teoría de conjuntos

Ejemplos ilustrativos

1) Sea A el suceso de sacar un As de una baraja estándar de 52 cartas y B sacar una carta con corazón rojo. Calcular la probabilidad de sacar un As o un corazón rojo o ambos en una sola extracción.

Solución:

A y B son sucesos no mutuamente excluyentes porque puede sacarse el as de corazón rojo. Las probabilidades son:

$$P(A) = \frac{4}{52}$$

$$P(B) = \frac{13}{52}$$

$$P(A \cap B) = \frac{1}{52}$$

Remplazando los anteriores valores en la regla general de la adición de probabilidades para eventos no mutuamente excluyentes se obtiene:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A \cup B) = \frac{4}{52} + \frac{13}{52} - \frac{1}{52} = \frac{4}{13}$$

2) En una urna existe 10 bolas numeradas del 1 al 10. ¿Qué probabilidad existe de sacar en una sola extracción una bola enumerada con un número par o con un número primo?

Solución:

$$\text{Espacio muestral} = S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\} \Rightarrow n(S) = 10$$

$$A = \text{número par} = \{2, 4, 6, 8, 10\}$$


$$B = \text{número primo} = \{2, 3, 5, 7\}$$

$$\text{Resultados favorables} = A \cup B = \{2, 4, 6, 8, 10, 3, 5, 7\} \Rightarrow n(E) = 8$$

Entonces, aplicando la fórmula de la probabilidad teórica se obtiene:

$$P(E) = \frac{\text{número de resultados favorables}}{\text{número total de resultados posibles}} = \frac{n(E)}{n(S)} \Rightarrow P(A \cup B) = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$$

O también, realizando un diagrama de Venn-Euler se obtiene:



$$P(A) = \frac{5}{10}$$

$$P(B) = \frac{4}{10}$$

$$P(A \cap B) = \frac{1}{10}$$

Entonces, aplicando la regla para eventos no mutuamente excluyentes se obtiene:


$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A \cup B) = \frac{5}{10} + \frac{4}{10} - \frac{1}{10} = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$$

3) En una clase, 10 alumnos tienen como preferencia solamente la asignatura de Matemática, 15 prefieren solamente Estadística, 20 prefieren Matemática y Estadística, y 5 no tienen preferencia por ninguna de estas asignaturas. Calcular la probabilidad que de un alumno de la clase seleccionado al azar tenga preferencia por Matemática o Estadística o ambas asignaturas.

Solución:

Realizando un diagrama de Venn-Euler se obtiene:



Simbología:

- S = espacio muestral
- A = Matemática
- B = Estadística
- a = Solamente Matemática
- b = Solamente Estadística
- c = Matemática y Estadística
- d = Ninguna de las dos asignaturas

Datos y cálculos:

Número total de resultados posibles = $n(S) = 10 + 20 + 15 + 5 = 50$

Número de resultados favorables = $n(E) = 10 + 20 + 15 = 45$

Entonces, aplicando la fórmula de la probabilidad teórica se obtiene:

$$P(E) = \frac{\text{número de resultados favorables}}{\text{número total de resultados posibles}} = \frac{n(E)}{n(S)} \Rightarrow P(A \cup B) = \frac{45}{50} = \frac{9}{10}$$

O también, observando el diagrama de Venn-Euler se tiene que:

$$P(A) = \frac{30}{50}$$

$$P(B) = \frac{35}{50}$$



$$P(A \cap B) = \frac{20}{50}$$

Aplicando la regla para eventos no mutuamente excluyentes se obtiene:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A \cup B) = \frac{30}{50} + \frac{35}{50} - \frac{20}{50} = \frac{45}{50} = \frac{9}{10}$$

Los cálculos empleando Excel se muestran en la siguiente figura:

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	n(E)		P(E)		S		S			
2	10									
3	15						A ∪ B			
4	20		2/5							
5	5									
6	50	=B2+B3+B4+B5								
7	30	=B2+B4	3/5	=B7/\$B\$6						
8	35	=B3+B4	7/10	=B8/\$B\$6						
9	45	=B2+B3+B4	9/10	=B9/\$B\$6	$P(E) = \frac{\text{número de resultados favorables}}{\text{número total de resultados posibles}} = \frac{n(E)}{n(S)}$					
10			9/10	=D7+D8-D4	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$					

4) En un grupo de 50 personas, 6 tienen como preferencia solamente el color amarillo, 10 prefieren solamente el color blanco, 6 prefieren el color amarillo y blanco, 10 prefieren el color blanco y café, 12 prefieren el color amarillo y café, 4 prefieren los 3 colores y 10 no tienen preferencia por ninguno de los tres colores.

4.1) Elaborar un diagrama de Venn-Euler

4.2) Calcular la probabilidad que de una persona del grupo seleccionada al azar tenga preferencia por lo menos uno de los tres colores.

Solución:

4.1)

Simbología:

S = espacio muestral

A= amarillo

B= blanco

C = café

a = Solamente amarillo

b = Amarillo y blanco, pero no café

c = Solamente blanco



d = Amarillo y café, pero no blanco

e = Los 3 colores

f = Blanco y café, pero no amarillo

g = Solamente café

h = Ninguno de los tres colores



Datos y cálculos:

a = 6

c = 10

e = 4

h = 10

b + e = 6 → b = 6 - e = 6 - 4 = 2

e + f = 10 → f = 10 - e = 10 - 4 = 6

d + e = 12 → d = 12 - e = 12 - 4 = 8

S = 50 = a + b + c + d + e + f + g + h

g = 50 - a - b - c - d - e - f - h = → g = 50 - 6 - 2 - 10 - 8 - 4 - 6 - 10 = 4

4.2)

Número total de resultados posibles = $n(S) = 50$

Número de resultados favorables = $n(E) = 6 + 2 + 10 + 8 + 4 + 6 + 4 = 40$

Entonces, aplicando la fórmula de la probabilidad teórica se obtiene:

$$P(E) = \frac{\text{número de resultados favorables}}{\text{número total de resultados posibles}} = \frac{n(E)}{n(S)} \Rightarrow P(A \text{ o } B \text{ o } C) = \frac{40}{50} = \frac{4}{5}$$

Nota:

Si A, B y C son tres eventos cualesquiera de modo que ocurra A o bien B o bien C o bien los tres a la vez se emplea la regla:

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(B \cap C) - P(A \cap C) + P(A \cap B \cap C)$$

Observando el diagrama de Venn-Euler se tiene que:

$$P(A) = \frac{6 + 2 + 4 + 8}{50} = \frac{20}{50} = \frac{2}{5}$$

$$P(B) = \frac{10 + 6 + 4 + 2}{50} = \frac{22}{50} = \frac{11}{25}$$

$$P(C) = \frac{4 + 8 + 4 + 6}{50} = \frac{22}{50} = \frac{11}{25}$$

$$P(A \cap B) = \frac{2 + 4}{50} = \frac{6}{50} = \frac{3}{25}$$

$$P(B \cap C) = \frac{6 + 4}{50} = \frac{10}{50} = \frac{1}{5}$$

$$P(A \cap C) = \frac{8 + 4}{50} = \frac{12}{50} = \frac{6}{25}$$


$$P(A \cap B \cap C) = \frac{4}{50} = \frac{2}{25}$$

Reemplazando valores en la regla se obtiene:

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(B \cap C) - P(A \cap C) + P(A \cap B \cap C)$$

$$P(A \cup B \cup C) = \frac{2}{5} + \frac{11}{25} + \frac{11}{25} - \frac{3}{25} - \frac{1}{5} - \frac{6}{25} + \frac{2}{25} = \frac{4}{5}$$

Los cálculos empleando Excel se muestran en la siguiente figura:



5) En una clase hay 45 estudiantes. Cada estudiante practica un solo deporte. La siguiente tabla muestra los diferentes deportes y el género de los estudiantes que lo practican.

Deporte \ Estudiante	Fútbol	Básquet	Atletismo	Total
Hombre	15	3	3	21
Mujer	5	12	7	24
Total	20	15	10	45

Si se elige un estudiante al azar, calcular la probabilidad de que:

- 5.1) Sea hombre o practique fútbol
- 5.2) Sea mujer o practique fútbol
- 5.3) Sea hombre o practique básquet
- 5.4) Sea mujer o practique atletismo

Solución:

A partir de la tabla anterior, llamada *tabla de contingencia*, se elabora una *tabla de probabilidades*, la cual se realiza dividiendo cada una de las entradas de la tabla de contingencia por el total. Los resultados se muestran en la siguiente tabla de probabilidades:

Deporte \ Estudiante	Fútbol	Básquet	Atletismo	Total
Hombre	15/45 = 1/3	3/45 = 1/15	3/45 = 1/15	21/45 = 7/15
Mujer	5/45 = 1/9	12/45 = 4/15	7/45	24/45 = 8/15
Total	20/45 = 4/9	15/45 = 1/3	10/45 = 2/9	45/45 = 1

Interpretación:

Los valores en las márgenes de la tabla ($4/9$, $1/3$, $2/9$, $7/15$ y $8/15$) se llaman *probabilidades marginales*, así por ejemplo, la probabilidad de seleccionar al azar un estudiante que sea mujer es $P(M) = 8/15$ y la probabilidad de seleccionar al azar un estudiante que practique atletismo es $P(A) = 2/9$.

Las *probabilidades conjuntas* en las celdas de la estructura principal de la tabla ($1/3$, $1/15$, $1/15$, $1/9$, $4/15$ y $7/45$) representan la probabilidad de la intersección entre dos eventos, así por ejemplo, la probabilidad de seleccionar un estudiante hombre que practique fútbol es $P(H \cap F) = 1/3$.

Una probabilidad marginal se calcula sumando las probabilidades conjuntas correspondientes, así por ejemplo, la probabilidad marginal de seleccionar al azar un estudiante que sea mujer es $P(M) = P(M \cap F) + P(M \cap B) + P(M \cap A)$, es decir, $P(M) = 1/9 + 4/15 + 7/45 = 8/15$

La suma de las probabilidades marginales verticales y horizontales da como resultado la unidad, así por ejemplo, $P(H) + P(M) = 7/15 + 8/15 = 1$ y $P(F) + P(B) + P(A) = 4/9 + 1/3 + 2/9 = 1$

5.1) Sea hombre o practique fútbol: $P(H \text{ o } F) = P(H \cup F)$

$$P(H \cup F) = P(H) + P(F) - P(H \cap F)$$
$$P(H \cup F) = \frac{7}{15} + \frac{4}{9} - \frac{1}{3} = \frac{26}{45}$$

5.2) Sea mujer o practique fútbol: $P(M \text{ o } F) = P(M \cup F)$

$$P(M \cup F) = P(M) + P(F) - P(M \cap F)$$
$$P(M \cup F) = \frac{8}{15} + \frac{4}{9} - \frac{1}{9} = \frac{13}{15}$$

5.3) Sea hombre o practique básquet: $P(H \text{ o } B) = P(H \cup B)$

$$P(H \cup B) = P(H) + P(B) - P(H \cap B)$$
$$P(H \cup B) = \frac{7}{15} + \frac{1}{3} - \frac{1}{15} = \frac{11}{15}$$

5.4) Sea mujer o practique atletismo: $P(M \text{ o } A) = P(M \cup A)$

$$P(M \cup A) = P(M) + P(A) - P(M \cap A)$$
$$P(M \cup A) = \frac{8}{15} + \frac{2}{9} - \frac{7}{45} = \frac{3}{5}$$

Los cálculos empleando Excel se muestran en la siguiente figura:

	A	B	C	D	E
1		Fútbol	Básquet	Atletismo	Total
2	Hombre	15	3	3	21
3	Mujer	5	12	7	24
4	Total	20	15	10	45
5					
6		Fútbol	Básquet	Atletismo	Total
7	Hombre	1/3	1/15	1/15	7/15
8	Mujer	1/9	4/15	7/45	8/15
9	Total	4/9	1/3	2/9	1
10					
11		Fútbol	Básquet	Atletismo	Total
12	Hombre	=B2/\$E\$4	=C2/\$E\$4	=D2/\$E\$4	=E2/\$E\$4
13	Mujer	=B3/\$E\$4	=C3/\$E\$4	=D3/\$E\$4	=E3/\$E\$4
14	Total	=B4/\$E\$4	=C4/\$E\$4	=D4/\$E\$4	=E4/\$E\$4
15					
16	P(H U F)	26/45	=E7+B9-B7		
17	P(M U F)	13/15	=E8+B9-B8		
18	P(H U B)	11/15	=E7+C9-C7		
19	P(M U A)	3/5	=E8+D9-D8		


ii) REGLA PARTICULAR O ESPECIAL PARA EVENTOS MUTUAMENTE EXCLUYENTES

Si A y B son dos eventos mutuamente excluyentes (eventos no intersecantes), es decir, si la ocurrencia de cualquiera de ellos excluye la del otro, no pueden ocurrir a la vez, o cuando no tienen ningún punto muestral en común ($A \cap B = \emptyset$), entonces se aplica la siguiente regla para calcular dicha probabilidad:

$$P(A \circ B) = P(A) + P(B)$$

o

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$



En donde:

El conectivo lógico “o” corresponde a la “unión” en la teoría de conjuntos ($\circ = \cup$)
 El espacio muestral (S) corresponde al conjunto universo en la teoría de conjuntos

Ejemplos ilustrativos

1) Sea A el suceso de sacar un As de una baraja estándar de 52 cartas y B sacar un Rey de corazón rojo. Calcular la probabilidad de sacar un As o un Rey de corazón rojo en una sola extracción.

Solución:

A y B son sucesos mutuamente excluyentes porque no es posible obtener ambos a la vez. Las probabilidades son:

$$P(A) = \frac{4}{52}$$

$$P(B) = \frac{1}{52}$$

Remplazando los anteriores valores en la regla particular de la adición de probabilidades para eventos mutuamente excluyentes se obtiene:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$
$$P(A \cup B) = \frac{4}{52} + \frac{1}{52} = \frac{5}{52}$$

2) En una urna existe 10 bolas numeradas del 1 al 10. ¿Qué probabilidad existe de sacar en una sola extracción una bola enumerada con un número impar o con un número múltiplo de 4?

Solución:

Espacio muestral = $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\} \Rightarrow n(S) = 10$

A = número impar = $\{1, 3, 5, 7, 9\}$


B = número múltiplo de 4 = $\{4, 8\}$

Resultados favorables = $A \cup B = \{1, 3, 5, 7, 9, 4, 8\} \Rightarrow n(E) = 7$

Entonces, aplicando la fórmula de la probabilidad teórica se obtiene:

$$P(E) = \frac{\text{número de resultados favorables}}{\text{número total de resultados posibles}} = \frac{n(E)}{n(S)} \Rightarrow P(A \cup B) = \frac{7}{10}$$

O también, realizando un diagrama de Venn-Euler se obtiene:



$$P(A) = \frac{5}{10}$$


$$P(B) = \frac{2}{10}$$

Entonces, aplicando la regla para eventos mutuamente excluyentes se obtiene:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$
$$P(A \cup B) = \frac{5}{10} + \frac{2}{10} = \frac{7}{10}$$

3) De una tómbola que contiene 3 bolas rojas, 5 blancas y 4 azules, Mathías extrae una bola, calcular la probabilidad de que la bola extraída sea:

- 3.1) Roja o Blanca
- 3.2) Roja o Azul
- 3.3) Blanca o Azul



Solución:

- R = Roja
- B = Blanca
- A = Azul

Número total de resultados posibles
 $= n(S) = 3 + 5 + 4 = 12$


3.1) Roja o Blanca (R o B)

Número de resultados favorables $= R \cup B = n(E) = 3 + 5 = 8$

Aplicando la fórmula de la probabilidad teórica se obtiene:

$$P(E) = \frac{\text{número de resultados favorables}}{\text{número total de resultados posibles}} = \frac{n(E)}{n(S)} \Rightarrow P(R \text{ o } B) = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}$$

O también, realizando un diagrama de Venn-Euler se obtiene:



$$P(R) = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$$

$$P(B) = \frac{5}{12}$$

Entonces, aplicando la regla para eventos mutuamente excluyentes se obtiene:

$$P(R \cup B) = P(R) + P(B)$$

$$P(R \cup B) = \frac{1}{4} + \frac{5}{12} = \frac{2}{3}$$


3.2) Roja o Azul (R o A)

Número de resultados favorables = $R \cup A = n(E) = 3 + 4 = 7$

Aplicando la fórmula de la probabilidad teórica se obtiene:

$$P(E) = \frac{\text{número de resultados favorables}}{\text{número total de resultados posibles}} = \frac{n(E)}{n(S)} \Rightarrow P(R \text{ o } A) = \frac{7}{12}$$

O también, realizando un diagrama de Venn-Euler se obtiene:



$$P(R) = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$$

$$P(A) = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$$

Entonces, aplicando la regla para eventos mutuamente excluyentes se obtiene:

$$P(R \cup A) = P(R) + P(A)$$

$$P(R \cup A) = \frac{1}{4} + \frac{1}{3} = \frac{7}{12}$$


3.3) Blanca o Azul (B o A)

Número de resultados favorables = $B \cup A = n(E) = 5 + 4 = 9$

Aplicando la fórmula de la probabilidad teórica se obtiene:

$$P(E) = \frac{\text{número de resultados favorables}}{\text{número total de resultados posibles}} = \frac{n(E)}{n(S)} \Rightarrow P(B \text{ o } A) = \frac{9}{12} = \frac{3}{4}$$

O también, realizando un diagrama de Venn-Euler se obtiene:



$$P(B) = \frac{5}{12}; P(A) = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$$

Entonces, aplicando la regla para eventos mutuamente excluyentes se obtiene:

$$P(B \cup A) = P(B) + P(A) = \frac{5}{12} + \frac{1}{3} = \frac{3}{4}$$

Los cálculos realizados empleando Excel se muestran en la siguiente figura:

	A	B	C	D	E
1	E	n(E)		P(E)	
2	R	3		1/4	=B2/\$B\$5
3	B	5		5/12	=B3/\$B\$5
4	A	4		1/3	=B4/\$B\$5
5	S	12	=SUMA(B2:B4)		
6		P(E)		P(E)	
7	R o B	2/3	=(B2+B3)/B5	2/3	=D2+D3
8	R o A	7/12	=(B2+B4)/B5	7/12	=D2+D4
9	B o A	3/4	=(B3+B4)/B5	3/4	=D3+D4

TAREA DE INTERAPRENDIZAJE N° 3

- 1) Consulte la biografía de Georg Cantor y de Euler. Realice un organizador gráfico de cada biografía
- 2) Realice un organizador gráfico sobre las definiciones básicas y clases de conjuntos
- 3) Consulte en la biblioteca o en el internet sobre: ¿El número cero es par o impar?
- 4) Encuentre 7 palabras ocultas relacionadas con conjuntos en la siguiente sopa de letras

D	Y	M	E	R	P	M	E	I	S	X	R	O
A	U	M	I	A	E	S	A	I	H	T	A	M
I	N	E	E	N	M	E	I	S	N	R	D	A
C	I	S	X	A	I	E	I	U	O	A	U	A
N	V	A	A	T	E	T	J	I	D	O	U	N
E	E	L	L	Y	E	S	O	I	C	A	V	A
T	R	L	A	E	D	N	L	I	O	U	A	Y
O	S	A	O	D	Y	A	S	E	B	I	E	D
P	O	U	D	Y	N	M	S	I	Y	B	A	Y
E	I	N	F	I	N	I	T	O	O	A	E	O
U	T	N	D	Y	A	N	A	Y	M	N	A	I
T	A	R	E	U	E	I	Y	L	I	M	E	R
N	A	T	G	T	F	A	C	A	E	E	O	A
C	I	O	N	O	I	C	U	L	C	N	I	M

5) Si $A = \{1,2,3,4,5,6\}$, $B = \{4,5,6,7,8,9,10\}$, $C = \{2,4,8,10\}$, $D = \{4,5,6\}$ y $E = \{2,4\}$. ¿Cuál de los conjuntos anteriores debería ocupar el papel del conjunto X en las siguientes proposiciones:

$$X \subset A \text{ y } X \subset B$$

6) ¿Cuáles y cuántos son los subconjuntos de $A = \{\text{vocales abiertas}\}$?

7) ¿Cuáles y cuántos son los subconjuntos de $A = \{x/x \text{ es dígito par}\}$?


D

8

8) Termine de llenar la siguiente tabla. Escriba el proceso empleado.

POR COMPRENSIÓN	POR EXTENSIÓN	CARDINALIDAD	CARDINALIDAD DEL CONJUNTO POTENCIA
$A = \{\text{letras de la palabra ala}\}$			$n[P(A)] = 4$
$B = \{x \in \mathbb{N} / 3 < x \leq 6\}$		$n(B) = 3$	
$C = \{x \in \mathbb{N} / x^2 + 3 = 12\}$	$C = \{3\}$		
$D = \{x \in \mathbb{N} / 16 < x < 24 \wedge x \text{ es par}\}$		$n(D) = 3$	
$E = \{x \in \mathbb{R} / x^2 - 5x + 6 = 0\}$			$n[P(E)] = 4$
$F = \{x \in \mathbb{R} / x^4 - 5x^2 + 4 = 0\}$		$n(F) = 4$	
$G = \{x \in \mathbb{R} / x^3 - x^2 - 14x + 24 = 0\}$			$n[P(G)] = 8$
$H = \{x \in \text{Dígitos} / 9^{x+1} - 3^x = 6534\}$		$n(H) = 1$	
$I = \{x \in \text{Dígitos} / \log(x - 2) + \log x = \log 8\}$			$n[P(I)] = 2$

9) Dados los siguientes diagramas de Venn, llene la siguiente tabla



Conjunto	Diagrama de Venn
$(A \cup B)'$	
$A' \cup B'$	
$A \cap B'$	
$A' \cup B$	
$A \cap B$	
A'	

10) Si $A = \{x/x \text{ es un dígito par}\}$; $B = \{x/x \text{ es un dígito impar}\}$ y $C = \{x/x \text{ es un dígito primo}\}$

Realizar los cálculos respectivos con sus gráficos y escribir si es verdadero o falso los siguientes enunciados:

- a) $A \cup B = \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$
- b) $A \cup C = \{0,2,3,4,5,6,7,8\}$
- c) $B \cup C = \{1,2,3,5,7,9\}$
- d) $A \cap B = \emptyset$
- e) $A \cap C = \{2\}$
- f) $B \cap C = \{3,5,7\}$

11) Dado los conjuntos A, B y C del ejercicio anterior. Realizar las siguientes operaciones con sus respectivos diagramas de Venn-Euler.

- a) $A - B$
- b) $A \cap B$
- c) $A - C$
- d) $B - C$
- e) $B - A$
- f) $C - A$
- g) $C - B$

a) A ; b) \emptyset ; c) {0,4,6,8}; d) {1,9}; e) B; f) {3,5,7}; g) {2}

12) En una urna existe 10 bolas numeradas del 1 al 10. Elabore un diagrama de Venn y calcule la cardinalidad del conjunto de bolas enumeradas con un número par y primo.

1

13) En una urna existe 10 bolas numeradas del 1 al 10. Elabore un diagrama de Venn y calcule la cardinalidad del conjunto de bolas enumeradas con un número impar o con un número múltiplo de 4?

7

14) De 36 estudiantes de un curso, 21 no tienen dificultades de aprendizaje en Matemática, 27 no las tienen en lenguaje y 4 tienen dificultades únicamente en lenguaje. ¿Cuántos estudiantes tienen dificultades de aprendizaje únicamente en Matemática

10

15) Sea A el suceso de sacar un Rey de una baraja estándar de 52 cartas y B sacar una carta con corazón rojo. Calcular la probabilidad de sacar un Rey o un corazón rojo o ambos en una sola extracción.

4/13

16) Sea A el suceso de sacar un Rey de una baraja estándar de 52 cartas y B sacar una Reina de corazón rojo. Calcular la probabilidad de sacar un Rey o Reina de corazón rojo en una sola extracción.

5/52

17) Sea A el suceso de sacar una Reina de una baraja estándar de 52 cartas y B sacar una carta con corazón negro. Calcular la probabilidad de sacar una Reina o un corazón negro o ambas en una sola extracción.

4/13

18) Sea A el suceso de sacar una Reina de una baraja estándar de 52 cartas y B sacar un As. Calcular la probabilidad de sacar una Reina o un As en una sola extracción.

2/13

19) Plantee y resuelva dos problemas de aplicación similares a los anteriores.

20) En una urna existen 10 bolas numeradas del 1 al 10. Elabore un diagrama de Venn-Euler y calcule la probabilidad de obtener en una sola extracción una bola enumerada con un número impar o con un número múltiplo de 5.

3/5

21) Plantee y resuelva un problema similar al anterior.

22) En una urna existen 10 bolas numeradas con los números dígitos. Elabore un diagrama de Venn-Euler y calcule la probabilidad de obtener en una sola extracción una bola enumerada con un número par o con un número divisor de 9.

4/5

23) De una tómbola que contiene 5 bolas rojas, 3 blancas y 2 azules, se extrae una bola. Elabore un diagrama de Venn-Euler y calcule la probabilidad de manera manual y empleando Excel de que la bola extraída sea:

a) Roja o Blanca

4/5

b) Roja o Azul

7/10

24) Plantee y resuelva un problema similar al anterior.

25) Un dado tiene tres caras blancas numeradas con 4, 5 y 6, y tres caras rojas numeradas con 1, 2 y 3. Si se lanza una vez este dado. Elabore un diagrama de Venn-Euler y calcule la probabilidad de obtener un número par o una cara blanca.

2/3

26) En un grupo de jóvenes, 22 estudian, 7 solamente estudian, 8 solamente trabajan y 10 no estudian ni trabajan. Elabore un diagrama de Venn-Euler y calcule la probabilidad de manera manual y empleando Excel que de un joven seleccionado al azar estudie o trabaje o ambas actividades a la vez.

3/4

27) A la empresa D & M, 15 trabajadores se trasladan solamente en vehículo particular, 18 en transporte público, 10 solamente en transporte público y 7 se trasladan mediante otros medios. Elabore un diagrama de Venn-Euler y calcule la probabilidad de manera manual y empleando Excel que de un trabajador seleccionado al azar se transporte a la empresa D & M en vehículo particular o transporte público o ambos transportes a la vez.

33/40

28) Plantee y resuelva un problema similar al anterior de manera manual y empleando Excel.

29) En un grupo de deportistas, 18 practican el básquet, 8 el atletismo y fútbol, 4 solamente el fútbol, 4 solamente el atletismo, 6 fútbol y básquet, pero no atletismo, 2 atletismo y básquet, pero no fútbol, 2 practican los tres deportes, y 8 practican otros deportes. Elabore un diagrama de Venn-Euler y calcule la probabilidad de manera manual y empleando Excel que de un deportista seleccionado al azar practique por lo menos uno de estos tres deportes.

4/5

30) En un grupo de fábricas, 18 confeccionan ropa deportiva, 12 ropa deportiva y formal, 10 ropa casual y formal, 9 ropa deportiva y casual, 2 solamente ropa formal, 4 solamente ropa casual, 5 ropa deportiva y casual, pero no formal, y 10 confeccionan otros artículos. Elabore un diagrama de Venn-Euler y calcule la probabilidad de manera manual y empleando Excel que de una fábrica seleccionada al azar confeccione por lo menos una de estas tres tipos de ropas.

3/4

31) En un grupo de 70 personas, 15 solamente prefieren el color amarillo, 10 solamente prefieren el color rojo, 20 solamente prefieren el color verde, 13 prefieren el color amarillo y rojo, 11 prefieren el color rojo y verde, 10 prefieren el color amarillo y verde, y 7 prefieren otros colores. Elabore un diagrama de Venn-Euler y calcule la probabilidad de manera manual y empleando Excel que de una persona seleccionada al azar tenga por preferencia por lo menos uno de los tres colores.

63/70

32) La siguiente tabla muestra el nombre y la edad de los integrantes de una familia ecuatoriana

Nombre	Emily	Mathías	Dyanita	Mario	Bertha	Segundo	Victoria	Alberto	Carmen
Edad (años)	3	9	41	39	70	68	68	69	78

a) Llene la siguiente tabla de contingencia

Sexo \ Edad	Mayor de edad	Menor de edad	Total
Hombre			
Mujer			
Total			

b) A partir de la tabla anterior elabore de manera manual y empleando Excel una tabla de probabilidades

c) Si se elige una persona al azar, calcule la probabilidad de manera manual y empleando Excel de que sea hombre o menor de edad

5/9

d) Si se elige una persona al azar, calcule la probabilidad de manera manual y empleando Excel de que sea mujer o mayor de edad

8/9

33) El personal que labora en una institución educativa es de 50. Cada persona desempeña solo un cargo. La siguiente tabla muestra los diferentes cargos y el sexo del personal.

Sexo \ Cargo	Docente	Administrativo	Auxiliar	Total
Hombre	20	2	4	26
Mujer	15	2	7	24
Total	35	4	11	50

Si se elige una persona al azar, calcule la probabilidad de manera manual y empleando Excel de que:

a) Sea hombre o docente

41/25

b) Sea mujer o docente

22/25

c) Sea hombre o auxiliar

33/50

d) Sea mujer o administrativo

13/25

34) Plantee y resuelva de manera manual y empleando Excel un problema similar al anterior con datos de la institución educativa en la cual usted estudia.


C) REGLA DE LA MULTIPLICACIÓN DE PROBABILIDADES

i) REGLA GENERAL PARA EVENTOS DEPENDIENTES

Si A y B son dos eventos dependientes, es decir, si la ocurrencia de A afecta la probabilidad de ocurrencia de B, entonces, dicha probabilidad se calcula empleando la siguiente regla:

$$P(AyB) = P(A) \cdot P(B/A)$$

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B/A)$$



En donde:

El conectivo “y” corresponde a la “*intersección*” en la teoría de conjuntos ($y = \cap$)

El espacio muestral (S) corresponde al conjunto universo en la teoría de conjuntos

$P(B/A)$ = Probabilidad condicional de B, dado A

Nota:

La probabilidad del evento B, calculada bajo la suposición de que el evento A ha ocurrido, se denomina *probabilidad condicional de B, dado A*, y se denota por $P(B/A)$.

Si se desea obtener una fórmula para calcular la probabilidad condicional se despeja de la fórmula general de la multiplicación $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B/A)$, obteniéndose:

$$P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

La probabilidad condicional de A dado B se denota por $P(A/B)$ y se calcula empleando la siguiente fórmula:

$$P(A/B) = \frac{P(B \cap A)}{P(B)}$$

Ejemplos ilustrativos

1) De una baraja estándar de 52 cartas sea A el suceso de sacar un As en la primera extracción y B sacar un As en la segunda extracción. Calcular la probabilidad de sacar dos Ases en dos extracciones sin devolver la carta extraída.

Solución:

A y B son sucesos dependientes porque la ocurrencia de A afecta la probabilidad de ocurrencia de B.

La probabilidad de que la primera carta sea un As es:

$$P(A) = \frac{4}{52}$$

La probabilidad de que la segunda carta sea un As, dado que ya se sacó un As en la primera extracción, es:

$$P(B/A) = \frac{3}{51}$$

Remplazando los anteriores valores en la regla general de la multiplicación de probabilidades para eventos dependientes se obtiene:

$$P(AyB) = P(A) \cdot P(B/A)$$

$$P(AyB) = \frac{4}{52} \cdot \frac{3}{51} = \frac{1}{221}$$

2) Sea A el suceso de sacar un As de una baraja estándar de 52 cartas y B sacar un Rey de corazón rojo. Calcular la probabilidad de sacar un As y un Rey de corazón rojo en dos extracciones sin devolver la carta extraída.

Solución:

A y B son sucesos dependientes porque la ocurrencia de A afecta la probabilidad de ocurrencia de B.

La probabilidad de que la primera carta sea un As es:

$$P(A) = \frac{4}{52}$$

La probabilidad de que la segunda carta sea un Rey, dado que ya se sacó un As en la primera extracción es:

$$P(B/A) = \frac{1}{51}$$

Remplazando los anteriores valores en la regla general de la multiplicación de probabilidades para eventos dependientes se obtiene:

$$P(AyB) = P(A) \cdot P(B/A)$$

$$P(AyB) = \frac{4}{52} \cdot \frac{1}{51} = \frac{1}{663}$$

3) En una urna existe 10 bolas numeradas del 1 al 10. ¿Qué probabilidad existe de sacar en una sola extracción una bola enumerada con un número par y primo?

Solución:

$$\text{Espacio muestral} = S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\} \Rightarrow n(S) = 10$$

$$A = \text{número par} = \{2, 4, 6, 8, 10\}$$


$$B = \text{número primo} = \{2, 3, 5, 7\}$$

$$\text{Resultados favorables} = A \cap B = \{2\} \Rightarrow n(E) = 1$$

Entonces, aplicando la fórmula de la probabilidad teórica se obtiene:

$$P(E) = \frac{\text{número de resultados favorables}}{\text{número total de resultados posibles}} = \frac{n(E)}{n(S)} \Rightarrow P(A \text{ y } B) = \frac{1}{10}$$

O también, realizando un diagrama de Venn-Euler se obtiene directamente la probabilidad solicitada



$$P(A \cap B) = \frac{1}{10}$$

Para aplicar la regla de la multiplicación para eventos dependientes, observando el diagrama de Venn-Euler se tiene:

$$P(A) = \frac{5}{10}$$

La suposición de que la bola seleccionada esté numerada con un número par significa que sólo consideremos el conjunto $A = \text{número par} = \{2, 4, 6, 8, 10\}$, de estos 5 elementos, sólo uno, el número 2 es primo. Por lo tanto la probabilidad condicional $P(B/A) = 1/5$

Remplazando valores en la regla de la multiplicación para eventos dependientes se obtiene:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B/A)$$

$$P(A \cap B) = \frac{5}{10} \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{10}$$


4) En una clase de 50 alumnos, 10 alumnos tienen como preferencia solamente la asignatura de Matemática, 15 prefieren solamente Estadística y 5 no tienen preferencia por ninguna de estas asignaturas. Calcular la probabilidad que de un alumno de la clase seleccionado al azar tenga preferencia por

4.1) Matemática y Estadística.

4.2) Estadística y Matemática

Solución:

Realizando un diagrama de Venn-Euler se obtiene:



Simbología:

S = espacio muestral

A = Matemática

B = Estadística

- a = Solamente Matemática
- b = Solamente Estadística
- c = Matemática y Estadística
- d = Ninguna de las dos asignaturas

Datos y cálculos:

$$a = 10$$

$$b = 15$$

$$c = S - a - b - d = 50 - 10 - 15 - 5 = 20$$

$$d = 5$$

$$S = 50$$

4.1) Matemática y Estadística.

$$\text{Número de resultados favorables} = A \cap B = n(E) = 20$$

$$\text{Número total de resultados posibles} = n(S) = 50$$

Entonces, aplicando la fórmula de la probabilidad teórica se obtiene:

$$P(E) = \frac{\text{número de resultados favorables}}{\text{número total de resultados posibles}} = \frac{n(E)}{n(S)} \Rightarrow P(A \cap B) = \frac{20}{50} = \frac{2}{5}$$

O también, observando el diagrama de Venn-Euler se tiene directamente la probabilidad solicitada:

$$P(A \cap B) = \frac{20}{50} = \frac{2}{5}$$

Para aplicar la regla de la multiplicación para eventos dependientes, observando el diagrama de Venn-Euler se tiene:

$$P(A) = \frac{30}{50} = \frac{3}{5}$$

La suposición de que el alumno seleccionado tenga preferencia por Matemática significa que sólo consideremos el conjunto A, de los 30 elementos de A, sólo 20 tienen preferencia por Estadística. Por lo tanto la probabilidad condicional $P(B/A) = 20/30 = 2/3$

O también, observando el diagrama de Venn-Euler y aplicando la fórmula de la probabilidad condicional se tiene:

$$P(B/A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)} = \frac{\frac{2}{5}}{\frac{3}{5}} = \frac{2}{3}$$

Remplazando valores en la regla de la multiplicación para eventos dependientes se obtiene:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B/A)$$

$$P(A \cap B) = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{5}$$

4.2) Estadística y Matemática.

Número de resultados favorables = $B \cap A = n(E) = 20$

Número total de resultados posibles = $n(S) = 50$

Entonces, aplicando la fórmula de la probabilidad teórica se obtiene:

$$P(E) = \frac{\text{número de resultados favorables}}{\text{número total de resultados posibles}} = \frac{n(E)}{n(S)} \Rightarrow P(B \cap A) = \frac{20}{50} = \frac{2}{5}$$

O también observando el diagrama de Venn-Euler se tiene directamente la probabilidad solicitada:

$$P(B \cap A) = \frac{20}{50} = \frac{2}{5}$$

Para aplicar la regla de la multiplicación para eventos dependientes, observando el diagrama de Venn-Euler se tiene:

$$P(B) = \frac{35}{50} = \frac{7}{10}$$

La suposición de que el alumno seleccionado tenga preferencia por Estadística significa que sólo consideremos el conjunto B, de los 35 elementos de B, sólo 20 tienen preferencia por Matemática. Por lo tanto la probabilidad condicional $P(A/B) = 20/35 = 4/7$

Remplazando valores en la regla general de la multiplicación:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B/A) \Rightarrow P(B \cap A) = P(B) \cdot P(A/B)$$

$$P(B \cap A) = \frac{7}{10} \cdot \frac{4}{7} = \frac{2}{5}$$

Los cálculos empleando Excel se muestran en la siguiente figura:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
1	E	n(E)		P(E)									
2	a	10											
3	b	15											
4	c	20	=B6-B2-B3-B5										
5	d	5											
6	S	50											
7	A	30	=B2+B4	3/5	=B7/B6								
8	B	35	=B3+B4	7/10	=B8/B6								
9													
10	B/A	20	=B4	2/3	=B10/B7								
11	A ∩ B	20	=B4	2/5	=B11/B6								
12				2/5	=D7*D10	$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B/A)$							
13													
14	A/B	20	=B4	4/7	=B14/B8								
15	B ∩ A	20	=B4	2/5	=B15/B6								
16				2/5	=D8*D14	$P(B \cap A) = P(B) \cdot P(A/B)$							

Notas:

En los eventos dependientes se cumple:

$$P(B/A) \neq P(A/B)$$

El resultado de $P(A \cap B) = P(B \cap A)$, sin embargo, el proceso de cálculo es diferente.

5) En la tabla de contingencia que aparece a continuación se ha registrado el color de ojos de 40 estudiantes.

Sexo \ Ojos	Café	Verde	Negro	Total
Hombre	12	1	2	15
Mujer	20	3	2	25
Total	32	4	4	40

5.1) Se selecciona un estudiante al azar, calcule la probabilidad de que el estudiante seleccionado:

- a) Sea hombre y tenga los ojos negros
- b) Tenga los ojos verdes, sabiendo que se trata de una mujer

5.2) Se selecciona dos estudiantes al azar, calcule la probabilidad de que los estudiantes seleccionados:

- a) Los dos sean hombres
- b) Un hombre y una mujer
- c) Los dos tengan los ojos de color café
- d) Ojos no verdes el primer estudiante y ojos no negros el segundo estudiante
- e) Los dos no tengan los ojos de color café
- f) Hombre de ojos café el primer estudiante y mujer de ojos verdes el segundo estudiante

Solución:

Elaborando una tabla de probabilidades se tiene:

Sexo \ Ojos	Café	Verde	Negro	Total
Hombre	$12/40 = 3/10$	$1/40$	$2/40 = 1/20$	$15/40 = 3/8$
Mujer	$20/40 = 1/2$	$3/40$	$2/40 = 1/20$	$25/40 = 5/8$
Total	$32/40 = 4/5$	$4/40 = 1/10$	$4/40 = 1/10$	$40/40 = 1$

5.1) Se selecciona un estudiante al azar, calcule la probabilidad de que el estudiante seleccionado:

- a) Sea hombre y tenga los ojos negros
- La probabilidad de que un estudiante sea hombre es:

$$P(H) = \frac{15}{40} = \frac{3}{8}$$

De 15 hombres existen 2 estudiantes que tienen los ojos de color negro, entonces, la probabilidad de que tenga los ojos de color negro, siempre que sea hombre es:

$$P(N/H) = \frac{2}{15}$$

O también, observando la tabla de probabilidades y aplicando la fórmula de la probabilidad condicional se tiene:

$$P(N/H) = \frac{P(N \cap H)}{P(H)} = \frac{\frac{1}{20}}{\frac{3}{8}} = \frac{2}{15}$$

Remplazando valores en la regla general de la multiplicación se obtiene:

$$P(AyB) = P(A) \cdot P(B/A)$$

$$P(HyN) = P(H) \cdot P(N/H)$$

$$P(HyN) = \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{15} = \frac{1}{20}$$

Nota: Si observamos directamente en la tabla de contingencia, se tiene que 2 de los 40 estudiantes son “hombres y tienen los ojos negros”, que en la tabla de probabilidades representa 1/20. Esto confirma que con la regla general para la multiplicación de probabilidades sí se obtiene la respuesta correcta.

b) Tenga los ojos verdes, sabiendo que se trata de una mujer

La probabilidad de que un estudiante tenga los ojos verdes es:

$$P(V) = \frac{4}{40} = \frac{1}{10}$$

Existen 3 mujeres de 4 estudiantes que tienen los ojos de color verde, entonces, la probabilidad de que sea mujer, siempre que tenga los ojos de color verde es:

$$P(M/V) = \frac{3}{4}$$

Remplazando valores en la regla general de la multiplicación se obtiene:

$$P(AyB) = P(A) \cdot P(B/A)$$

$$P(VyM) = P(V) \cdot P(M/V)$$

$$P(VyM) = \frac{1}{10} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{40}$$

O también, observando directamente en la tabla de probabilidades se obtiene:

$$P(VyM) = \frac{3}{40}$$

Los cálculos empleando Excel se muestran en la siguiente figura:

	A	B	C	D	E	F	G
1		Café	Verde	Negro	Total		
2	Hombre	12	1	2	15		
3	Mujer	20	3	2	25		
4	Total	32	4	4	40		
5							
6		Café	Verde	Negro	Total		
7	Hombre	3/10	1/40	1/20	3/8		
8	Mujer	1/2	3/40	1/20	5/8		
9	Total	4/5	1/10	1/10	1		
10							
11	P(H)	3/8	=E7				
12	P(N/H)	2/15	=D2/E2				
13	P(HyN)	1/20	=B11*B12		$P(HyN) = P(H) \cdot P(N/H)$		
14		1/20	=D7				
15							
16	P(V)	1/10	=C9				
17	P(M/V)	3/4	=C3/C4				
18	P(VyM)	3/40	=B16*B17		$P(VyM) = P(V) \cdot P(M/V)$		
19		3/40	=C8				

5.2) Se selecciona dos estudiantes al azar, calcule la probabilidad de que los estudiantes seleccionados:

Sexo \ Ojos	Café	Verde	Negro	Total
Hombre	12	1	2	15
Mujer	20	3	2	25
Total	32	4	4	40

a) Los dos sean hombres

La probabilidad de que el primer estudiante seleccionado sea hombre es:

$$P(H) = \frac{15}{40} = \frac{3}{8}$$

La probabilidad de que el segundo estudiante seleccionado sea hombre, dado que ya se seleccionó un hombre en la primera extracción es:

$$P(H/H) = \frac{14}{39}$$

Remplazando valores en la regla general de la multiplicación se obtiene:

$$P(AyB) = P(A) \cdot P(B/A)$$

$$P(HyH) = P(H) \cdot P(H/H)$$

$$P(HyH) = \frac{3}{8} \cdot \frac{14}{39} = \frac{7}{52}$$

b) Un hombre y una mujer

La probabilidad de que el primer estudiante seleccionado sea hombre es:

$$P(H) = \frac{15}{40} = \frac{3}{8}$$

La probabilidad de que el segundo estudiante seleccionado sea mujer, dado que ya se seleccionó un estudiante hombre en la primera extracción es:

$$P(M/H) = \frac{25}{39}$$

Remplazando valores en la regla general de la multiplicación se obtiene:

$$P(AyB) = P(A) \cdot P(B/A)$$

$$P(HyM) = P(H) \cdot P(M/H)$$

$$P(HyM) = \frac{3}{8} \cdot \frac{25}{39} = \frac{25}{104}$$

c) Los dos tengan los ojos de color café

La probabilidad de que el primer estudiante seleccionado tenga los ojos de color café es:

$$P(C) = \frac{32}{40} = \frac{4}{5}$$

La probabilidad de que el segundo estudiante seleccionado tenga los ojos de color café, dado que ya se seleccionó un estudiante que tiene los ojos de color café en la primera extracción es:

$$P(C/C) = \frac{31}{39}$$

Remplazando valores en la regla general de la multiplicación se obtiene:

$$P(AyB) = P(A) \cdot P(B/A)$$

$$P(CyC) = P(C) \cdot P(C/C)$$

$$P(CyC) = \frac{4}{5} \cdot \frac{31}{39} = \frac{124}{195}$$

d) Ojos no verdes el primer estudiante y ojos no negros el segundo estudiante

La probabilidad de que el primer estudiante seleccionado no tenga los ojos de color verde es:

$$P(\bar{V}) = 1 - P(V) = 1 - \frac{4}{40} = \frac{9}{10}$$

O también como el número de estudiantes que no tienen los ojos de color verde son $32 + 4 = 36$, entonces,

$$P(\bar{V}) = \frac{36}{40} = \frac{9}{10}$$

La probabilidad de que el segundo estudiante seleccionado no tenga los ojos de color negro, dado que ya se seleccionó un estudiante que no tiene los ojos de color verde en la primera extracción es:

$$P(\bar{N}/\bar{V}) = 1 - P(N/\bar{V}) = 1 - \frac{4}{39} = \frac{35}{39}$$

O también observando la tabla de contingencia se obtiene:

$$P(\bar{N}/\bar{V}) = \frac{36 - 1}{40 - 1} = \frac{35}{39}$$

Remplazando valores en la regla general de la multiplicación se obtiene:

$$P(AyB) = P(A) \cdot P(B/A)$$

$$P(\bar{V}y\bar{N}) = P(\bar{V}) \cdot P(\bar{N}/\bar{V})$$

$$P(\bar{V}y\bar{N}) = \frac{9}{10} \cdot \frac{35}{39} = \frac{21}{26}$$

e) Los dos no tengan los ojos de color café

La probabilidad de que el primer estudiante seleccionado no tenga los ojos de color café es:

$$P(\bar{C}) = 1 - P(C) = 1 - \frac{32}{40} = \frac{1}{5}$$

O también como el número de estudiantes que no tienen los ojos de color café son $4 + 4 = 8$, entonces,

$$P(\bar{C}) = \frac{8}{40} = \frac{1}{5}$$

La probabilidad de que el segundo estudiante seleccionado no tenga los ojos de color café, dado que ya se seleccionó un estudiante que no tiene los ojos de color café en la primera extracción es:

$$P(\bar{C}/\bar{C}) = 1 - P(C/\bar{C}) = 1 - \frac{32}{39} = \frac{7}{39}$$

O también observando la tabla de contingencia se obtiene:

$$P(\bar{C}/\bar{C}) = \frac{8 - 1}{40 - 1} = \frac{7}{39}$$

Remplazando valores en la regla general de la multiplicación se obtiene:

$$P(AyB) = P(A) \cdot P(B/A)$$

$$P(\bar{C}y\bar{C}) = P(\bar{C}) \cdot P(\bar{C}/\bar{C})$$

$$P(\bar{C}y\bar{C}) = \frac{1}{5} \cdot \frac{7}{39} = \frac{7}{195}$$

f) Hombre de ojos café el primer estudiante y mujer de ojos verdes el segundo estudiante

Si observamos directamente en la tabla de contingencia, se tiene que 12 de los 40 estudiantes son “hombres y tienen los ojos de color café”, entonces, la probabilidad de que el primer estudiante seleccionado sea hombre y tenga los ojos de color café es:

$$P(HyC) = \frac{12}{40} = \frac{3}{10}$$

Si observamos directamente en la tabla de contingencia, se tiene que 12 de los 40 estudiantes son “hombres y tienen los ojos de color café”, entonces, la probabilidad de que el primer estudiante seleccionado sea hombre y tenga los ojos de color café es:

Si observamos directamente en la tabla de contingencia, se tiene que 3 de los 40 estudiantes son “mujeres y tienen los ojos de color verde”, entonces, la probabilidad de que el segundo estudiante seleccionado sea mujer y tenga los ojos de color verde, dado que ya se seleccionó un estudiante hombre que tiene los ojos de color café en la primera extracción es:

$$P((MyV)/(HyC)) = \frac{3}{39}$$

Remplazando valores en la regla general de la multiplicación se obtiene:

$$P(AyB) = P(A) \cdot P(B/A)$$

$$P((HyC)y(MyV)) = P(HyC) \cdot P((MyV)/(HyC))$$

$$P((HyC)y(MyV)) = \frac{3}{10} \cdot \frac{3}{39} = \frac{3}{130}$$

Los cálculos empleando Excel se muestran en la siguiente figura:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Café	Verde	Negro	Total					
2	Hombre	12	1	2	15					
3	Mujer	20	3	2	25					
4	Total	32	4	4	40					
5										
6	P(HyH)	7/52	=E2/E4*(E2-1)/(E4-1)				P(HyH) = P(H) · P(H/H)			
7										
8	P(HyM)	25/104	=E2/E4*E3/(E4-1)				P(HyM) = P(H) · P(M/H)			
9										
10	P(CyC)	124/195	=B4/E4*(B4-1)/(E4-1)				P(CyC) = P(C) · P(C/C)			
11										
12	P(V̄yN̄)	21/26	=(B4+D4)/E4*(B4+C4-1)/(E4-1)				P(V̄yN̄) = P(V̄) · P(N̄/V̄)			
13										
14	P(C̄yC̄)	7/195	=(C4+D4)/E4*(C4+D4-1)/(E4-1)				P(C̄yC̄) = P(C̄) · P(C̄/C̄)			
15										
16	P((HyC)y(MyV))	3/130	=B2/E4*C3/(E4-1)				P((HyC)y(MyV)) = P(HyC) · P((MyV)/(HyC))			

6) De una tómbola que contiene 3 bolas rojas y 5 blancas, Mathías extrae tres bolas, sin volver a la tómbola la bola extraída, calcular la probabilidad de que las 3 bolas extraídas sean:

6.1) Rojas

6.2) 2 rojas y una blanca

6.3) Una roja y 2 blancas

6.4) 3 blancas

Solución:

6.1) Rojas

En 3 sucesos la fórmula de la regla general de probabilidades es:

$$P(AyByC) = P(A) \cdot P(B/A) \cdot P(C/AyB)$$

La probabilidad de seleccionar una bola roja la primera extracción es:

$$P(R) = \frac{3}{8}$$

La probabilidad de seleccionar una bola roja la segunda extracción, dado que ya se seleccionó una bola roja en la primera extracción es:

$$P(R/R) = \frac{2}{7}$$

La probabilidad de seleccionar una bola roja la tercera extracción, dado que ya se seleccionó una bola roja en la primera y en la segunda extracción es:

$$P(R/RyR) = \frac{1}{6}$$


Remplazando valores en la regla general de la multiplicación se obtiene:

$$P(AyByC) = P(A) \cdot P(B/A) \cdot P(C/AyB)$$

$$P(RyRyR) = P(R) \cdot P(R/R) \cdot P(R/RyR)$$

$$P(RyRyR) = \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{56}$$

O también, elaborando un diagrama de árbol se tiene todas las probabilidades:



En el diagrama de árbol, la probabilidad correspondiente a cada rama del árbol corresponde a la probabilidad condicional de que ocurra el evento específico, dado que han ocurrido los eventos de las ramas precedentes. Al describir un evento mediante una trayectoria a través del diagrama de árbol, la probabilidad de que ocurra dicho evento es igual a producto de las probabilidades de las ramas que forman la trayectoria que representa al mencionado evento.

La solución empleando el diagrama de árbol para $P(RyRyR)$ es multiplicando las ramas RRR, es decir,

$$P(RRR) = \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{56}$$

6.2) 2 rojas y una blanca

La solución empleando el diagrama de árbol se obtiene multiplicando las ramas RRB

$$P(RRB) = \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} \cdot \frac{5}{6} = \frac{5}{56}$$

6.3) Una roja y 2 blancas

La solución empleando el diagrama de árbol se obtiene multiplicando las ramas RBB

$$P(RBB) = \frac{3}{8} \cdot \frac{5}{7} \cdot \frac{4}{6} = \frac{5}{28}$$

6.4) 3 blancas

La solución empleando el diagrama de árbol se obtiene multiplicando las ramas BBB

$$P(BBB) = \frac{5}{8} \cdot \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} = \frac{5}{28}$$

Los cálculos empleando Excel se muestran en la siguiente figura:

	A	B	C	D	E
1	R	3			
2	B	5			
3	Total	8			
4					
5	P(RRR)	1/56	=B1/B3*(B1-1)/(B3-1)*(B1-2)/(B3-2)		
6	P(RRB)	5/56	=B1/B3*(B1-1)/(B3-1)*B2/(B3-2)		
7	P(RBB)	5/28	=B1/B3*B2/(B3-1)*(B2-1)/(B3-2)		
8	P(BBB)	5/28	=B2/B3*(B2-1)/(B3-1)*(B2-2)/(B3-2)		

ii) REGLA PARTICULAR O ESPECIAL PARA EVENTOS INDEPENDIENTES

Si A y B son dos eventos independientes, es decir, si el conocimiento de la incidencia de uno de ellos no tiene efecto en la probabilidad de ocurrencia del otro, entonces, para calcular la probabilidad de dichos eventos se aplica la siguiente regla:

$$P(AyB) = P(A) \cdot P(B)$$

o

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Nota: Dos eventos A y B son independientes si la ocurrencia de uno de ellos no afecta la probabilidad de ocurrencia del otro, esto es, si $P(B/A) = P(B)$

Ejemplos ilustrativos

1) De una baraja estándar de 52 cartas sea A el suceso de sacar un As en la primera extracción y B sacar un Rey en la segunda extracción. Calcular la probabilidad de sacar un As y un Rey en dos extracciones devolviendo la carta extraída.

Solución:

A y B son sucesos independientes porque la ocurrencia de A afecta la probabilidad de ocurrencia de B.

La probabilidad de que la primera carta sea un As es:

$$P(A) = \frac{4}{52}$$

La probabilidad de que la segunda carta sea un Rey, dado que se devolvió el As de la primera extracción, es:

$$P(B/A) = P(B) = \frac{4}{52}$$

Remplazando los anteriores valores en la regla particular de la multiplicación se obtiene:

$$P(AyB) = P(A) \cdot P(B)$$


$$P(AyB) = \frac{4}{52} \cdot \frac{4}{52} = \frac{1}{169}$$

2) Una pareja de esposos desean tener 3 hijos. Suponiendo que las probabilidades de tener un niño o una niña son iguales, calcular la probabilidad de éxito en tener hombre en el primer nacimiento, mujer en el segundo nacimiento y hombre en el tercer nacimiento.

Solución:

M = mujer
H = hombre

Elaborando un diagrama de árbol se tiene todas las probabilidades:



Entonces,

$$P(HyMyH) = P(HMH) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$

TAREA DE INTERAPRENDIZAJE N° 4

1) De una baraja estándar de 52 cartas sea A el suceso de sacar un Rey en la primera extracción y B sacar un Rey en la segunda extracción. Calcular la probabilidad de sacar Rey y Rey, sin devolver la carta extraída.

1/221

2) Se tienen tres ruletas con 9 símbolos, se gana el premio mayor cuando se obtienen tres 3. ¿Cuál es la probabilidad de ganar el premio mayor?

1/729

3) De una baraja estándar de 52 cartas sea A el suceso de sacar un Rey en la primera extracción y B sacar una Reina en la segunda extracción. Calcular la probabilidad de sacar Rey y Reina, devolviendo la carta extraída.

1/169

4) En un sobre hay tres cartulinas: una blanca, una amarilla y una roja. ¿Qué probabilidad existe de obtener tres veces consecutivas la cartulina roja si se vuelve a guardar lo que se sacó anteriormente?

1/27

5) En un cesto hay 5 manzanas y 4 peras; en un segundo cesto, 3 manzanas y 2 naranjas. Si los cestos se encuentran totalmente cubiertos, ¿qué probabilidad existe de que al sacar una fruta de cada cesto se obtengan manzanas?

1/3

6) Se colocan 9 frascos de esencias en una caja, 5 son de vainilla y 4 de menta. Calcular la probabilidad de sacar dos frascos de vainilla en dos extracciones consecutivas, si se utiliza el extracto y se vuelve a guardar en la caja

25/81

7) Se tienen 15 fichas en una caja: 5 verdes, 5 amarillas y 5 azules. ¿Qué probabilidad existe de obtener en tres ocasiones consecutivas una ficha verde si se vuelve a guardar la que se sacó anteriormente?

1/27

8) Dyanita y Mario, una pareja de esposos, desean tener 2 hijos. Suponiendo que las probabilidades de tener un niño o una niña son iguales, calcular la probabilidad de éxito en tener hombre en el primer nacimiento y mujer en el segundo nacimiento. Elabore un diagrama de árbol.

1/4

9) En una urna existe 10 bolas numeradas del 1 al 10. ¿Qué probabilidad existe de sacar en una sola extracción una bola enumerada con un número impar y múltiplo de 3?

1/5

10) En una bandeja se tienen 15 sánduches, 7 de perrito y 8 de jamón. Si se brinda a dos amigos, calcule la probabilidad de manera manual y empleando Excel de que los dos amigos escojan sánduches de jamón cada uno. También elabore un diagrama de árbol.

4/15

11) En una caja hay 18 chocolates, 10 con relleno y 8 sin relleno. Si se realiza tres extracciones sin volver a guardar en la caja el chocolate extraído, calcule la probabilidad de manera manual y empleando Excel de que se obtengan tres chocolates rellenos. También elabore un diagrama de árbol.

5/34

12) En una urna existe 10 bolas numeradas del 1 al 10. Elabore un diagrama de Venn-Euler y calcule la probabilidad de obtener en una sola extracción una bola enumerada con un número impar y múltiplo de 5

1/10

13) Un dado tiene tres caras blancas numeradas 4, 5 y 6, y tres caras rojas numeradas 1, 2 y 3. Si se lanza una vez este dado. Elabore un diagrama de Venn-Euler y calcule la probabilidad de obtener una cara blanca numerada con un número par.

1/3

14) En una clase de 40 alumnos, 10 alumnos tienen como preferencia solamente la asignatura de Matemática, 15 prefieren solamente Estadística y 5 no tienen preferencia por ninguna de estas asignaturas. Elabore un diagrama de Venn-Euler y calcule la probabilidad de manera manual y empleando Excel de que un alumno seleccionado al azar tenga preferencia por Matemática y Estadística

1/4

15) En un grupo de 50 personas, 6 tienen como preferencia solamente el color amarillo, 10 prefieren solamente el color blanco, 4 prefieren solamente el color café, 6 prefieren el color amarillo y blanco, 10 prefieren el color blanco y café, 12 prefieren el color amarillo y café, y 10 no tienen preferencia por ninguno de los tres colores. Elabore un diagrama de Venn-Euler. Aplique la fórmula de la probabilidad de 3 sucesos para calcular la probabilidad de que una persona seleccionada al azar tenga preferencia por los 3 colores.

2/25

16) En un grupo de 60 fábricas, 4 confeccionan solamente ropa deportiva, 10 solamente ropa casual, 9 solamente ropa formal, 11 ropa casual y formal, 12 ropa deportiva y casual, 15 ropa deportiva y formal, y 11 confeccionan otros artículos. Elabore un diagrama de Venn-Euler y calcule la probabilidad de manera manual y empleando Excel que de una fábrica seleccionada al azar confeccione los tres tipos de ropas.

1/10

17) En una clase, la probabilidad de que los alumnos tengan como preferencia la asignatura de Matemática es $3/5$, la probabilidad de que los alumnos tengan como preferencia la asignatura de Estadística es $7/10$ y la probabilidad de que los estudiantes no prefieran ninguna de estas asignaturas es $1/10$. Elabore un diagrama de Venn-Euler y calcule la probabilidad de manera manual y empleando Excel de que un alumno seleccionado al azar

a) Tenga preferencia por Matemática y Estadística

2/5

b) Sabiendo que un alumno seleccionado al azar tiene preferencia por Matemática, calcule la probabilidad de que tenga preferencia por Estadística.

$P(E/M) = 2/3$

18) En la tabla de contingencia que aparece a continuación se ha registrado el deporte y el sexo de 45 estudiantes que lo practican.

Sexo \ Deporte	Fútbol	Atletismo	Básquet	Total
Hombre	15	3	2	20
Mujer	2	3	20	25
Total	17	6	22	45

- 18.1) Se selecciona un estudiante al azar, calcule la probabilidad de manera manual y empleando Excel de que el estudiante seleccionado:
- a) Sea hombre y practique básquet 2/45
 - b) Practique atletismo, sabiendo que se trata de una mujer 1/15
- 18.2) Se selecciona dos estudiantes al azar, calcule la probabilidad de manera manual y empleando Excel de que los estudiantes seleccionados:
- a) Los dos sean hombres 19/99
 - b) Un hombre y una mujer 25/99
 - c) Los dos practique fútbol 68/495
 - d) Que no practique atletismo el primer estudiante y que no practique básquet el segundo estudiante 13/30
- 19) Plantee y resuelva un problema similar al anterior de manera manual y empleando Excel.
- 20) Un recipiente contiene 3 bolas negras, 2 rojas y 5 blancas. ¿Cuál es la probabilidad de que, al hacer dos extracciones sucesivas, se obtenga una bola roja en la primera extracción y en la segunda extracción una bola negra, sin devolver a al recipiente la primera bola extraída?. Elabore un diagrama de árbol 1/15
- 21) De una urna que contiene 5 fichas de color rojo y 3 blancas, se extrae tres bolas, sin devolver a la urna la ficha extraída. Elabore un diagrama de árbol y calcule la probabilidad de manera manual y empleando Excel de que las 3 fichas extraídas sean 2 rojas y una blanca. 5/28
- 22) Dyanita va a una papelería a comprar 3 marcadores. En la papelería únicamente disponen de 6 marcadores de tinta rojos, 5 de tinta negra y 9 de tinta azul. Elabore un diagrama de árbol y calcule la probabilidad de manera manual y empleando Excel de que si Dyanita compra al lazar, compre un marcador con tinta azul y dos marcadores con tinta negra. 1/38
- 23) Plantee y resuelva un problema similar al anterior
- 24) Para integrar una comisión, se debe elegir a tres alumnos de entre 28 mujeres y 12 hombres. Se preparan papeles con los nombres de los integrantes y se introducen en una ánfora para elegir al azar. Elabore un diagrama de árbol y calcule la probabilidad de manera manual y empleando Excel de que la comisión esté formada por dos mujeres y un hombre. 15,304%
- 25) De una baraja estándar de 52 cartas, se extraen 3 cartas sin reposición. Elabore un diagrama de árbol y calcule la probabilidad de que las tres cartas sean Ases. 1/5525

1.4) PROBABILIDAD TOTAL Y TEOREMA DE BAYES

A) PROBABILIDAD TOTAL

Sea A_1, A_2, \dots, A_n un sistema completo de eventos tales que la probabilidad de cada uno de ellos es distinto de cero, y sea B un evento cualquiera del que se conocen las probabilidades condicionales $P(B/A_i)$, entonces, la probabilidad del evento B, llamada probabilidad total, se calcula empleando la siguiente fórmula:

$$P(B) = P(A_1) \cdot P(B/A_1) + P(A_2) \cdot P(B/A_2) + \dots + P(A_n) \cdot P(B/A_n)$$

B) TEOREMA DE BAYES

El teorema de Bayes se utiliza para revisar probabilidades previamente calculadas cuando se posee nueva información. Desarrollado por el reverendo Thomas Bayes en el siglo XVII, el teorema de Bayes es una extensión de lo que ha aprendido hasta ahora acerca de la probabilidad condicional.

Comúnmente se inicia un análisis de probabilidades con una asignación inicial, probabilidad a priori. Cuando se tiene alguna información adicional se procede a calcular las probabilidades revisadas o a posteriori. El teorema de Bayes permite calcular las probabilidades a posteriori y es:

$$P(A_i/B) = \frac{P(A_i) \cdot P(B/A_i)}{P(B)}$$

Donde:

$P(A_i)$ = Probabilidad a priori

$P(B/A_i)$ = Probabilidad condicional

$P(B)$ = Probabilidad Total

$P(A_i/B)$ = Probabilidad a posteriori

Ejemplo ilustrativo

Una compañía de transporte público tiene tres líneas en una ciudad, de forma que el 45% de los autobuses cubre el servicio de la línea 1, el 25% cubre la línea 2 y el 30% cubre el servicio de la línea 3. Se sabe que la probabilidad de que, diariamente, un autobús se averíe es del 2%, 3% y 1% respectivamente, para cada línea.

- 1) Calcular la probabilidad de que, en un día, un autobús sufra una avería
- 2) Calcular la probabilidad de que, en un día, un autobús no sufra una avería
- 3) ¿De qué línea de transporte es más probable que un autobús sufra una avería?

Solución:

Simbología:

A_1 = Cubre el servicio de la línea 1

A_2 = Cubre el servicio de la línea 2

A_3 = Cubre el servicio de la línea 3

B_1 = Sufre una avería

B_2 = No sufre una avería

Datos:

$P(A_1) = 45\% = 0,45$

$; P(A_2) = 25\% = 0,25$

$; P(A_3) = 30\% = 0,3$

$P(B_1/A_1) = 2\% = 0,02$

$; P(B_1/A_2) = 3\% = 0,03$

$; P(B_1/A_3) = 1\% = 0,01$

Las probabilidades de no sufrir una avería para cada línea son:

$$P(B_2/A_1) = 1 - P(B_1/A_1) = 1 - 0,02 = 0,98$$

$$P(B_2/A_2) = 1 - P(B_1/A_2) = 1 - 0,03 = 0,97$$

$$P(B_2/A_3) = 1 - P(B_1/A_3) = 1 - 0,01 = 0,99$$

1) Calcular la probabilidad de que, en un día, un autobús sufra una avería

Empleando la fórmula de probabilidad total se obtiene:

$$P(B) = P(A_1) \cdot P(B/A_1) + P(A_2) \cdot P(B/A_2) + \dots P(A_n) \cdot P(B/A_n)$$

$$P(B_1) = P(A_1) \cdot P(B_1/A_1) + P(A_2) \cdot P(B_1/A_2) + P(A_3) \cdot P(B_1/A_3)$$

$$P(B_1) = 0,45 \cdot 0,02 + 0,25 \cdot 0,03 + 0,3 \cdot 0,01 = 0,0195$$

2) Calcular la probabilidad de que, en un día, un autobús no sufra una avería

Empleando la fórmula de probabilidad total se obtiene:

$$P(B) = P(A_1) \cdot P(B/A_1) + P(A_2) \cdot P(B/A_2) + \dots P(A_n) \cdot P(B/A_n)$$

$$P(B_2) = P(A_1) \cdot P(B_2/A_1) + P(A_2) \cdot P(B_2/A_2) + P(A_3) \cdot P(B_2/A_3)$$

$$P(B_2) = 0,45 \cdot 0,98 + 0,25 \cdot 0,97 + 0,3 \cdot 0,99 = 0,9805$$

O también, sabiendo que $P(\bar{E}) = 1 - P(E)$, entonces

$$P(B_2) = 1 - P(B_1) = 1 - 0,0195 = 0,9805$$

3) ¿De qué línea de transporte es más probable que un autobús sufra una avería?

Se debe calcular las tres probabilidades a posteriori empleando el Teorema de Bayes

$$P(A_1/B) = \frac{P(A_1) \cdot P(B/A_1)}{P(B)}$$

La probabilidad de que sea de la línea 1, sabiendo que sufre una avería es:

$$P(A_1/B_1) = \frac{P(A_1) \cdot P(B/A_1)}{P(B_1)} = \frac{0,45 \cdot 0,02}{0,0195} = 0,4615$$

La probabilidad de que sea de la línea 2, sabiendo que sufre una avería es:

$$P(A_2/B_1) = \frac{P(A_2) \cdot P(B/A_2)}{P(B_1)} = \frac{0,25 \cdot 0,03}{0,0195} = 0,3846$$

La probabilidad de que sea de la línea 3, sabiendo que sufre una avería es:

$$P(A_3/B_1) = \frac{P(A_3) \cdot P(B_1/A_3)}{P(B_1)} = \frac{0,3 \cdot 0,01}{0,0195} = 0,1538$$

Entonces, sabiendo que el autobús sufre una avería, lo más probable es que sea de la línea 1, ya que esta probabilidad $P(A_1/B_1) = 0,4615$, es la mayor.

Los cálculos empleando Excel se muestran en la siguiente figura:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	$P(A_1)$	0,45									
2	$P(A_2)$	0,25									
3	$P(A_3)$	0,3									
4	$P(B_1/A_1)$	0,02									
5	$P(B_1/A_2)$	0,03									
6	$P(B_1/A_3)$	0,01									
7	$P(B_2/A_1)$	0,98	=1-B4			$P(B_2/A_1) = 1 - P(B_1/A_1)$					
8	$P(B_2/A_2)$	0,97	=1-B5			$P(B_2/A_2) = 1 - P(B_1/A_2)$					
9	$P(B_2/A_3)$	0,99	=1-B6			$P(B_2/A_3) = 1 - P(B_1/A_3)$					
10	$P(B_1)$	0,0195	=B1*B4+B2*B5+B3*B6			$P(B_1) = P(A_1) \cdot P(B_1/A_1) + P(A_2) \cdot P(B_1/A_2) + P(A_3) \cdot P(B_1/A_3)$					
11	$P(B_2)$	0,9805	=1-B10			$P(B_2) = 1 - P(B_1)$					
12	$P(A_1/B_1)$	0,4615	=B1*B4/B10			$P(A_i/B_1) = \frac{P(A_i) \cdot P(B/A_1)}{P(B_1)}$					
13	$P(A_2/B_1)$	0,3846	=B2*B5/B10								
14	$P(A_3/B_1)$	0,1538	=B3*B6/B10								
15	$P_{Max}(A/B_1)$	0,4615	=MAX(B12:B14)								

TAREA DE INTERAPRENDIZAJE N° 5

1) Consulte en la biblioteca o en el internet sobre la biografía de Bayes, y realice un organizador gráfico de la misma.

2) Conteste las siguientes preguntas:

2.1) ¿Qué entiende por probabilidad total?

2.2) ¿Qué entiende por probabilidad a priori?

2.3) ¿Qué entiende por probabilidad a posteriori?

2.4) ¿Qué entiende por teorema de Bayes?

Los siguientes ejercicios resuelva en forma manual y empleando Excel

3) Una empresa dedicada a la comercialización de televisores está considerando comercializar un nuevo televisor. En el pasado el 90% de los televisores que comercializó tuvieron éxito y el 10% no fueron exitosos. Se sabe que la probabilidad que habría recibido un reporte favorable de investigación fue del 85% y 35%, respectivamente.

3.1) Escribir la simbología del problema

$A_1 =$

$A_2 =$

$B_1 =$

$B_2 =$

b) Llenar los datos del problema

$P(A_1) =$

$P(A_2) =$

$P(B_1/A_1) =$

$P(B_1/A_2) =$

3.2) Calcule la probabilidad que los televisores exitosos reciban un reporte desfavorable de investigación

$$P(B_2/A_1) = 0,15$$

3.3) Calcule la probabilidad que los televisores no exitosos reciban un reporte desfavorable de investigación

$$P(B_2/A_2) = 0,65$$

3.4) Calcule la probabilidad de que un televisor reciba un reporte favorable de investigación.

$$P(B_1) = 0,8$$

3.5) Calcule la probabilidad de que un televisor reciba un reporte desfavorable de investigación.

$$P(B_2) = 0,2$$

3.6) ¿Cuál es la probabilidad de que el equipo de televisor tenga éxito en el mercado?

$$P(A_1/B_1) = 0,9563$$

4) La probabilidad de que una persona tenga una determinada enfermedad es de 0,02. Existen pruebas de diagnóstico médico disponibles para determinar si una persona tiene realmente la enfermedad. Si la enfermedad realmente está presente, la probabilidad de que la prueba de diagnóstico indique la presencia de la enfermedad es de 0,95.

4.1) ¿Cuál es la probabilidad de tener la enfermedad, si la prueba de diagnóstico indica la presencia de la misma?.

$$P(A_1/B_1) = 0,2794$$

4.2) ¿Cuál es la probabilidad de no tener la enfermedad, si la prueba de diagnóstico no indica la presencia de la misma?.

$$P(A_2/B_2) = 0,9989$$

5) Una fábrica de sacos tiene 3 máquinas independientes que producen el mismo tipo de sacos. La máquina 1 produce el 15% de los sacos con un 1% de sacos defectuosos. La máquina 2 produce el 45% de los sacos con un 3% de sacos defectuosos. La máquina 3 produce el 40% de los sacos con un 2% de sacos defectuosos.

5.1) Si se selecciona al azar un saco. ¿Cuál es la probabilidad de que sea defectuoso?

$$0,023$$

5.2) ¿De qué máquina es más probable que provenga, si el saco no resulta defectuoso?

$$\text{Máquina 2 con } 0,4468$$

6) El Tercer Año de Bachillerato General Unificado de una unidad educativa está integrado por 35 estudiantes en la especialidad de físico matemático, 47 en químico biólogo, 40 en sociales y 38 en bachillerato técnico. Se sabe que la probabilidad de que un estudiante pierda el año es del 5%, 4%, 3% y 4%, respectivamente. ¿De qué especialidad es más probable que sea el estudiante, si se sabe que un estudiante ha perdido el año?

$$\text{Químico biólogo con } 0,296$$

7) Una entidad financiera dispone de tres empleados para atender a sus clientes: Sandra, Santiago y Dario. Se dispone de un registro de quejas por la atención recibida: 3%, 2%, 1% respectivamente. Cierta día acudieron 120 clientes a la entidad financiera, de los cuales 30 fueron atendidos por Sandra, 50 por Santiago y 40 por Dario. ¿De cuál empleado es más probable que un cliente elegido al azar de entre los que fueron atendidos ese día se queje por la atención recibida?

$$\text{Santiago con } 0,435$$

8) Plantee y resuelva un problema de aplicación del teorema de Bayes en forma manual y empleando Excel.

CAPÍTULO II

DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL CAPÍTULO

Al finalizar el presente capítulo el lector podrá evidenciar que:

- ✓ Interpreta las definiciones, características, propiedades y aplicaciones de las distribuciones de probabilidad: binomial, de Poisson, hipergeométrica, exponencial, uniforme y normal.
- ✓ Aplica algoritmos relativos a las distribuciones de probabilidad en la resolución de ejercicios y problemas prácticos de manera manual, empleando Excel, Winstats y GeoGebra.
- ✓ Plantea y resuelve ejercicios y problemas de aplicación sobre distribuciones de probabilidad de manera manual, utilizando Excel, Winstats y GeoGebra.

CONTENIDOS

- ✓ Distribuciones Discretas: Distribución Binomial, Distribución de Poisson y Distribución Hipergeométrica.
- ✓ Distribuciones Continuas: Distribución Exponencial, Distribución Uniforme y Distribución Normal

2.1) DISTRIBUCIONES DISCRETAS

A) INTRODUCCIÓN

Una distribución de probabilidad es una representación de todos los resultados posibles de algún experimento y de la probabilidad relacionada con cada uno.

Una distribución de probabilidad es discreta cuando los resultados posibles del experimento son obtenidos de variables aleatorias discretas, es decir, de variables que sólo puede tomar ciertos valores, con frecuencia números enteros, y que resultan principalmente del proceso de conteo.

Ejemplos de variables aleatorias discretas son:

Número de caras al lanzar una moneda

El resultado del lanzamiento de un dado

Número de hijos de una familia

Número de estudiantes de una universidad

Ejemplo ilustrativo

Sea el experimento aleatorio de lanzar 2 monedas al aire. Determinar la distribución de probabilidades del número de caras.

Solución:


El espacio muestral es $S = \{CC, CS, SC, SS\}$

La probabilidad de cada punto muestral es de $1/4$, es decir, $P(CC) = P(CS) = P(SC) = P(SS) = 1/4$

La distribución de probabilidades del número de caras se presenta en la siguiente tabla:

Resultados (N° de Caras)	Probabilidad
0	$1/4 = 0,25 = 25\%$
1	$2/4 = 0,50 = 50\%$
2	$1/4 = 0,25 = 25\%$

El gráfico de distribuciones de probabilidad en 3D elaborado empleando Excel se muestra en la siguiente figura:



Interpretación:

La probabilidad de obtener 0 caras al lanzar 2 monedas al aire es de $1/4 = 0,25 = 25\%$

La probabilidad de obtener una cara al lanzar 2 monedas al aire es de $2/4 = 0,5 = 50\%$

La probabilidad de obtener 2 caras al lanzar 2 monedas al aire es de $1/4 = 0,25 = 25\%$

B) LA MEDIA Y LA VARIANZA DE LAS DISTRIBUCIONES DISCRETAS

i) Media

La media llamada también valor esperado, esperanza matemática o simplemente esperanza de una distribución de probabilidad discreta es la media aritmética ponderada de todos los resultados posibles en los cuales los pesos son las probabilidades respectivas de tales resultados. Se halla multiplicando cada resultado posible por su probabilidad y sumando los resultados. Se expresa mediante la siguiente fórmula:

$$\mu = E(X) = \Sigma(x_i \cdot P(x_i))$$

Donde:

$\mu = E(X)$ = Media, Valor Esperado, Esperanza Matemática o simplemente Esperanza

x_i = Posible resultado

$P(x_i)$ = Probabilidad del posible resultado

ii) Varianza

La varianza es el promedio de las desviaciones al cuadrado con respecto a la media. La varianza mide la dispersión de los resultados alrededor de la media y se halla calculando las diferencias entre cada uno de los resultados y su media, luego tales diferencias se elevan al cuadrado y se multiplican por sus respectivas probabilidades, y finalmente se suman los resultados. Se expresa mediante la siguiente fórmula:

$$\sigma^2 = \Sigma[(x_i - \mu)^2 \cdot P(x_i)]$$

Nota: La varianza se expresa en unidades al cuadrado, por lo que es necesario calcular la desviación estándar que se expresa en las mismas unidades que la variable aleatoria y que por lo tanto tiene una interpretación más lógica de la dispersión de los resultados alrededor de la media. La desviación estándar se calcula así: $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$

Ejemplo ilustrativo:

Hallar la esperanza matemática, la varianza y la desviación estándar del número de caras al lanzar tres monedas al aire.

Solución:

El espacio muestral es $S = \{CCC, CCS, CSC, SCC, CSS, SCS, SSC, SSS\}$

La probabilidad de cada punto muestral es de $1/8$

Se elabora las distribuciones de probabilidad y se realiza los cálculos respectivos. Estos resultados se presentan en la siguiente tabla:

x_i	$P(x_i)$	$x_i \cdot P(x_i)$	$(x_i - \mu)^2 \cdot P(x_i)$
0	1/8	$0 \cdot 1/8 = 0$	$(0-1,5)^2 \cdot 1/8 = 0,281$
1	3/8	$1 \cdot 3/8 = 3/8$	$(1-1,5)^2 \cdot 3/8 = 0,094$
2	3/8	$2 \cdot 3/8 = 3/4$	$(2-1,5)^2 \cdot 3/8 = 0,094$
3	1/8	$3 \cdot 1/8 = 3/8$	$(3-1,5)^2 \cdot 1/8 = 0,281$
Total	1	1,5	0,750

Observando la tabla se tiene:

$$\mu = E(X) = 1,5 ; \sigma^2 = 0,75$$

Y calculando la desviación estándar se obtiene:

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{0,75} = 0,866$$

Los cálculos empleando Excel de la esperanza matemática, la varianza y la desviación estándar se muestran en la siguiente figura:

	A	B	C	D	E
1	x_i	$P(x_i)$	$(x_i - \mu)^2$		
2	0	1/8	2,25	$=(A2-\$B\$7)^2$	
3	1	3/8	0,25	$=(A3-\$B\$7)^2$	
4	2	3/8	0,25	$=(A4-\$B\$7)^2$	
5	3	1/8	2,25	$=(A5-\$B\$7)^2$	
6					
7	μ	1,5	$=SUMAPRODUCTO(A2:A5;B2:B5)$		
8	σ^2	0,75	$=SUMAPRODUCTO(C2:C5;B2:B5)$		
9	σ	0,866	$=RAIZ(B8)$		


Interpretación:

El valor de $\mu = E(X) = 1,5$ significa que si se promedian los resultados del lanzamiento de las tres monedas (teóricamente, un número infinito de lanzamientos), se obtendrá 1,5.


Los valores de $\sigma^2 = 0,75$ y $\sigma = 0,866$ miden la dispersión de los resultados de lanzar las tres monedas alrededor de su media.

TAREA DE INTERAPRENDIZAJE N° 6

- 1) Elabore un organizador gráfico sobre las distribuciones discretas
- 2) Al ser la esperanza matemática una media aritmética ponderada, explique el por qué en su fórmula no aparece la división por la suma de los pesos como en cualquier fórmula de la media aritmética ponderada.
- 3) Sea el experimento aleatorio de lanzar un dado al aire.
- 3.1) Elabore un gráfico de distribuciones de probabilidad en 2D de manera manual y empleando Excel



- 3.2) Elabore un gráfico de distribuciones de probabilidad en 3D empleando Excel



- 3.3) Calcule la esperanza matemática, la varianza y desviación estándar de manera manual y empleando Excel.

$$E(X) = 3,5 ; \sigma^2 = 2,917; \sigma = 1,71$$

4) Dada las distribuciones de probabilidad

x_i	$P(x_i)$
0	x
1	1/4
2	6x
3	4x
4	1/16

4.1) Calcular el valor de x

1/16

4.2) Elabore un gráfico de distribuciones de probabilidad en 3D empleando Excel



4.3) Calcule la esperanza matemática, la varianza y desviación estándar de manera manual y empleando Excel.

$$E(X) = 2 ; \sigma^2 = 1; \sigma = 1$$

5) El número de automóviles que la empresa D & M vendió mensualmente varió de 4 a 12 junto con la frecuencia de ventas que se muestra en la siguiente tabla:

Nº meses	Automóviles (x_i)
6	4
8	8
12	10
10	12
8	14
4	12

En meses anteriores el número promedio de ventas mensuales fue de 8 con una variabilidad de 4,2. Empleando las cifras presentadas, determine que ha pasado el promedio mensual de ventas y su variabilidad de la empresa D & M en comparación con los meses anteriores. Realice los cálculos empleando Excel.

Como $E(X) = 10,167$ y $\sigma = 2,995$ se evidencia que la empresa ha incrementado su promedio mensual de ventas y ha reducido su variabilidad en comparación con los meses anteriores.

6) Plantee y resuelva 3 ejercicios de aplicación sobre distribuciones discretas. En cada ejercicio elabore gráficos de distribuciones de probabilidad en 3D empleando Excel. Realice los cálculos empleando Excel.

C) DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

i) Definición:

Cuando se dispone de una expresión matemática, es factible calcular la probabilidad de ocurrencia exacta correspondiente a cualquier resultado específico para la variable aleatoria.

La *distribución de probabilidad binomial* es uno de los modelos matemáticos (expresión matemática para representar una variable) que se utiliza cuando la variable aleatoria discreta es el número de éxitos en una muestra compuesta por n observaciones.

ii) Propiedades:

- La muestra se compone de un número fijo de observaciones n
- Cada observación se clasifica en una de dos categorías, *mutuamente excluyentes* (los eventos no pueden ocurrir de manera simultánea. Ejemplo: Una persona no puede ser de ambos sexos) y *colectivamente exhaustivos* (uno de los eventos debe ocurrir. Ejemplo: Al lanzar una moneda, si no ocurre cruz, entonces ocurre cara). A estas categorías se las denomina éxito y fracaso.
- La probabilidad de que una observación se clasifique como *éxito*, p , es constante de una observación a otra. De la misma forma, la probabilidad de que una observación se clasifique como *fracaso*, $1-p$, es constante en todas las observaciones.
- La variable aleatoria binomial tiene un rango de 0 a n

iii) Ecuación:

$$P(X) = \frac{n!}{X!(n-X)!} \cdot p^X \cdot (1-p)^{n-X}$$

Donde:

$P(X)$ = Probabilidad de X éxitos, dadas n y p

n = Número de observaciones

p = Probabilidad de éxitos

$1-p$ = Probabilidad de fracasos

X = Número de éxitos en la muestra ($X=0, 1, 2, 3, 4, \dots, n$)

iv) Media de la distribución binomial

La media μ de la distribución binomial es igual a la multiplicación del tamaño n de la muestra por la probabilidad de éxito p

$$\mu = np$$

v) Desviación estándar de la distribución binomial

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{np(1-p)}$$

Ejemplos ilustrativos

1) Determine $P(X=8)$ para $n=10$ y $p=0,5$

Solución:

Aplicando la ecuación se obtiene:

$$P(X) = \frac{n!}{X!(n-X)!} \cdot p^X \cdot (1-p)^{n-X}$$

$$P(X=8) = \frac{10!}{8!(10-8)!} \cdot 0,5^8 \cdot (1-0,5)^{10-8}$$

$$P(X=8) = 45 \cdot 0,003906 \cdot 0,25 = 0,0439$$

Empleando Excel se calcula de la siguiente manera:

a) Se escribe los datos y se inserta la función DISTR.BINOM.N como se muestra en la siguiente figura:

	A	B	C	D	E
1	X	8			
2	n	10			
3	p	0,5			
4	P(X=8)	=			
5					
6					
7					
8					
9					

Insertar función

Buscar una función:

Escriba una breve descripción de lo que desea hacer y, a continuación, haga clic en Ir

O seleccionar una categoría: Estadísticas

Seleccionar una función:

DESVESTPA
DESXIA2
DESPROM
DISTR.BETA.N
DISTR.BINOM.N
DISTR.BINOM.SERIE
DISTR.CHICUAD

DISTR.BINOM.N(núm_éxito;ensayos;prob_éxito;acumulado)
Devuelve la probabilidad de una variable aleatoria discreta siguiendo una distribución binomial.

[Ayuda sobre esta función](#) Aceptar Cancelar

b) Clic en Aceptar. Los argumentos de la función escribir como se muestra en la figura:

	A	B	C	D	E	F
1	X	8				
2	n	10				
3	p	0,5				
4	P(X=8)	FALSO)				
5						
6						
7						

Argumentos de función

DISTR.BINOM.N

Núm_éxito B1 = 8

Ensayos B2 = 10

Prob_éxito B3 = 0,5

Acumulado FALSO = FALSO

= 0,043945313

Devuelve la probabilidad de una variable aleatoria discreta siguiendo una distribución binomial.
Núm_éxito es el número de éxitos en los ensayos.

Resultado de la fórmula = 0,0439

[Ayuda sobre esta función](#) Aceptar Cancelar

c) Clic en Aceptar


	A	B	C
1	X	8	
2	n	10	
3	p	0,5	
4	P(X=8)	0,0439	

Empleando Winstats se procede de la siguiente manera


a) Se ingresa al programa Winstats




b) Clic en Window y luego en Probability




c) En Probability escoger Binomial




d) Clic en Edit.




e) Clic en Parameters. En la casilla en probability of success escribir 0,5 y en number of trials escribir 10





f) Clic en ok



g) Clic en Calc




h) Clic en Intervalo. En la casilla low x escribir 8 y en la casilla high x escribir 8. Clic en probability




Empleando GeoGebra se procede de la siguiente manera:


a) Se ingresa al programa




b) En la casilla Entrada escribir Distribución Binomial para que se desplieguen algunas opciones.



c) Seleccionar la opción Distribución Binomial[<Número de ensayos>, <Probabilidad de éxito>, <Valor>, <Acumulada o no (true/false)>]





d) Escribir 10 en <Número de Ensayos>, 0.5 en <Probabilidad de Éxito>, 8 en <Valor > y false en <Acumulada>




Entrada: **DistribuciónBinomial[10, 0.5, 8, false]**


e) Enter




f) Para editar. Clic derecho en $a = 0.04$



g) Escoger la opción Propiedades de Objeto




h) En la ventana Referencias, en la casilla Nombre, borrar la letra a y escribir P. Cerrar la ventana Referencias




Para calcular con el gráfico empleando GeoGebra:


a) Ingresar al programa. En Vista, clic en punto de posición del texto




b) Seleccionar Cálculo de Probabilidades





c) Clic en la pestaña de la casilla Normal para que se despliegue otras opciones.



d) Clic en Binomial



e) En la casilla n escribir 10. En la casilla p escribir 0.5. En la casilla P escribir 8. En la casilla $X \leq$ escribir 8. Enter




2) Determinar $P(X \leq 3)$ para $n=4$ y $p = 0,45$

Solución:

$$P(X \leq 3) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3)$$


Se puede aplicar la ecuación para cada probabilidad, pero para ahorrar tiempo se recomienda encontrar las probabilidades con lectura en la tabla de probabilidades binomiales.



Realizando la lectura en la tabla de $P(X=0)$ con $n=4$ y $p = 0,45$ se obtiene 0,0915. Continuando con la respectivas lecturas en la tabla se obtiene: 0,2995 para $P(X=1)$, 0,3675 para $P(X=2)$ y 0,2005 para $P(X=3)$.

Por lo tanto $P(X \leq 3) = 0,0915 + 0,2995 + 0,3675 + 0,2005 = 0,9590$


Para que aparezca la tabla empleando Winstats se hace clic en Edit y luego en parámetros. En la ventana de parámetros, en la casilla trials, escribir 4 y en success prob escribir 0,45. Finalmente clic Calc y luego en table



Los cálculos realizados empleando Excel se muestran en la siguiente figura:


	A	B	C	D	E	F
1	X	3				
2	n	4				
3	p	4/9				
4	$P(X \leq 3)$	0,9590	=DISTR.BINOM.N(B1;B2;B3;VERDADERO)			

Los cálculos realizados empleando Winstats se muestran en la siguiente figura:



Empleando GeoGebra



Escribir 4 en <Número de Ensayos>, 0.45 en <Probabilidad de Éxito>, 3 en <Valor> y true en <Acumulada>



Nota:

Para $P(X=3)$, siendo 3 el número de éxitos, en <Acumulada Booleana> se escribe false
Para $P(X\leq 3)$, siendo 3 el número de éxitos, en <Acumulada Booleana> se escribe true

O También



3) Se lanza ocho dados.

3.1) Calcular la probabilidad de obtener 2 seis

3.2) Calcular la probabilidad de obtener máximo 2 seis

3.3) Calcular la probabilidad de obtener al menos 2 seis

Solución:

3.1)

$$P(X = 2) = ? ; n = 8; p = \frac{1}{6}$$

Aplicando la fórmula se obtiene:


$$P(X) = \frac{n!}{X!(n-X)!} \cdot p^X \cdot (1-p)^{n-X}$$

$$P(X = 2) = \frac{8!}{2!(8-2)!} \cdot \frac{1^2}{6} \cdot \left(1 - \frac{1}{6}\right)^{8-2} = 0,2605$$


Los cálculos empleando Excel se muestran en la siguiente figura:

	A	B	C	D	E
1	X	2			
2	n	8			
3	p	1/6			
4	P(X=2)	0,2605	=DISTR.BINOM.N(B1;B2;B3;FALSO)		

Los cálculos empleando Winstats se muestran en la siguiente figura:



Los cálculos empleando GeoGebra se muestran en la siguiente figura:



3.2)

$$P(X \leq 2) = ? ; n = 8; p = \frac{1}{6}$$

$$P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)$$

Los cálculos empleando Excel se muestran en la siguiente figura:

	A	B	C	D	E	F
1	X	2				
2	n	8				
3	p	1/6				
4	$P(X \leq 2)$	0,8652	=DISTR.BINOM.N(B1;B2;B3;VERDADERO)			

3.3)

$$P(X \geq 2) = ? ; n = 8; p = \frac{1}{6}$$

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) = 1 - P(X \leq 1)$$

Los cálculos empleando Excel se muestran en la siguiente figura:

	A	B	C	D	E	F
1	X	1				
2	n	8				
3	p	1/6				
4	$P(X \leq 1)$	0,6047	=DISTR.BINOM.N(B1;B2;B3;VERDADERO)			
5	$P(X \geq 2)$	0,3953	=1-B4			

4) Se lanzan simultáneamente tres monedas, calcular la probabilidad de que se obtengan:

- 4.1) Tres caras.
- 4.2) Dos caras y un sello
- 4.3) Una cara y dos sellos
- 4.4) Tres sellos
- 4.5) Al menos una cara

Solución:

Designando por C = cara y por S = sello se tiene:

Espacio muestral = S = {CCC, CCS, CSC, SCC, CSS, SCS, SSC, SSS}, entonces, n(S) = 8

Cada una de estos puntos muestrales son igualmente probables, con probabilidad de 1/8

Todas las probabilidades individuales se representan en la siguiente tabla:

Monedas			n(E)	P(E)
1ra	2da	3ra		
C	C	C	1	1/8
C	C	S	3	3/8
C	S	S	3	3/8
S	S	S	1	1/8
Total			8	1

4.1) Tres caras.

Observando la tabla se obtiene que P(CCC) = 1/8

Aplicando la fórmula se obtiene:

$$P(X = 3) = P(CCC); n = 3; p = \frac{1}{2}$$

$$P(X) = \frac{n!}{X!(n - X)!} \cdot p^X \cdot (1 - p)^{n-X}$$

$$P(CCC) = \frac{3!}{3!(3 - 3)!} \cdot \frac{1^3}{2} \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{3-3} = 1 \cdot \frac{1}{8} \cdot 1 = \frac{1}{8}$$

Los cálculos empleando Excel se muestran en la siguiente figura:

	A	B	C	D	E
1	X	3			
2	n	3			
3	p	1/2			
4	P(X=3)	1/8	=DISTR.BINOM.N(B1;B2;B3;FALSO)		

4.2) Dos caras y un sello

Observando la tabla se obtiene que P(CCS) = 3/8

Aplicando la fórmula se obtiene:

$$P(X = 2) = P(CCS); n = 3; p = \frac{1}{2}$$

$$P(X) = \frac{n!}{X!(n - X)!} \cdot p^X \cdot (1 - p)^{n-X}$$

$$P(CCS) = \frac{3!}{2!(3 - 2)!} \cdot \frac{1^2}{2} \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{3-2} = 3 \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{8}$$

Los cálculos empleando Excel se muestran en la siguiente figura:

	A	B	C	D	E
1	X	2			
2	n	3			
3	p	1/2			
4	P(X=2)	3/8	=DISTR.BINOM.N(B1;B2;B3;FALSO)		

4.3) Una cara y dos sellos

Observando la tabla se obtiene que $P(CSS) = 3/8$

Aplicando la fórmula se obtiene:

$$P(X = 1) = P(CSS); n = 3; p = \frac{1}{2}$$

$$P(X) = \frac{n!}{X!(n-X)!} \cdot p^X \cdot (1-p)^{n-X}$$

$$P(CSS) = \frac{3!}{1!(3-1)!} \cdot \frac{1^1}{2} \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{3-1} = 3 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{8}$$

Los cálculos empleando Excel se muestran en la siguiente figura:

	A	B	C	D	E
1	X	1			
2	n	3			
3	p	1/2			
4	P(X=1)	3/8	=DISTR.BINOM.N(B1;B2;B3;FALSO)		

4.4) Tres sellos

Observando la tabla se obtiene que $P(SSS) = 1/8$

Aplicando la fórmula se obtiene:

$$P(X = 0) = P(SSS); n = 3; p = \frac{1}{2}$$

$$P(X) = \frac{n!}{X!(n-X)!} \cdot p^X \cdot (1-p)^{n-X}$$

$$P(SSS) = \frac{3!}{0!(3-0)!} \cdot \frac{1^0}{2} \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{3-0} = 1 \cdot 1 \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{8}$$

Los cálculos empleando Excel se muestran en la siguiente figura:

	A	B	C	D	E
1	X	0			
2	n	3			
3	p	1/2			
4	P(X=0)	1/8	=DISTR.BINOM.N(B1;B2;B3;FALSO)		

4.5) Al menos una cara

Observando la tabla se obtiene que:

$$P(\text{Al menos C}) = P(\text{CCC}) + P(\text{CCS}) + P(\text{CSS}) = 1/8 + 3/8 + 3/8 = 7/8$$

$$\text{O también } P(\text{Al menos C}) = 1 - P(\text{SSS}) = 1 - 1/8 = 7/8$$

Los cálculos empleando Excel se muestran en la siguiente figura:

	A	B	C	D	E
1	X	0			
2	n	3			
3	p	1/2			
4	$P(X=0)$	1/8	=DISTR.BINOM.N(B1;B2;B3;FALSO)		
5	$P(X \geq 1)$	7/8	=1-B4		

TAREA DE INTERAPRENDIZAJE N° 7

- 1) Realice un organizador gráfico sobre la distribución binomial
- 2) Calcule de manera manual, empleando Excel y GeoGebra. Realice los gráficos empleando Winstats y GeoGebra

2.1) Para $n = 4$ y $p = 0,12$, ¿cuánto es $P(X = 0)$?

R: 0,5997

2.2) Para $n = 10$ y $p = 0,40$, ¿cuánto es $P(X = 9)$?

R: 0,0016

2.3) Para $n = 10$ y $p = 0,50$, ¿cuánto es $P(X = 8)$?

R: 0,0439

3) En una muestra de 4 pedidos se observa que la probabilidad de éxito de que los mismos sean atendidos con eficiencia es de 0,1

3.1) Llenar la tabla de manera manual y empleando Excel

n	p	X	$\frac{n!}{X!(n-X)!}$	p^X	$(1-p)^{n-X}$	P(X)
4	0,1	0				0,6561
		1				
		2				0,0486
		3				
		4				0,0001

Empleando la anterior tabla, resuelva los siguientes ejercicios de manera manual, empleando Excel, y GeoGebra.

3.2) ¿Qué probabilidad existe de que tres pedidos sean atendidos con eficiencia?

$$P(X = 3) = 0,0036$$

3.3) ¿Qué probabilidad existe de que menos de tres pedidos sean atendidos con eficiencia?

$$P(X < 3) = 0,9963$$

3.4) ¿Qué probabilidad existe de que más de tres pedidos sean atendidos con eficiencia?

$$P(X > 3) = 0,0001$$

3.5) ¿Qué probabilidad existe de que tres o más pedidos sean atendidos con eficiencia (es decir, al menos tres, por lo menos tres, o mínimo tres)?

$$P(X \geq 3) = 0,0037$$

3.6) ¿Qué probabilidad existe de que tres o menos pedidos sean atendidos con eficiencia? (es decir, a lo más tres)?

$$P(X \leq 3) = 0,9999$$

3.7) Calcular la desviación estándar

$$\sigma = 0,6$$

4) Crear y resolver de forma manual, empleando Excel y Winstats un problema similar al anterior.

5) El 60% de profesionales leen su contrato de trabajo, incluyendo las letras pequeñas. Suponga que el número de empleados que leen cada una de las palabras de su contrato se puede modelar utilizando la distribución binomial. Considerando un grupo de cinco empleados:

5.1) Llenar la tabla manera manual y empleando Excel

n	p	X	$\frac{n!}{X!(n-X)!}$	p^X	$(1-p)^{n-X}$	$P(X)$
		0				0,0102
		1				
		2				
		3				0,3456
		4				
		5				

5.2) Resuelva de manera manual y Empleando GeoGebra la probabilidad de que:

a) Los cinco lean cada una de las palabras de su contrato

$$0,0778$$

b) Al menos tres lean cada una de las palabras de su contrato

$$0,6826$$

c) Menos de dos lean cada una de las palabras de su contrato

$$0,0870$$

6) ¿Cuáles serían los resultados para los incisos de la pregunta anterior, si la probabilidad de que un empleado lea cada una de las palabras de su contrato es de 0,80?. Resolver los siguientes ejercicios de manera manual, empleando Excel y GeoGebra.

$$0,3277; 0,9421; 0,0067$$

7) Un examen de estadística de elección múltiple contenía 20 preguntas y cada una de ellas 5 respuestas. Si un estudiante desconocía todas las respuestas y contestó al azar, calcular de manera manual, empleando GeoGebra la probabilidad de que:

a) Contestase correctamente a 5 preguntas

$$0,1746$$

b) Contestase correctamente a lo más 5 preguntas

$$0,8042$$

8) Crear y resolver de manera manual, empleando Excel y Winstats un problema similar al anterior.

9) Se lanza simultáneamente 10 dados, calcular la probabilidad de manera manual, empleando Excel y Winstats de que se obtengan:

9.1) Exactamente 7 dos	0,00025
9.2) Exactamente 0 tres	0,16151
9.3) Menos de 7 cincos	0,99973
9.4) Más de 7 tres	0,00002
9.5) Por lo menos 7 cuatros	0,00027

10) Se lanzan simultáneamente cinco monedas, calcular la probabilidad de manera manual, empleando Excel y GeoGebra de que se obtengan:

10.1) Cinco caras	1/32
10.2) Tres caras y dos sellos	5/16
10.3) El mismo evento	0
10.4) Al menos una cara	31/32

11) Plantee y resuelva de manera manual, empleando Excel, GeoGebra y Winstats un ejercicio sobre dados y otro sobre monedas empleando la distribución binomial.

D) DISTRIBUCIÓN DE POISSON

i) Introducción.- Muchos estudios se basan en el conteo de las veces que se presenta un evento dentro de un área de oportunidad dada. El *área de oportunidad* es una unidad continua o intervalo de tiempo o espacio (volumen o área) en donde se puede presentar más de un evento. Algunos ejemplos serían los defectos en la superficie de un refrigerador, el número fallas de la red en un día, o el número de pulgas que tiene un perro. Cuando se tiene un área de oportunidad como éstas, se utiliza la *distribución de Poisson* para calcular las probabilidades si:

- Le interesa contar las veces que se presenta un evento en particular dentro de un área de oportunidad determinada. El área de oportunidad se define por tiempo, extensión, área, volumen, etc.
- La probabilidad de que un evento se presente en un área de oportunidad dada es igual para todas las áreas de oportunidad.
- El número de eventos que ocurren en un área de oportunidad es independiente del número de eventos que se presentan en cualquier otra área de oportunidad.
- La probabilidad de que dos o más eventos se presenten en un área de oportunidad tiende a cero conforme esa área se vuelve menor.

ii) Fórmula.- La distribución de Poisson tiene un parámetro, llamado λ (letra griega lambda minúscula), que es la media o el número esperado de eventos por unidad. La varianza de la distribución de Poisson también es igual a λ , y su desviación estándar es igual a $\sqrt{\lambda}$. El número de eventos X de la variable aleatoria de Poisson fluctúa desde 0 hasta infinito.

$$P(X) = \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^X}{X!}$$

Donde:

$P(X)$ = Probabilidad de X eventos en un área de oportunidad

λ = Número de eventos esperados

X = Número de eventos

e = Constante matemática base de los logaritmos naturales aproximadamente igual a 2,718281828....

Este número es de gran importancia, tan sólo comparable a la del número π (pi), por su gran variedad de aplicaciones. El número e suele definirse como el límite de la expresión:

$$(1 + 1/n)^n$$

Cuando n tiende hacia el infinito. Algunos valores de esta expresión para determinados valores de la n se muestran en la tabla siguiente:

VALOR NUMÉRICO DE $(1 + 1/n)^n$ PARA VALORES CRECIENTES DE n		
n	$(1 + 1/n)^n$	Valor numérico
1	$(1 + 1/1)^1$	2
3	$(1 + 1/3)^3$	2,369
5	$(1 + 1/5)^5$	2,489
20	$(1 + 1/20)^{20}$	2,653
40	$(1 + 1/40)^{40}$	2,684
50	$(1 + 1/50)^{50}$	2,691
100	$(1 + 1/100)^{100}$	2,705
1000	$(1 + 1/1000)^{1000}$	2,717
10000	$(1 + 1/10000)^{10000}$	2,718
∞	2,71828....

Observando la columna de la derecha de la tabla anterior, se puede ver que a medida que n crece el valor de la expresión se aproxima, cada vez más, a un valor límite. Este límite es 2,7182818285....

Ejemplos ilustrativos

1) Suponga una distribución de Poisson. Si $\lambda = 1$, calcular $P(X = 0)$


Solución:

Aplicando la fórmula se obtiene:

$$P(X) = \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^X}{X!} = \frac{2,71828^{-1} \cdot 1^0}{0!} = 0,3679$$

También se puede obtener con lectura de la tabla de probabilidades de Poisson

TABLA N° 2
DISTRIBUCIÓN DE POISSON




Ejemplo: Para $\lambda = 1$ y $X = 0 \Rightarrow P(X = 0) = 0,3679$

	λ									
X	0,005	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0	0,9950	0,9900	0,9802	0,9704	0,9608	0,9512	0,9418	0,9324	0,9231	0,9139
1	0,0050	0,0099	0,0196	0,0291	0,0384	0,0476	0,0565	0,0653	0,0738	0,0823
2	0,0000	0,0000	0,0002	0,0004	0,0008	0,0012	0,0017	0,0023	0,0030	0,0037
3	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0001	0,0001
	λ									
X	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
0	0,9048	0,8187	0,7408	0,6703	0,6065	0,5488	0,4966	0,4493	0,4066	0,3679

El cálculo de $P(X = 0)$ con $\lambda = 1$ empleando Excel se realizan de la siguiente manera:

a) Se inserta la función POISSON.DIST




The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

	A	B	C	D	E	F
1	λ	1				
2	X	0				
3	$P(X=0)$	=				
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

The 'Insertar función' dialog box is open, showing the search results for 'POISSON.DIST'. The function is selected, and the description reads: 'POISSON.DIST(x;media;acumulado) Devuelve la distribución de Poisson.'

Los cálculos empleando GeoGebra se muestran en la siguiente figura:





Nota:

Escoger la opción Poisson[<Media>, <Valor>, <Acumulada o no (true/false)>]

Escribir 1 en <Media>, 0 en <Valor>, false en <Acumulada>

Para $P(X = n)$, siendo n el número de eventos o ensayos, en <Acumulada> se escribe false

Para $P(X \leq n)$, siendo n el número de eventos o ensayos, en <Acumulada> se escribe true



2) Suponga una distribución con $\lambda = 5$. Determine $P(X \geq 10)$

Solución:

$$P(X \geq 10) = 1 - P(X \leq 9)$$

$$P(X \leq 9) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) + P(X = 4) + \dots + P(X = 9)$$

Aplicando la fórmula o con lectura en la tabla de la distribución de Poisson se obtiene:

$$P(X \leq 9) = 0,0067 + 0,0337 + 0,0842 + 0,1404 + 0,1755 + 0,1755 + 0,1462 + 0,1044 + 0,0653 + 0,0363$$

$$P(X \leq 9) = 0,9682$$


Entonces:

$$P(X \geq 10) = 1 - P(X \leq 9) = 1 - 0,9682 = 0,0318$$

Los cálculos empleando Excel se muestran en la siguiente figura:

	A	B	C	D	E
1	λ	5			
2	X	9			
3	$P(X \leq 9)$	0,9681719	=POISSON(B2;B1;VERDADERO)		
4	$P(X \geq 10)$	0,0318281	=1-B3		

Los cálculos empleando Winstats se muestran en la siguiente figura:



TAREA DE INTERAPRENDIZAJE N° 8

1) Defina con sus propias palabras:

- 1.1) Área de oportunidad
- 1.2) Distribución de Poisson
- 1.3) Número e

2) Escriba 5 ejemplos de área de oportunidad

3) Investigue sobre la biografía de Siméon Denis Poisson y realice un organizador gráfico de la misma.

- 4) Calcule empleando la fórmula de la distribución de Poisson, Excel , GeoGebra y Winstats
- 4.1) $P(X = 8)$ si $\lambda = 8$ 0,1396
- 4.2) $P(X = 1)$ si $\lambda = 0,5$ 0,3033
- 4.3) $P(X = 0)$ si $\lambda = 3,7$ 0,0247
- 5) Calcule empleando la tabla y Excel. Suponga una distribución con $\lambda = 5$.
- 5.1) $P(X = 1)$ 0,0337
- 5.2) $P(X < 1)$ 0,0067
- 5.3) $P(X > 1)$ 0,9596
- 5.4) $P(X \leq 1)$ 0,0404
- 6) Suponga que la media de clientes que llega a un banco por minuto durante la hora que va del mediodía a la 1 pm es igual a 3. Calcular empleando la tabla y Winstats.
- 6.1) ¿Cuál es la probabilidad de que lleguen exactamente dos clientes durante un minuto? 0,2240
- 6.2) ¿Y cuál es la probabilidad de que lleguen más de dos clientes durante un minuto dado? 0,5768
- 7) El gerente de control de calidad de una empresa que elabora galletas inspecciona un lote de galletas con chispas de chocolate que se acaban de preparar. Si el proceso de producción está bajo control, la media de chispas de chocolate por galleta es 6. Calcular empleando la tabla y Excel. ¿Cuál es la probabilidad de que en cualquier galleta inspeccionada.
- 7.1) Se encuentre menos de cinco chispas? 0,2851
- 7.2) Se encuentren exactamente cinco chispas? 0,1606
- 7.3) Se encuentren cinco o más chispas? 0,7149
- 8) El departamento de transporte registra las estadísticas de las maletas maltratadas por cada 1000 pasajeros. En 2003, una empresa de transporte tuvo 3,21 maletas maltratadas por cada 1000 pasajeros. Calcular empleando la fórmula y GeoGebra. ¿Cuál es la probabilidad de que, en los próximos 1000 pasajeros, aquella empresa tenga
- 8.1) Ninguna maleta maltratada? 0,0404
- 8.2) Al menos una maleta maltratada? 0,9596
- 8.3) Al menos dos maletas maltratadas? 0,8301
- 9) Plantee y resuelva 3 ejercicios de aplicación sobre la distribución de Poisson de manera manual, empleando Excel, GoeGebra y Winstats.

E) DISTRIBUCIÓN HIPERGEOMÉTRICA

i) Definición

La distribución binomial es apropiada sólo si la probabilidad de un éxito permanece constante. Esto ocurre si el muestreo se realiza con reemplazo en una población grande. Sin embargo, si la población es pequeña y ocurre sin reemplazo, la probabilidad de éxito variará, y la distribución hipergeométrica es que se utiliza.

ii) Fórmula

Se calcula empleando la siguiente fórmula:

$$P(X) = \frac{C_X^r \cdot C_{n-X}^{N-r}}{C_n^N}$$

Donde:

C = combinación

N = tamaño de la población

r = número de éxitos en la población

n = tamaño de la muestra

X = número de éxitos en la muestra

Notas:

- Si se selecciona una muestra sin reemplazo de una población grande conocida y contiene una proporción relativamente grande de la población, de manera que la probabilidad de éxito varía de una selección a la siguiente, debe utilizarse la distribución hipergeométrica.

- Cuando tamaño de la población (N) es muy grande, la distribución hipergeométrica tiende aproximarse a la binomial.

Ejemplo ilustrativo

Si se extraen juntas al azar 3 bolas de una urna que contiene 6 bolas rojas y 4 blancas. ¿Cuál es la probabilidad de que sean extraídas 2 bolas rojas?.

Solución:

Los datos son:

N=10; r = 6; n = 3 y X= 2

Aplicando la fórmula se obtiene:


$$P(X) = \frac{C_X^r \cdot C_{n-X}^{N-r}}{C_n^N}$$

$$P(X = 2) = \frac{C_2^6 \cdot C_{3-2}^{10-6}}{C_3^{10}} = \frac{C_2^6 \cdot C_1^4}{C_3^{10}} = \frac{\frac{6!}{2!(6-2)!} \cdot \frac{4!}{1!(4-1)!}}{\frac{10!}{3!(10-3)!}} = \frac{\frac{6!}{2!4!} \cdot \frac{4!}{1!3!}}{\frac{10!}{3!7!}} = \frac{15 \cdot 4}{120} = 0,5$$



El cálculo de $P(X=2)$ empleando Excel se muestra en la siguiente figura:

	A	B	C	D	E	F
1	N	10				
2	r	6				
3	n	3				
4	X	2				
5	$P(X=2)$	0,5	=DISTR.HIPERGEOM.N(B4;B3;B2;B1;FALSO)			

El cálculo de $P(X=2)$ empleando GeoGebra se muestra en la siguiente figura:



Hipergeométrica[<Tamaño de población>, <Número de éxitos>, <Tamaño de muestra>, <Valor>, <Acumulada o no (true/false)>]



TAREA DE INTERAPRENDIZAJE N° 9

- 1) ¿En qué se diferencia la distribución binomial con la distribución hipergeométrica?
- 2) Realice un organizador gráfico de la distribución hipergeométrica.
- 3) Resolver los siguientes ejercicios de manera manual, empleando Excel y GeoGebra
- 3.1) En un local de venta de automóviles existen 20 vehículos de los cuales 8 son de la preferencia de Mathías. Si Mathías selecciona 3 vehículos al azar, ¿cuál es la probabilidad de que un vehículo sea de su preferencia?.
- 0,4632
- 3.2) En un aula de 40 estudiantes hay 16 hombres. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar una muestra de 12 en la cual 8 sean hombres?
- 0,0245
- 3.3) De un grupo de 9 personas 4 son mujeres. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar una muestra de 3 personas en la cual no más que una mujer sea seleccionada?
- 0,5952
- 3.4) De 100 establecimientos educativos, 70 disponen de canchas deportivas. Si se pregunta si disponen de canchas deportivas a una muestra aleatoria de 20 establecimientos educativos, calcular la probabilidad de que:
- a) Exactamente 8 dispongan de canchas deportivas
- 0,00152
- b) Exactamente 8 no dispongan de canchas deportivas
- 0,11618
- 3.5) De 40 estudiantes de una clase de Estadística, a 30 les gusta la asignatura. Si se pregunta por la preferencia a esta asignatura a una muestra aleatoria de 8 estudiantes, calcular la probabilidad de que:
- a) Exactamente a 6 les gusta la asignatura
- 0,34744
- b) Mínimo a 6 les gusta la asignatura
- 0,68826
- c) Exactamente a 6 no les gusta la asignatura
- 0,00119
- d) Mínimo a 6 no les gusta la asignatura
- 0,00124
- 4) Plantee y resuelva 3 ejercicios de aplicación sobre la distribución hipergeométrica de manera manual, empleando Excel y GeoGebra

2.2 DISTRIBUCIONES CONTINUAS

A) INTRODUCCIÓN

Una distribución de probabilidad es continua cuando los resultados posibles del experimento son obtenidos de variables aleatorias continuas, es decir, de variables cuantitativas que pueden tomar cualquier valor, y que resultan principalmente del proceso de medición.

Ejemplos de variables aleatorias continuas son:

La estatura de un grupo de personas

El tiempo dedicado a estudiar

La temperatura en una ciudad

B) DISTRIBUCIÓN EXPONENCIAL

i) Definición

La distribución de Poisson calcula el número de eventos sobre alguna área de oportunidad (intervalo de tiempo o espacio), la distribución exponencial mide el paso del tiempo entre tales eventos. Si el número de eventos tiene una distribución de Poisson, el lapso entre los eventos estará distribuido exponencialmente.

ii) Fórmula

La probabilidad de que el lapso de tiempo sea menor que o igual a cierta cantidad x es:

$$P(X \leq x) = 1 - e^{-\lambda \cdot t}$$

Donde:

t =Lapso de tiempo

e = Base del logaritmo natural aproximadamente igual a 2,718281828

λ =Tasa promedio de ocurrencia

Ejemplo ilustrativo

Los buses interprovinciales llegan al terminal a una tasa promedio de 10 buses por hora.

- 1) ¿Cuál es la probabilidad de que llegue un bus en no más de 5 minutos?
- 2) ¿Cuál es la probabilidad de que llegue un bus en no más de 10 minutos?
- 3) ¿Cuál es la probabilidad de que llegue un bus entre 5 minutos y 10 minutos?
- 4) ¿Cuál es la probabilidad de que llegue un bus en más de 5 minutos?

Solución:

$\lambda = 10$ por una hora

1) Como la tasa promedio está dada por hora, y el problema se plantea en minutos, se calcula el porcentaje que representa 5 minutos de una hora (60 minutos), el cual es:

$$\frac{5}{60} = \frac{1}{12} = 0,0833$$



Reemplazado valores de la fórmula se obtiene:

$$P(X \leq x) = 1 - e^{-\lambda \cdot t}$$

$$P(X \leq 5) = 1 - e^{-10 \cdot \frac{1}{12}} = 0,5654$$

Interpretación: Existe un 56,54% de probabilidad de que el segundo bus llegue al terminal en 5 minutos o menos del primero si la tasa promedio de llegada es de 10 buses por hora.

Los cálculos empleando GeoGebra se muestran en la siguiente figura




2) El porcentaje que representa 10 minutos de una hora (60 minutos) es:

$$\frac{10 \text{ min}}{60 \text{ min}} = \frac{1}{6} = 0,1667$$

Remplazado valores de la fórmula se obtiene: $P(X \leq x) = 1 - e^{-\lambda \cdot t}$



$$P(X \leq 10) = 1 - e^{-10 \cdot \frac{1}{6}} = 0,8111$$

Empleando GeoGebra



$$3) P(5 \leq X \leq 10) = P(X \leq 10) - P(X \leq 5)$$

$$P(5 \leq X \leq 10) = 0,8111 - 0,5654 = 0,2457$$



$$4) P(X > 5) = 1 - P(X \leq 5)$$

$$P(X > 5) = 1 - 0,5654 = 0,4346$$

En los cálculos empleando Excel se muestran en la siguiente figura:

	A	B	C	D	E
1	t	1/12	=5/60		
2	λ	10			
3	$P(X \leq 5)$	0,5654	=DISTR.EXP(B1;B2;VERDADERO)		
4					
5	t	1/6	=10/60		
6	λ	10			
7	$P(X \leq 10)$	0,8111	=DISTR.EXP(B5;B6;VERDADERO)		
8					
9	$P(5 \leq X \leq 10)$	0,2457	=B7-B3		
10					
11	$P(X > 5)$	0,4346	=1-B3		

TAREA DE INTERAPRENDIZAJE N° 10

1) Demuestre que $P(X > x) = e^{-\lambda \cdot t}$

2) Resuelva los siguientes ejercicios de aplicación empleando la fórmula, mediante Excel y GeoGebra.

2.1) La tasa promedio de llegada de clientes que compran en un local comercial es de 1,5 por hora. Calcular la probabilidad de que no más de dos horas transcurran entre llegadas de los mencionados clientes?

0,9502

2.2) Los barcos llegan a un puerto en una tasa promedio de 8 por hora. ¿Cuál es la probabilidad de que transcurran más de 15 minutos entre la llegada de 2 barcos?


0,1353

2.3) Plantee y resuelva dos ejercicios de aplicación similares a los anteriores empleando datos reales sobre cualquier tema de su preferencia.

2.4) Plantee y resuelva un ejercicio de aplicación similar al ejemplo ilustrativo de la distribución exponencial empleando datos reales sobre cualquier tema de su preferencia.

C) DISTRIBUCIÓN UNIFORME

i) Definición.- Es una distribución en el intervalo $[a, b]$ en la cual las probabilidades son las mismas para todos los posibles resultados, desde el mínimo de **a** hasta el máximo de **b**. El experimento de lanzar un dado es un ejemplo que cumple la distribución uniforme, ya que todos los 6 resultados posibles tienen $1/6$ de probabilidad de ocurrencia.



ii) Función de densidad de una distribución uniforme (altura de cada rectángulo en la gráfica anterior) es:

$$f(X) = \text{Altura} = \frac{1}{b - a}$$

Donde:

a = mínimo valor de la distribución

b = máximo valor de la distribución

b - a = Rango de la distribución

iii) La media, valor medio esperado o esperanza matemática de una distribución uniforme se calcula empleando la siguiente fórmula:

$$E(X) = \mu = \frac{a + b}{2}$$

iv) La varianza de una distribución uniforme se calcula empleando la siguiente fórmula:

$$\sigma^2 = \frac{(b - a)^2}{12}$$

De donde la desviación estándar es $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$

v) La probabilidad de que una observación caiga entre dos valores se calcula de la siguiente manera:

$$P(X_1 \leq X \leq X_2) = \frac{X_2 - X_1}{b - a}$$

Ejemplo ilustrativo

Sea X el momento elegido al azar en que un estudiante recibe clases en un determinado día entre las siguientes horas: 7:00 - 8:00 - 9:00 - 10:00 - 11:00 - 12:00 - 13:00

- 1) ¿Cuál es la función de densidad de la variable X?
- 2) Elaborar un gráfico de la distribución de probabilidades
- 3) Calcular el valor medio esperado
- 4) Calcular la desviación estándar
- 5) Calcular la probabilidad de que llegue en la primera media hora
- 6) Si recibe clases de Estadística Aplicada de 10:00 a 12:15, calcular la probabilidad de recibir esta asignatura.

Solución:


1) $a = 7$ y $b = 13$

Reemplazando valores en la ecuación de la función de densidad se obtiene:

$$f(X) = \text{Altura} = \frac{1}{b - a}$$

$$f(X) = \text{Altura} = \frac{1}{13 - 7} = \frac{1}{6} = 0,167$$

2) Elaborando el gráfico de la distribución de probabilidad empleando Excel se obtiene:



Interpretación:

Cada rectángulo tiene 1 de base y $1/6 = 0,167$ de altura.

El área de cada rectángulo es:

$$A_{\square} = \text{base} \cdot \text{altura} = 1 \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{6}$$

El área total (rectángulo de base el intervalo 7-13 y altura $1/6=0,167$) representa a la suma de todas las probabilidades, y es igual a uno:

$$A_{\square} = \text{base} \cdot \text{altura} = (13 - 7) \cdot \frac{1}{6} = 6 \cdot \frac{1}{6} = 1$$

3) Reemplazando valores en la fórmula del valor esperado se obtiene:

$$E(X) = \mu = \frac{a + b}{2}$$
$$E(X) = \mu = \frac{7 + 13}{2} = 10$$

4) Reemplazando valores en la fórmula de la varianza se obtiene:

$$\sigma^2 = \frac{(b - a)^2}{12}$$
$$\sigma^2 = \frac{(13 - 7)^2}{12} = \frac{(6)^2}{12} = \frac{36}{12} = 3$$

Por lo tanto la desviación estándar es: $\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{3} = 1,732$

5) Llegar en la primera media hora significa que llega a la 7:30. Por lo tanto se debe calcular la probabilidad entre las 7:00 y las 7:30.

Como 7:30 = 7 horas + 30 minutos, y el porcentaje que representa 30 minutos de una hora es:


$$\frac{30}{60} = 0,5 \Rightarrow 7:30 = 7,5 \text{ horas}$$

Por lo tanto se debe calcular la probabilidad entre 7 y 7,5

Aplicando la fórmula de la probabilidad entre dos valores se obtiene:

$$P(X_1 \leq X \leq X_2) = \frac{X_2 - X_1}{b - a}$$
$$P(7 \leq X \leq 7,5) = \frac{7,5 - 7}{13 - 7} = \frac{0,5}{6} = 0,0833$$

En el siguiente gráfico se muestra la probabilidad calculada:



6) Se debe calcular la probabilidad entre las 10:00 y las 12:15

Como 12:15 = 12horas + 15 minutos, y el porcentaje que representa 15 minutos de una hora es:
 $\frac{15}{60} = 0,25 \Rightarrow 12:15 = 12,25 \text{ horas}$


Por lo tanto de debe calcular la probabilidad entre 10 y 12,25

Aplicando la fórmula de la probabilidad entre dos valores se obtiene:

$$P(X_1 \leq X \leq X_2) = \frac{X_2 - X_1}{b - a}$$

$$P(10 \leq X \leq 12,25) = \frac{12,25 - 10}{13 - 7} = \frac{2,25}{6} = 0,375$$

En el siguiente gráfico se muestra la probabilidad calculada:



Los cálculos empleando Excel se muestran en la siguiente figura:

	A	B	C	D	E
1	7		a	7	=MIN(A1:A7)
2	8		b	13	=MAX(A1:A7)
3	9				
4	10		Altura = $\frac{1}{b - a}$	0,167	=1/(D2-D1)
5	11				
6	12		$\mu = \frac{a + b}{2}$	10	=PROMEDIO(D1:D2)
7	13				
8			$\sigma^2 = \frac{(b - a)^2}{12}$	3	=(D2-D1)^2/12
9					
10			$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$	1,732	=RAIZ(D8)
11					
12			X_1	7	
13			X_2	7,5	
14			$P(X_1 \leq X \leq X_2) = \frac{X_2 - X_1}{b - a}$	0,083	=(D13-D12)/(D2-D1)
15					
16					
17			X_1	10	
18			X_2	12,25	
19			$P(X_1 \leq X \leq X_2) = \frac{X_2 - X_1}{b - a}$	0,375	=(D18-D17)/(D2-D1)
20					

TAREA DE INTERAPRENDIZAJE N° 11

1) Realice un organizador gráfico de la distribución uniforme


2) Los tiempos de terminación de una obra varían entre 10 días y 18 días. ¿Cuál es la probabilidad de que se requiera entre 12 y 16 días para realizar la mencionada obra?. Realice un gráfico que ilustre la probabilidad calculada. Resuelva el ejercicio de manera manual y empleando Excel.

0,5



3) Ciertos recipientes contienen agua con un volumen uniformemente distribuido de media igual a 25 litros y un rango de 2 litros. Calcule la probabilidad de seleccionar un recipiente que contenga entre 24,5 y 26 litros. Realice un gráfico que ilustre la probabilidad calculada. Resuelva el ejercicio de manera manual y empleando Excel.

0,75




4) Sea X el momento elegido al azar en que un estudiante recibe clases en un determinado día entre las siguientes horas: 15:00 - 16:00 - 17:00 - 18:00 - 19:00 - 20:00 - 21:00. Resuelva el ejercicio de manera manual y empleando Excel.

4.1) ¿Cuál es la función de densidad de la variable X?


0,167

4.2) Elabore un gráfico de la distribución de probabilidades



- 4.3) Calcule el valor medio esperado 18
- 4.4) Calcule la desviación estándar 1,732
- 4.5) Calcule la probabilidad de que llegue en los primeros 15 minutos. Realice un gráfico que ilustre la probabilidad calculada. 0,042
- 4.6) Si recibe clases de Estadística Aplicada de 19:30 a 21:00, calcular la probabilidad de recibir esta asignatura. Realice un gráfico que ilustre la probabilidad calculada. 0,25
- 5) Sea X el contenido de envases de azúcar producidos por la empresa D & M elegido al azar. El contenido de los envases varía entre 998 y 1002 gramos. Resuelva el ejercicio de manera manual y empleando Excel.
- 5.1) ¿Cuál es la función de densidad de la variable X ? 0,25

5.2) Elaborar un gráfico de la distribución de probabilidades.



- 5.3) Calcular el valor medio esperado. 1000
- 5.4) Calcular la desviación estándar. 1,155
- 5.5) Calcular la probabilidad de que un envase pese entre la esperanza matemática y 1000,5 gramos. Realice un gráfico que ilustre la probabilidad calculada. 0,125
- 6) Plantee y resuelva 2 ejercicios de aplicación sobre la distribución uniforme empleando datos reales sobre cualquier tema de su preferencia. Resuelva de manera manual y empleando Excel.

D) DISTRIBUCIÓN NORMAL

i) Reseña histórica

Abraham De Moivre (1733) fue el primero en obtener la ecuación matemática de la curva normal. Karl Friedrich Gauss y Márquez De Laplace (principios del siglo diecinueve) desarrollaron más ampliamente los conceptos de la curva. La curva normal también es llamada curva de error, curva de campana, curva de Gauss, distribución gaussiana o curva de De Moivre.

Su altura máxima se encuentra en la media aritmética, es decir su ordenada máxima corresponde a una abscisa igual a la media aritmética. La asimetría de la curva normal es nula y por su grado de apuntamiento o curtosis se clasifica en mesocúrtica.

ii) Ecuación

Su ecuación matemática de la función de densidad es:

$$Y = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(X-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Donde:

σ = desviación estándar

σ^2 = varianza

π = 3,141592654 constante matemática

e = 2,7182818 constante matemática

X = valor en el eje horizontal

Y = altura de la curva para cualquier valor de x

μ = media aritmética

Cuando se expresa la variable x en unidades estándar (fórmula de estandarización)

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

La ecuación anterior es remplazada por la llamada forma canónica, la cual es


$$Y = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}Z^2}$$

Para calcular Y empleando Excel se procede de la siguiente manera:

a) Se ubica valores para X del -3 hasta el 3. Se inserta la función DISTR.NORM.ESTAND.N. En la ventana de argumentos de función, en Z se selecciona A2 que representa al -3, y en Acumulado se escribe FALSO. Clic en Aceptar. Se arrastra con el mouse para obtener los demás valores.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	X	Y	$Y = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(X-\mu)^2}{2\sigma^2}}$						
2	-3	=DISTR.NORM.ESTAND.N(A2;FALSO)							
3	-2,5								
4	-2								
5	-1,5								
6	-1								
7	-0,5								
8	0								
9	0,5								
10	1								
11	1,5								
12	2								
13	2,5								
14	3								

b) Para obtener la gráfica se inserta gráfico de dispersión.




Nota: No existe una única distribución normal, sino una familia de distribuciones con una forma común, diferenciadas por los valores de su media y su varianza. De entre todas ellas, la más utilizada es la **distribución normal estándar**, que corresponde a una distribución con una media aritmética de 0 y una desviación típica de 1.

iii) Área bajo la curva

El área total limitada por la curva y el eje "X" es 1, por lo tanto, el área bajo la curva entre $X = a$ y $X = b$, con $a < b$, representa la probabilidad de que X esté entre a y b . Esta probabilidad se denota por:


$$P(a < X < b)$$

Esta probabilidad se ilustra en el siguiente gráfico elaborado con el programa Winstats.




Para elaborar el gráfico se procede de la siguiente manera:


a) Se abre el programa. Clic en Window- Probability




b) Clic en Normal




c) Para cambiar el color del fondo, maximizar la ventana de la curva. Clic en Edit-Colors y luego en Window background. Seleccionar el color blanco para el fondo.



d) Para escribir, clic en Btns y luego en Text mode. Clic derecho en cualquier parte de la pantalla. Luego escribir en la venta edit text. Clic en ok



e) Se obtiene el siguiente gráfico




Ejemplos ilustrativos

1) Calcule el área bajo la curva de distribución normal entre $Z = 0,8$ y $Z = 2,12$

Solución:


Realizando el gráfico en Winstats y Paint se obtiene:



El área a la izquierda de $Z = 0,8$ con lectura en la tabla de la distribución normal es 0,7881
El área a la izquierda de $Z = 2,12$ con lectura en la tabla de la distribución normal es 0,9830

**TABLA N° 3
DISTRIBUCIÓN NORMAL**

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$




Ejemplo:
 $P(Z \leq -1,96) = 0,0250$

Z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
	∴		∴							
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857

El área $Z = 0,8$ y $Z = 2,12$ es $0,9830 - 0,7881 = 0,1949$

Los cálculos empleando GeoGebra se presentan en la siguiente figura:




Los cálculos empleando Excel se muestran en la siguiente figura:

	A	B	C	D	E	F
1	Z_1	0,8				
2	Z_2	2,12				
3	Área a la izquierda de Z_1	0,7881	=DISTR.NORM.ESTAND.N(B1;VERDADERO)			
4	Área a la izquierda de Z_2	0,9830	=DISTR.NORM.ESTAND.N(B2;VERDADERO)			
5	$P(0,8 \leq X \leq 2,12)$	0,1949	=B4-B3			

2) Calcule Z si el área entre -1,5 y Z es 0,0217

Solución:

Realizando un gráfico ilustrativo empleando Winstats y Paint se obtiene:



Los cálculos empleando Excel se muestran en la siguiente figura:

	A	B	C	D	E	F
1	Z	-1,5				
2	Área entre Z y Z ₁	0,0217				
3	Área a la izquierda de Z	0,0668	=DISTR.NORM.ESTAND.N(B1;VERDADERO)			
4	Área a la izquierda de Z ₁	0,0885	=B2+B3			
5	Z ₁	-1,3500	=INV.NORM.ESTAND(B4)			
6	Área a la izquierda de Z ₂	0,0451	=B3-B2			
7	Z ₂	-1,6943	=INV.NORM.ESTAND(B6)			


3) El peso promedio de 200 estudiantes varones de cierta universidad es 151 libras con una desviación típica de 15 libras. Si los pesos están distribuidos normalmente, calcular la probabilidad y el número de estudiantes que pesan Entre 120 y 155 libras

Solución: La curva normal corresponde a una función continua (valor decimal). Para resolver estos problemas se emplea los límites inferior y superior según sea el caso, es decir, para este problema es entre 119,5 y 155,5 libras

Para saber la ubicación de los datos dentro de una distribución estadística nos valemos de los puntajes Z. Para calcular los puntajes Z se normaliza o estandariza los datos de la siguiente manera:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} ; Z_1 = \frac{X_1 - \mu}{\sigma} = \frac{119,5 - 151}{15} = -2,1 ; Z_2 = \frac{X_2 - \mu}{\sigma} = \frac{155,5 - 151}{15} = 0,3$$

Graficando se obtiene:



El área a la izquierda de $Z = 0,3$ con lectura en la tabla de la distribución normal es 0,6179
 El área a la izquierda de $Z = -2,1$ con lectura en la tabla de la distribución normal es 0,0179
 El área entre $-2,1$ y $0,3$ es $0,6179 - 0,0179 = 0,6 = 60\%$
 El número de estudiantes es $0,6 \times 200 = 120$

Los cálculos empleando Excel se muestran en la siguiente figura:

	A	B	C	D	E	F
1	n	200				
2	μ	151				
3	σ	15				
4	X_1	119,5				
5	X_2	155,5				
6	Z_1	-2,1	=NORMALIZACION(B4;B2;B3)	$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$		
7	Z_2	0,3	=NORMALIZACION(B5;B2;B3)			
8	Área a la izquierda de Z_1	0,0179	=DISTR.NORM.ESTAND.N(B6;VERDADERO)			
9	Área a la izquierda de Z_2	0,6179	=DISTR.NORM.ESTAND.N(B7;VERDADERO)			
10	Área entre Z_1 y Z_2	0,60	=B9-B8			
11	Número de estudiantes	120	=B10*B1			


- 4) Las calificaciones que obtienen los alumnos en un examen siguen una distribución normal, siendo la media igual a 14. El 70% de los alumnos obtienen una calificación inferior a 16.
 a) Calcule la desviación típica de las calificaciones
 b) Se escoge un alumno al azar, calcule el porcentaje de obtener una calificación superior a 18

Solución

a)
 Si el área es inferior al 70%, entonces con lectura en la tabla se obtiene el valor de $Z = 0,52$
 Reemplazando valores en la fórmula y realizando las operaciones se obtiene:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \Rightarrow 0,52 = \frac{16 - 14}{\sigma} \Rightarrow \sigma = \frac{16 - 14}{0,52} = 3,8$$

El gráfico elaborado empleando Winstats es:



b)

Remplazando valores en la fórmula se obtiene el siguiente puntaje o número Z:


$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \Rightarrow Z = \frac{18 - 14}{3,8} \Rightarrow Z = 1,05$$

Con lectura en la tabla para $Z = 1,05$ se obtiene un área de 0,8531, la cual representa una probabilidad inferior a la calificación de 18

Para calcular la probabilidad de obtener una calificación superior a 18 se realiza la siguiente operación:

$$P(X > 18) = 1 - 0,8531 = 0,1469 = 14,7\%$$

El gráfico elaborado empleando Winstats y en Paint es:



Por lo tanto existe una probabilidad de 14,7% de obtener una calificación superior a 18

5) Las longitudes de las truchas que se pescan en un lago de Ecuador se distribuyen normalmente con una media de 48 cm y desviación estándar 5 cm.

Calcule:

- El porcentaje de truchas pescadas que superan los 55 cm
- La probabilidad de que una trucha pescada tenga una longitud comprendida entre 45 y 52 cm
- Las truchas con longitudes inferiores a la media menos 1,5 desviaciones estándar deben ser devueltas al lago. En un día normal se pescan hasta 38 truchas. ¿Cuántas truchas deben ser devueltas al lago?
- Los restaurantes compran a los pescadores todas las truchas cuyas longitudes estén comprendidas entre 40 y 45 cm por considerarlas óptimas para fines culinarios. Si durante un mes de pesca se extraen del lago, en promedio, 750 truchas. ¿Cuántas de ellas se venden a los restaurantes?
- El 12% de las truchas más grandes se registran en un anuario de pescadores. ¿Cuál es la longitud mínima para que una trucha pueda ser registrada en ese anuario?

Solución:

Datos:

$$\mu = 48 \text{ cm}$$


$$\sigma = 5 \text{ cm}$$

a)

Tipificando (estandarizando) la variable se obtiene

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{55\text{cm} - 48\text{cm}}{5\text{cm}} = 1,4$$

Graficando con Winstats




Con lectura de la tabla

$$P(x > 55\text{cm}) = P(Z > 1,4) = 1 - 0,9192 = 0,0808$$

El porcentaje para $x > 55\text{cm}$ es $0,0808 \cdot 100\% = 8,08\%$

Empleando GeoGebra



Empleando Excel

	A	B	C	D	E	F
1	x	55				
2	μ	48				
3	σ	5				
4	Z	1,4	= $(B1-B2)/B3$			
5	Área a la izquierda de Z	0,91924	= $DISTR.NORM.ESTAND.N(B4;VERDADERO)$			
6	Área a la derecha de Z	0,08076	= $1-B5$			
7	Porcentaje superior a x	8,08%	= $B6$			

b)

Tipificando la variable

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

$$Z_1 = \frac{x_1 - \mu}{\sigma} = \frac{45\text{cm} - 48\text{cm}}{5\text{cm}} = -0,6$$

$$Z_2 = \frac{x_2 - \mu}{\sigma} = \frac{52\text{cm} - 48\text{cm}}{5\text{cm}} = 0,8$$

Con lectura en la tabla


$$P(x < 45\text{cm}) = P(Z < -0,6) = 0,2743$$

$$P(x < 52\text{cm}) = P(Z < 0,8) = 0,7881$$

Entonces

$$P(45\text{cm} \leq x \leq 52\text{cm}) = 0,7881 - 0,2743 = 0,5138$$

Empleando GeoGebra



Empleando Excel

	A	B	C	D	E	F
1	x_1	45				
2	x_2	52				
3	μ	48				
4	σ	5				
5	Z_1	-0,6	$=(B1-B3)/B4$			
6	Z_2	0,8	$=(B2-B3)/B4$			
7	Área a la izquierda de Z_1	0,2743	$=\text{DISTR.NORM.ESTAND.N}(B5;\text{VERDADERO})$			
8	Área a la izquierda de Z_2	0,7881	$=\text{DISTR.NORM.ESTAND.N}(B6;\text{VERDADERO})$			
9	$P(x_1 \leq x \leq x_2)$	0,5139	$=B8-B7$			

c)

$$x = 48\text{cm} - 1,5(5\text{cm}) = 40,5\text{cm}$$

Tipificando la variable

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{40,5\text{cm} - 48\text{cm}}{5\text{cm}} = -1,5$$


Con lectura en la tabla

$$P(x < 40,5\text{cm}) = P(Z < -1,5) = 0,0668$$

Truchas para devolver al lago

$$\text{Número esperado} = E = n \cdot p = 38 \text{ truchas} \cdot 0,0668 = 3 \text{ truchas}$$

Empleando GeoGebra



Empleando Excel

	A	B	C	D	E	F
1	x	40,5	=B2-1,5*B3			
2	μ	48				
3	σ	5				
4	Z	-1,5	=(B1-B2)/B3			
5	Área a la izquierda de Z	0,0668	=DISTR.NORM.ESTAND.N(B4;VERDADERO)			
6	Truchas pescadas al día	38				
7	Número de truchas a devolver al lago	3	=B6*B5			

d)

Tipificando la variable

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

$$Z_1 = \frac{x_1 - \mu}{\sigma} = \frac{40\text{cm} - 48\text{cm}}{5\text{cm}} = -1,6$$

$$Z_2 = \frac{x_2 - \mu}{\sigma} = \frac{45\text{cm} - 48\text{cm}}{5\text{cm}} = -0,6$$

Con lectura en la tabla

$$P(x < 40\text{cm}) = P(Z < -1,6) = 0,0548$$

$$P(x < 45\text{cm}) = P(Z < -0,6) = 0,2743$$


Entonces

$$P(40\text{cm} \leq x \leq 45\text{cm}) = 0,2743 - 0,0548 = 0,2195$$

Truchas para vender a los restaurantes

$$\text{Número esperado} = E = n \cdot p = 750 \text{ truchas} \cdot 0,2195 = 165 \text{ truchas}$$

Empleando GeoGebra



Empleando Excel

	A	B	C	D	E	F
1	x_1	40				
2	x_2	45				
3	μ	48				
4	σ	5				
5	Z_1	-1,6	$=(B1-B3)/B4$			
6	Z_2	-0,6	$=(B2-B3)/B4$			
7	Área a la izquierda de Z_1	0,0548	$=\text{DISTR.NORM.ESTAND.N}(B5;\text{VERDADERO})$			
8	Área a la izquierda de Z_2	0,2743	$=\text{DISTR.NORM.ESTAND.N}(B6;\text{VERDADERO})$			
9	$P(x_1 \leq x \leq x_2)$	0,2195	$=B8-B7$			
10	Truchas al mes	700				
11	Número esperado	154	$=B9*B10$			

e)

Porcentaje a la izquierda de $Z = 100\% - 12\% = 88\%$

Área a la izquierda de Z es $\frac{88\%}{100\%} = 0,88$


Con lectura en la tabla

$$Z = \frac{1,17 + 1,18}{2} = 1,175$$

Despejando x y reemplazando valores

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma} \Rightarrow x = Z \cdot \sigma + \mu \Rightarrow x = 1,175 \cdot 5 + 48\text{cm} \Rightarrow x = 53,875 \text{ cm}$$

Empleando GeoGebra



	A	B	C	D
1	Porcentaje a la derecha de Z	12		
2	Porcentaje a la izquierda de Z	88	=100-B1	
3	Área a la izquierda de Z	0,88	=B2/100	
4	Z	1,175	=INV.NORM.ESTAND(B3)	
5	μ	48		
6	σ	5		
7	x	53,875	=B4*B6+B5	

TAREA DE INTERAPRENDIZAJE N° 12

- 1) Realice un organizador gráfico sobre la distribución normal
- 2) Empleando Excel grafique la campana de la distribución normal calculando previamente los respectivos valores de función de densidad.
- 3) Calcule el área bajo la curva de distribución normal empleando la tabla de la distribución normal, Excel y GeoGebra entre:
 - a) $Z = 0$ y $Z = 1,2$ 0,3849
 - b) $Z = 1,2$ y $Z = 2,2$ 0,1012
 - c) $Z = -2,2$ y $Z = -1,2$ 0,1012
 - d) $Z = -2$ y $Z = 1$ 0,8186
 - e) $Z = -1$ y $Z = 1$ 0,6827
 - f) $Z = -2$ y $Z = 2$ 0,9545
 - g) $Z = -3$ y $Z = 3$ 0,9973
 - h) A la izquierda de $Z = 1,54$ 0,9382
 - i) A la izquierda de $Z = -1,54$ 0,0618
 - j) A la izquierda de $Z = -0,6$ 0,2743
 - k) A la izquierda de $Z = 0,6$ 0,7257
 - l) Plantee y resuelva un ejercicio similar a los anteriores

4) Calcule Z de forma manual, empleando Excel y Winstats, si:

- a) El área entre 0 y Z es 0,3531 ±1.05
- b) El área entre 0 y Z es 0,3972 y Z es positivo 1,266
- c) El área a la derecha de Z es 0,115 1,20
- d) El área a izquierda de Z es 0,8621 1,09
- e) El área a la izquierda de Z es 0,6692 0,44
- f) El área entre -1 y Z es 0,8186 2
- g) El área entre -1 y Z es 0,1499 -2,38 y -0,5
- h) El área entre -0,5 y Z es 0,2313 -1,42 y 0,1
- i) El área entre 0,5 y Z es 0,1450 0,12 y 0,98
- j) Plantee y resuelva un ejercicio similar a los anteriores

5) En cierta área, un conductor promedio recorre una distancia de 1200 millas al mes (1,609 Km al mes), con una desviación estándar de 150 millas. Suponga que el número de millas se aproxima mediante una curva normal, encuentre la probabilidad de todos los automovilistas que recorren entre 1200 y 1600 millas por mes. Resuelva empleando la tabla de la distribución normal, Excel y Winstats 49,6%

6) Se sabe que la longitud de cierto mueble se distribuye en forma normal con una media de 84 cm y una desviación estándar 0,4. Calcular el porcentaje de muebles que cumplen con especificaciones 84 ± 1 . Resuelva empleando la tabla de la distribución normal, Excel y Winstats 98,76%

7) Las calificaciones que obtienen alumnos universitarios en un examen siguen una distribución normal, siendo la media igual a 7. El 80% de los alumnos obtienen una calificación inferior a 8. Resuelva empleando la tabla de la distribución normal, Excel y Winstats

- a) Calcule la desviación típica de las calificaciones 1,2
- b) Se escoge un alumno al azar, calcule el porcentaje de obtener una calificación superior a 9 4,6%

8) La altura de los árboles de un bosque sigue una distribución normal con una altura media de 17 m. Se selecciona un árbol al azar. La probabilidad de que la altura del árbol seleccionado sea mayor que 24 metros es 6%. Si se selecciona al azar 100 árboles. Utilice Excel y GeoGebra.

- a) Calcule la desviación típica de las alturas de los árboles 4,5
- b) Calcule el número esperado de árboles cuyas alturas varían entre 17m y 24m.

44

9) La temperatura en la ciudad de Ibarra durante el mes de septiembre sigue una distribución normal con una temperatura media de 19° . Se selecciona un día al azar. La probabilidad de que la temperatura del día seleccionado sea mayor que 24° es 4,78%. Emplee Excel y Winstats.

a) Calcule la desviación típica de la temperatura en la ciudad Ibarra durante el mes de septiembre 3

b) Calcule el número de días en la ciudad de Ibarra durante el mes de septiembre cuyas temperaturas varían entre 14° y 24° . 27

10) Cree y resuelva un problema similar al anterior con una ciudad de su preferencia. Utilice Excel y GeoGebra.

11) Las calificaciones de los estudiantes de un colegio siguen una distribución normal con una media de 15. Se selecciona un estudiante al azar. La probabilidad de que la calificación del estudiante sea mayor que 17 es del 8%. Resuelva empleando la tabla de la distribución normal, Excel y Winstats

a) Calcule la desviación típica de las calificaciones 1,4

b) Calcule la probabilidad de que el estudiante seleccionado tenga una calificación menor que 17 0,92

c) La probabilidad de que el estudiante tenga una calificación menor que X es 0,08. Calcular el valor de X. 13

d) Se selecciona al azar 100 estudiantes. Calcule el número esperado de estudiantes cuyas calificaciones varían entre 1 y 13 8

12) Las calificaciones que obtienen los alumnos en un examen, cuya máxima nota es 10, siguen una distribución normal, siendo la media igual a 7. El 70% de los alumnos obtienen una calificación inferior a 8,5. Se escoge un alumno al azar, éste alumno tiene la misma probabilidad de obtener una calificación inferior a 9 que una calificación superior a X. Emplear la tabla de la distribución normal, Excel y Winstats

a) Calcule la desviación típica de las calificaciones 2,86

b) Calcule el porcentaje de obtener una calificación inferior a 9 75,78%

c) Calcule el valor de X 5

13) Plantee y resuelva un problema similar al anterior con datos obtenidos en un examen o prueba de cualquier asignatura de su preferencia. Emplee la tabla de la distribución normal, Excel y GeoGebra.

14) Investigue en la biblioteca o internet sobre el empleo o aplicación de los puntajes Z (números Z). Presente la consulta empleando un organizador gráfico.

CAPÍTULO III

ESTIMACIÓN DE INTERVALOS DE CONFIANZA

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL CAPÍTULO

Al finalizar el presente capítulo el lector podrá evidenciar que:

- ✓ Calcula e interpreta estimaciones de intervalos de confianza de manera manual, empleando Excel, Winstats y GeoGebra.
- ✓ Calcula el tamaño de una muestra a partir de situaciones concretas de la vida cotidiana de manera manual, empleando Excel y Winstats.
- ✓ Plantea y resuelve ejercicios de aplicación sobre intervalos de confianza y del tamaño de una muestra de manera manual, utilizando Excel, Winstats y GeoGebra.

CONTENIDOS

- ✓ Estimación del intervalo de confianza para la media (σ conocida)
- ✓ Estimación del intervalo de confianza para la media (σ desconocida).- Distribución t de Student
- ✓ Estimación del intervalo de confianza para una proporción
- ✓ Determinación del tamaño de la muestra

ESTIMACIÓN DE INTERVALOS DE CONFIANZA

La estadística inferencial es el proceso de uso de los resultados derivados de las muestras para obtener conclusiones acerca de las características de una población. La estadística inferencial nos permite estimar características desconocidas como la media de la población o la proporción de la población. Existen dos tipos de estimaciones usadas para estimar los parámetros de la población: la estimación puntual y la estimación de intervalo. Una estimación puntual es el valor de un solo estadístico de muestra. Una estimación del intervalo de confianza es un rango de números, llamado intervalo, construido alrededor de la estimación puntual. El intervalo de confianza se construye de manera que la probabilidad del parámetro de la población se localice en algún lugar dentro del intervalo conocido.

Suponga que quiere estimar la media de todos los alumnos en su universidad. La media para todos los alumnos es una media desconocida de la población, simbolizada como μ . Usted selecciona una muestra de alumnos, y encuentra que la media es de 5,8. La muestra de la media $\bar{x} = 5,8$ es la estimación puntual de la media poblacional μ . ¿Qué tan preciso es el 5,8? Para responder esta pregunta debe construir una estimación del intervalo de confianza.

Recuerde que la media de la muestra \bar{x} es una estimación puntual de la media poblacional μ . Sin embargo, la media de la muestra puede variar de una muestra a otra porque depende de los elementos seleccionados en la muestra. Tomando en cuenta la variabilidad de muestra a muestra, se aprenderá a desarrollar la estimación del intervalo para la media poblacional. El intervalo construido tendrá una confianza especificada de la estimación correcta del valor del parámetro poblacional μ . En otras palabras, existe una confianza especificada de que μ se encuentre en algún lugar en el rango de números definidos por el intervalo.

En general, el *nivel de confianza* se simboliza con $(1 - \alpha) \cdot 100\%$, donde α es la proporción de las colas de la distribución que están fuera del intervalo de confianza. La proporción de la cola superior e inferior de la distribución es $\alpha/2$

Ejemplo ilustrativo

Calcular la proporción de cola superior e inferior para un intervalo del 95% de confianza

Solución:

$$\text{Nivel de confianza} = (1 - \alpha) \cdot 100\%$$

Remplazando valores en la fórmula anterior del nivel de confianza se obtiene:

$$95\% = (1 - \alpha) \cdot 100\% \Rightarrow \frac{95\%}{100\%} = (1 - \alpha) \Rightarrow \alpha = 1 - \frac{95\%}{100\%} \Rightarrow \alpha = 1 - 0,95 = 0,05$$

La proporción de la cola superior e inferior de la distribución es:


$$\frac{\alpha}{2} = \frac{0,05}{2} = 0,025$$

Otra forma para calcular la proporción de la cola superior e inferior de la distribución es aplicando la siguiente fórmula:

$$\frac{\alpha}{2} = \frac{100\% - \text{Nivel de confianza}}{200}$$

$$\frac{\alpha}{2} = \frac{100\% - 95\%}{200} = 0,025$$

El siguiente gráfico ilustra lo calculado:



3.1) ESTIMACIÓN DEL INTERVALO DE CONFIANZA PARA LA MEDIA (σ CONOCIDA)

Se emplea la siguiente fórmula:

$$\bar{x} - Z \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + Z \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Donde:

Z = valor crítico de la distribución normal estandarizada

Se llama *valor crítico* al valor de Z necesario para construir un intervalo de confianza para la distribución. El 95% de confianza corresponde a un valor α de 0,05. El valor crítico Z correspondiente al área acumulativa de 0,975 es 1,96 porque hay 0,025 en la cola superior de la distribución y el área acumulativa menor a Z = 1,96 es 0,975.


Un nivel de confianza del 95% lleva a un valor Z de 1,96. El 99% de confianza corresponde a un valor α de 0,01. El valor de Z es aproximadamente 2,58 porque el área de la cola alta es 0,005 y el área acumulativa menor a Z = 2,58 es 0,995.

Ejemplo ilustrativo

Si $\bar{x} = 24$; $\sigma = 3$ y $n = 36$ construya para la media poblacional μ una estimación de intervalo de confianza del 95%

Solución:

Realizando un gráfico ilustrativo empleando Winstats y Paint se obtiene:



Con lectura en la tabla de la distribución normal para un área de 0,025 se obtiene $Z = -1,96$. Por simetría se encuentra el otro valor $Z = 1,96$

Remplazando valores y realizando los cálculos se obtiene:

$$\bar{x} - Z \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + Z \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$24 - 1,96 \frac{3}{\sqrt{36}} \leq \mu \leq 24 + 1,96 \frac{3}{\sqrt{36}}$$

$$23,02 \leq \mu \leq 24,98$$


Los cálculos empleando Excel se muestran en la siguiente figura:

	A	B	C	D	E	F
1	\bar{X}	24				
2	σ	3				
3	n	36				
4	Confianza	95				
5	α	0,05	$= (100 - B4) / 100$			
6	$Z \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$	0,98	$= \text{INTERVALO.CONFIANZA.NORM}(B5; B2; B3)$			
7						
8	23,02	$\leq \mu \leq$	24,98			
9	$= B1 - B6$		$= B1 + B6$			

Interpretación: Existe un 95% de confianza de que la media poblacional se encuentre entre 23,02 y 24,98

Empleando Geogebra se sigue los siguientes pasos:


a) En Entrada, seleccione IntervaloZ[<Muestra Media>, < σ >, <Tamaño Muestra>, <Nivel>]



b) En <Muestra Media> escribir 24, en < σ > escribir 3, en <Tamaño Muestra> escribir 36, y en <Nivel> escribir 0,95. Enter



O también



TAREA DE INTERAPRENDIZAJE N° 13

1) Conteste:

- 1.1) ¿Qué es estadística inferencial?
- 1.2) ¿Qué permite estimar la estadística inferencial?
- 1.3) ¿Qué es estimación puntual?
- 1.4) ¿Qué es estimación de intervalo?
- 1.5) ¿Para qué se sirve construir una estimación del intervalo de confianza?
- 1.6) ¿Qué es la media de la muestra?
- 1.7) ¿Por qué la media de la muestra puede variar?
- 1.8) ¿Por qué no se sabe con certeza si el intervalo específico incluye la media poblacional o no?
- 1.9) ¿Qué es nivel de confianza?
- 1.10) ¿Qué es valor crítico?
- 1.11) ¿El valor Z para el 95% de confianza es?
- 1.12) ¿El valor Z para el 99% de confianza es?

Resolver los siguientes ejercicios de manera manual, Empleando Excel y GeoGebra para realizar los cálculos y con Winstats para los gráficos

2) Si $\bar{x} = 24,2$; $\sigma = 3$ y $n = 36$ construya para la media poblacional μ una estimación de intervalo de confianza del

2.1) 95%

$$23,22 \leq \mu \leq 25,18$$

2.2) 99%

$$22,91 \leq \mu \leq 25,49$$

3) Un fabricante de papel para computadora tiene un proceso de producción que opera continuamente a lo largo del turno. Se espera que el papel tenga una media de longitud de 11 pulgadas y una desviación estándar de 0,02 pulgadas. Se selecciona una muestra de 100 hojas con una media de longitud del papel de 10,998 pulgadas. Calcule la estimación del intervalo de confianza del

3.1) 95%

$$10,99408 \leq \mu \leq 11,00192$$

3.2) 60%

$$10,99632 \leq \mu \leq 10,99968$$

4) El gerente de control de calidad de una fábrica de focos necesita estimar la media de vida de un gran embarque de focos. La desviación estándar es de 100 horas. Una muestra aleatoria de 64 focos indicó que la vida media de la muestra es de 350 horas. Calcule la estimación del intervalo de confianza para la media poblacional de vida de los focos de este embarque del

4.1) 95%

$$325,5 \leq \mu \leq 374,5$$

4.2) 98%

$$320,875 \leq \mu \leq 379,125$$

5) Las medias de los diámetros de una muestra aleatoria de 200 bolas de rodamientos producidas por una máquina es 0,824 cm. Se sabe la desviación estándar de la población es 0,042 cm. Calcule el intervalo de confianza a un 90%

$$0,819 \leq \mu \leq 0,83$$

6) Plantee y resuelva un ejercicio de aplicación similar a cualquiera de los anteriores.

3.2) ESTIMACIÓN DE INTERVALO DE CONFIANZA PARA LA MEDIA (σ DESCONOCIDA)

Así como la media poblacional μ suele ser desconocida, rara vez se conoce la desviación estándar real de la población σ . Por lo tanto, se requiere desarrollar una estimación del intervalo de confianza de μ usando sólo los estadísticos de muestra \bar{x} y S.

Se emplea la siguiente fórmula:

$$\bar{x} - t_{n-1} \frac{S}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + t_{n-1} \frac{S}{\sqrt{n}}$$

Donde t_{n-1} es el valor crítico de la distribución t con n-1 grados de libertad para un área de $\alpha/2$ en la cola superior

La distribución t supone que la población está distribuida normalmente. Esta suposición es particularmente importante para $n < 30$. Pero cuando la población es finita y el tamaño de la muestra constituye más del 5% de la población, se debe usar el factor finito de corrección para modificar las desviaciones estándar. Por lo tanto si cumple:

$$\frac{n}{N} \cdot 100\% > 5\%$$

Se aplica la ecuación

$$\bar{x} - t_{n-1} \frac{S}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}} \leq \mu \leq \bar{x} + t_{n-1} \frac{S}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$$

Siendo N el tamaño de la población y n el tamaño de la muestra

Antes de seguir continuando es necesario estudiar la distribución *t de Student*, por lo que a continuación se presenta una breve explicación de esta distribución.

Al comenzar el siglo XX, un especialista en Estadística de la Guinness Breweries en Irlanda llamado William S. Gosset deseaba hacer inferencias acerca de la media cuando la σ fuera desconocida. Como a los empleados de Guinness no se les permitía publicar el trabajo de investigación bajo sus propios nombres, Gosset adoptó el seudónimo de "Student". La distribución que desarrolló se conoce como la distribución t de Student.

Si la variable aleatoria X se distribuye normalmente, entonces el siguiente estadístico tiene una distribución t con n - 1 grados de libertad.

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}}$$

Esta expresión tiene la misma forma que el estadístico Z en la ecuación para la distribución muestral de la media con la excepción de que S se usa para estimar la σ desconocida.

Entre las principales propiedades de la distribución t se tiene:

En apariencia, la distribución t es muy similar a la distribución normal estandarizada. Ambas distribuciones tienen forma de campana. Sin embargo, la distribución t tiene mayor área en los extremos y menor en el centro, a diferencia de la distribución normal. Puesto que el valor de σ es desconocido, y se emplea S para estimarlo, los valores t son más variables que los valores Z.

Los grados de libertad n - 1 están directamente relacionados con el tamaño de la muestra n. A medida que el tamaño de la muestra y los grados de libertad se incrementan, S se vuelve una mejor estimación de σ y la distribución t gradualmente se acerca a la distribución normal estandarizada hasta que ambas son virtualmente idénticas. Con una muestra de 120 o más, S estima σ con la suficiente precisión como

para que haya poca diferencia entre las distribuciones t y Z. Por esta razón, la mayoría de los especialistas en estadística usan Z en lugar de t cuando el tamaño de la muestra es igual o mayor de 30.

Como se estableció anteriormente, la distribución t supone que la variable aleatoria X se distribuye normalmente. En la práctica, sin embargo, mientras el tamaño de la muestra sea lo suficientemente grande y la población no sea muy sesgada, la distribución t servirá para estimar la media poblacional cuando σ sea desconocida.


Los **grados de libertad** de esta distribución se calculan con la siguiente fórmula

$$n - 1$$

Donde n = tamaño de la muestra

Ejemplo: Imagínese una clase con 40 sillas vacías, cada uno elige un asiento de los que están vacíos. Naturalmente el primer alumno podrá elegir de entre 40 sillas, el segundo de entre 39, y así el número irá disminuyendo hasta que llegue el último alumno. En este punto no hay otra elección (grado de libertad) y aquel último estudiante simplemente se sentará en la silla que queda. De este modo, los 40 alumnos tienen 39 o n-1 grados de libertad.

Para leer en la tabla de la distribución t se procede de la siguiente manera:



Usted encontrará los valores críticos de t para los grados de libertad adecuados en la tabla para la distribución t. Las columnas de la tabla representan el área de la cola superior de la distribución t. Cada fila representa el valor t determinado para cada grado de libertad específico. Por ejemplo, con 10 grados de libertad, si se quiere un nivel de confianza del 90%, se encuentra el valor t apropiado como se muestra en la tabla. El nivel de confianza del 90% significa que el 5% de los valores (un área de 0,05) se encuentran en cada extremo de la distribución. Buscando en la columna para un área de la cola superior y en la fila correspondiente a 10 grados de libertad, se obtiene un valor crítico para t de 1.812. Puesto que t es una distribución simétrica con una media 0, si el valor de la cola superior es +1.812, el valor para el área de la cola inferior (0,05 inferior) sería -1.812. Un valor t de -1.812 significa que la probabilidad de que t sea menor a -1.812, es 0,05, o 5% (vea la figura).

Ejemplos ilustrativos:

1) Determinar el valor crítico de t con lectura en la tabla, Excel y Winstats en cada una de las siguientes condiciones para $1 - \alpha = 0,95$; $n = 13$

Solución:

Con lectura en la tabla

$$\text{Si } 1 - \alpha = 0,95 \Rightarrow \alpha = 1 - 0,95 = 0,05$$

Para leer en la tabla se necesita calcular el área de una cola, la cual es:

$$\frac{\alpha}{2} = \frac{0,05}{2} = 0,025$$

O también el área de una cola se calcula de la siguiente manera:

$$\frac{\alpha}{2} = \frac{1 - (1 - \alpha)}{2} \Rightarrow \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - 0,95}{2} = 0,025$$

Calculando los grados de libertad se tiene:

$$n - 1 = 13 - 1 = 12$$

α n-1	0,25	0,2	0,15	0,1	0,05	0,025	0,01	0,005	0,0005
1	1,0000	1,3764	1,9626	3,0777	6,3138	12,7062	31,8205	63,6567	636,6192
2	0,8165	1,0607	1,3862	1,8856	2,9200	4,3027	6,9646	9,9248	31,5991
3	0,7649	0,9785	1,2498	1,6377	2,3534	3,1824	4,5407	5,8409	12,9240
4	0,7407	0,9410	1,1896	1,5332	2,1318	2,7764	3,7469	4,6041	8,6103
5	0,7267	0,9195	1,1558	1,4759	2,0150	2,5706	3,3649	4,0321	6,8688
6	0,7176	0,9057	1,1342	1,4398	1,9432	2,4469	3,1427	3,7074	5,9588
7	0,7111	0,8960	1,1192	1,4149	1,8946	2,3646	2,9980	3,4995	5,4079
8	0,7064	0,8889	1,1081	1,3968	1,8595	2,3060	2,8965	3,3554	5,0413
9	0,7027	0,8834	1,0997	1,3830	1,8331	2,2622	2,8214	3,2498	4,7809
10	0,6998	0,8791	1,0931	1,3722	1,8125	2,2281	2,7638	3,1693	4,5869
11	0,6974	0,8755	1,0877	1,3634	1,7959	2,2010	2,7181	3,1058	4,4370
12	0,6955	0,8726	1,0832	1,3562	1,7823	2,1788	2,6810	3,0545	4,3178
13	0,6938	0,8702	1,0795	1,3502	1,7709	2,1604	2,6503	3,0123	4,2208

En la tabla con 12 grados de libertad y 0,025 de área se obtiene un valor de $t = 2,1788$, y por simetría es igual también a $t = -2,1788$

Para realizar los cálculos empleando Excel se procede de la siguiente manera:

a) Llenar los datos y hacer los cálculos del área de una cola y de los grados de libertad. Luego insertar función. En la casilla seleccionar una categoría, seleccionar Estadísticas. Seleccionar la función INV.T.


b) Clic en Aceptar. En la ventana Argumentos de la función, en Probabilidad seleccionar B3, y en Grados de libertad seleccionar B6.

c) Clic en Aceptar. Los demás cálculos se muestran en la siguiente figura:


	A	B	C
1	$1 - \alpha$	0,95	
2	n	13	
3	$\frac{\alpha}{2}$	0,025	$=(1-B1)/2$
4	$n - 1$	12	$=B2-1$
5	t_1	-2,1788	$=INV.T(B3;B5)$
6	t_2	2,17881	$=B6*-1$

Para resolver con Winstats se procede de la siguiente manera:


a) Clic en Window y luego en Probability seleccionar Student t




b) Clic en Student t




c) Maximizar la ventana de la distribución




d) Para cambiar el color del fondo, clic en Edit + Colors + Window background




e) Clic Window background. En la venta de background seleccionar el color deseado, que este caso se seleccionó el color blanco. Luego clic en Close para cerrar la venta background.




f) Para editar lo grados de libertad, clic en Edit + Parameter...(Parámetros). Clic en Parámetros. En la casilla de la ventana input escribir 12. Clic en ok




g) Para calcular el valor crítico de t, clic en Calc + Probabilities. En la ventana Student calculations, en significanse escribir 0,025 y luego clic en critical x. Clic en close para cerrar la ventana Student calculations.



h) Para escribir textos, clic en Btns. Luego clic derecho en cualquier parte de la ventana y aparece la ventana edit text. En la casilla de la ventana edit text escribir el texto deseado.




i) Clic en ok de la ventana edit text. Luego arrastar con el mouse el texto al lugar deseado



Empleando GeoGebra

Seleccione Distribución T Inversa[<Grados de Libertad>, <Probabilidad>]



2) Sea $X = t_{(10)}$ hallar el valor de $P(X \leq -1,3722) + P(X \geq 2,7638)$ con lectura en la tabla, Excel y Winstats

Solución:

**TABLA N° 4
DISTRIBUCIÓN t DE STUDENT**

Ejemplos:
Para $n-1 = 10$ grados de libertad
 $P(t \geq 1,812) = 0,05$
 $P(t \leq -1,812) = 0,05$

α n-1	0,25	0,2	0,15	0,1	0,05	0,025	0,01	0,005	0,0005
1	1,0000	1,3764	1,9626	3,0777	6,3138	12,7062	31,8205	63,6567	636,6192
2	0,8165	1,0607	1,3862	1,8856	2,9200	4,3027	6,9646	9,9248	31,5991
3	0,7649	0,9785	1,2498	1,6377	2,3534	3,1824	4,5407	5,8409	12,9240
4	0,7407	0,9410	1,1896	1,5332	2,1318	2,7764	3,7469	4,6041	8,6103
5	0,7267	0,9195	1,1558	1,4759	2,0150	2,5706	3,3649	4,0321	6,8688
6	0,7176	0,9057	1,1342	1,4398	1,9432	2,4469	3,1427	3,7074	5,9588
7	0,7111	0,8960	1,1192	1,4149	1,8946	2,3646	2,9980	3,4995	5,4079
8	0,7064	0,8889	1,1081	1,3968	1,8595	2,3060	2,8965	3,3554	5,0413
9	0,7027	0,8834	1,0997	1,3830	1,8331	2,2622	2,8214	3,2498	4,7809
10	0,6998	0,8791	1,0931	1,3722	1,8125	2,2281	2,7638	3,1693	4,5869
11	0,6974	0,8755	1,0877	1,3634	1,7959	2,2010	2,7181	3,1058	4,4370

Con lectura en la tabla se obtiene:

$$P(X \leq -1,3722) = 0,1 \text{ y } P(X \geq 2,7638) = 0,01$$


Entonces:

$$P(X < -1,3722) + P(X > 2,7638) = 0,1 + 0,01 = 0,11$$

Los cálculos empleando Excel se muestran en la siguiente figura:

	A	B	C	D	E
1	t_1	-1,3722			
2	t_2	2,7638			
3	$n - 1$	10			
4	$P(t_1 < -1,3722)$	0,1	=DISTR.T.N(B1;B3;VERDADERO)		
5	$P(t_2 > 2,7638)$	0,01	=DISTR.T.CD(B2;B3)		
6	$P(X < t_1) + P(X > t_2)$	0,11	=B4+B5		

El gráfico elaborado empleando Winstats y Paint se muestra en la siguiente figura:



3) Un fabricante de papel para computadora tiene un proceso de producción que opera continuamente a lo largo del turno. Se espera que el papel tenga una media de longitud de 11 pulgadas. De 500 hojas se selecciona una muestra de 29 hojas con una media de longitud del papel de 10,998 pulgadas y una desviación estándar de 0,02 pulgadas. Calcular la estimación del intervalo de confianza del 99%

Solución:

Los datos del problema son:

$$\mu = 11$$

$$N = 500$$

$$n = 29$$

$$\bar{x} = 10,998$$

$$S = 0,02$$

$$\text{Confianza} = 99\%$$

Como en los datos aparece el tamaño de la población, se debe verificar si el tamaño de la muestra es mayor que el 5% para emplear la fórmula con el factor finito de corrección. Se reemplaza valores en la siguiente fórmula:

$$\frac{n}{N} \cdot 100\% > 5\% \Rightarrow \frac{29}{500} \cdot 100\% = 5,8\%$$

Por lo tanto se debe utilizar la fórmula con el factor finito de corrección.

Calculando la proporción de la cola superior e inferior de la distribución se obtiene:

$$\text{Nivel de confianza} = (1 - \alpha) \cdot 100\%$$

$$\frac{\alpha}{2} = \frac{100\% - \text{Nivel de confianza}}{200} \Rightarrow \frac{\alpha}{2} = \frac{100\% - 99\%}{200} = 0,005$$

Calculando los grados de libertad se obtiene:

$$n - 1 = 29 - 1 = 28$$

Con lectura en la tabla para un área de 0,005 y 28 grados de libertad se obtiene $t = \pm 2,7633$

Remplazando valores y realizando los cálculos se obtiene:

$$\bar{x} - t_{n-1} \frac{S}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}} \leq \mu \leq \bar{x} + t_{n-1} \frac{S}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$$

$$10,998 - 2,7633 \frac{0,02}{\sqrt{29}} \sqrt{\frac{500-29}{500-1}} \leq \mu \leq 10,998 + 2,7633 \frac{0,02}{\sqrt{29}} \sqrt{\frac{500-29}{500-1}}$$


$$10,988 \leq \mu \leq 11,008$$

Los cálculos empleando Excel se muestran en la siguiente figura:



	A	B	C	D	E	F
1	μ	11				
2	N	500				
3	n	29				
4	\bar{X}	10,998				
5	S	0,02				
6	Confianza	99				
7	$\frac{n}{N} \cdot 100 > 5\%$	5,8	$=(B3/B2)*100$			
8						
9	α	0,01	$=(100-B6)/100$			
10	$t_{n-1} \frac{S}{\sqrt{n}}$	0,0103	$=\text{INTERVALO.CONFIANZA.T}(B9;B5;B3)$			
11						
12						
13	$\bar{x} - t_{n-1} \frac{S}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}} \leq \mu \leq \bar{x} + t_{n-1} \frac{S}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$					
14						
15		10,988	$\leq \mu \leq$	11,008		
16		$=B4-B10*\text{RAIZ}((B2-B3)/(B2-1))$		$=B4+B10*\text{RAIZ}((B2-B3)/(B2-1))$		

Interpretación: Existe un 99% de confianza de que la media poblacional se encuentra entre 10,998 y 11,008

El gráfico elaborado empleando Winstats y Paint se muestra en la siguiente figura:



El gráfico elaborado empleando GeoGebra se muestra en la siguiente figura:



TAREA DE INTERAPRENDIZAJE N° 14

- 1) ¿Cuál fue el origen del nombre de la distribución t de Student
- 2) Describa las diferencias entre la distribución t y la distribución normal
- 3) ¿En qué caso la distribución t es virtualmente idéntica a la distribución normal?
- 4) Defina con sus propias palabras el concepto de grados de libertad. Ilustre con un ejemplo
- 5) Realice un organizador gráfico (cuadro sinóptico, mapa conceptual, etc.) sobre la distribución t de Student
- 6) Determinar el valor crítico de t con lectura en la tabla, Excel y Winstats en cada una de las siguientes condiciones:
 - 6.1) $1-\alpha = 0,95$; $n = 10$ 2,2622
 - 6.2) $1-\alpha = 0,99$; $n = 10$ 3,2498
- 7) Sea $X = t_{(10)}$. Calcule el valor de las siguientes probabilidades con lectura en la tabla, Excel y Winstats
 - 7.1) $P(X \leq -1,8125) + P(X \geq 1,8125)$ 0,1
 - 7.2) $P(X \leq -1,3722) + P(X \geq 1,3722)$ 0,2
- 8) Sea $X = t_{(10)}$. Calcule el valor de las siguientes probabilidades con lectura en la tabla, Excel y GeoGebra
 - 8.1) $P(X \leq 0,6998)$ 0,75
 - 8.2) $P(-1,0931 \leq X \leq 2,7638)$ 0,84
 - 8.3) $P(-0,6998 \leq X \leq 4,5869)$ 0,75
- 9) Si $\bar{X} = 50$, $S = 15$, $n=16$, construya una estimación del intervalo de confianza del 99% de la media poblacional μ con lectura en la tabla, Excel y Winstats. $38,95 \leq \mu \leq 61,05$
- 10) Si $\bar{X} = 30$, $S = 6$, $n=15$ construya una estimación del intervalo de confianza del 99,9% de la media poblacional μ con lectura en la tabla, Excel y GeoGebra. $23,59 \leq \mu \leq 36,41$
- 11) Determine el intervalo de confianza de 95% con lectura en la tabla, Excel y Winstats para los casos siguientes:
 - 11.1) Si $\bar{X} = 15$, $S = 2$, $n=16$ y $N= 200$ $13,975 \leq \mu \leq 16,025$
 - 11.2) Si $\bar{X} = 14$, $S = 2$, $n=16$ y $N= 150$ $12,975 \leq \mu \leq 15,025$
- 12) Una empresa manufacturera produce aislantes eléctricos. Si los aislantes se rompen al usarse, muy posiblemente tendremos un corto circuito. Para probar la fuerza de los aislantes, se lleva a cabo una prueba destructiva para determinar cuánta fuerza se requiere para romperlos. Se mide la fuerza observando cuántas libras se aplican al aislante antes de que se rompa. La siguiente tabla lista 30 valores de este experimento de la fuerza en libras requerida para romper el aislante. Construya una estimación del intervalo de confianza del 95% para la población media de fuerza requerida para romper al aislante empleando Excel y Winstats.

1870	1728	1656	1610	1634	1784	1522	1696	1592	1662
1866	1764	1734	1662	1734	1774	1550	1756	1762	1866
1820	1744	1788	1688	1810	1752	1680	1810	1652	1736

$$1689,96 \leq \mu \leq 1756,84$$

13) Plantee y resuelva un problema similar al anterior empleando Excel y GeoGebra

3.3) ESTIMACIÓN DEL INTERVALO DE CONFIANZA PARA UNA PROPORCIÓN

Sirve para calcular la estimación de la proporción de elementos en una población que tiene ciertas características de interés. La proporción desconocida de la población, se representa con la letra griega π . La estimación puntual para π es la proporción de la muestra, $p = \frac{X}{n}$, donde n es el tamaño de la muestra y X es el número de elementos en la muestra que tienen la característica de interés. La siguiente ecuación define la estimación del intervalo de confianza para la proporción de la población.

$$p - Z \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \leq \pi \leq p + Z \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

Donde:

$$p = \text{proporción de la muestra} = \frac{X}{n} = \frac{\text{número de elementos con característica de interés}}{\text{tamaño de la muestra}}$$

$\pi = \text{proporción de la población}$

$Z = \text{valor crítico para la distribución normal estandarizada}$

$n = \text{tamaño de la muestra}$

Cuando la población es finita (N) y el tamaño de la muestra (n) constituye más del 5% de la población, se debe usar el factor finito de corrección. Por lo tanto, si cumple:

$$\frac{n}{N} \cdot 100\% > 5\%$$

se aplica la ecuación

$$p - Z \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}} \leq \pi \leq p + Z \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$$

Ejemplo ilustrativo

En un almacén se está haciendo una auditoria para las facturas defectuosas. De 500 facturas de venta se escoge una muestra de 30, de las cuales 5 contienen errores. Construir una estimación del intervalo de confianza del 95%.

Solución:

Los datos del problema son:

$$N = 500$$

$$n = 30$$

$$X = 5$$

$$\text{Confianza} = 95\%$$

Como en los datos aparece el tamaño de la población, se debe verificar si el tamaño de la muestra es mayor que el 5% para emplear la fórmula con el factor finito de corrección. Se reemplaza valores en la siguiente fórmula:

$$\frac{n}{N} \cdot 100\% > 5\% \Rightarrow \frac{30}{500} \cdot 100\% = 6\%$$

Por lo tanto se debe utilizar la fórmula con el factor finito de corrección.

Calculando la proporción de la cola superior e inferior de la distribución se obtiene:

$$\text{Nivel de confianza} = (1 - \alpha) \cdot 100\%$$

$$\frac{\alpha}{2} = \frac{100\% - \text{Nivel de confianza}}{200} \Rightarrow \frac{\alpha}{2} = \frac{100\% - 95\%}{200} = 0,025$$

Con lectura en la tabla de la distribución normal para un área de 0,025 se obtiene $Z = -1,96$, y por simetría $Z = 1,96$

Calculando la proporción de la muestra se obtiene:

$$p = \frac{X}{n} = \frac{5}{30} = 0,167$$

Calculando el intervalo de confianza se obtiene:

$$p - Z \sqrt{\frac{p(1-p)}{n} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}} \leq \pi \leq p + Z \sqrt{\frac{p(1-p)}{n} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}}$$


$$0,167 - 1,96 \sqrt{\frac{0,167(1-0,167)}{30} \sqrt{\frac{500-30}{500-1}}} \leq \pi \leq 0,167 + 1,96 \sqrt{\frac{0,167(1-0,167)}{30} \sqrt{\frac{500-30}{500-1}}}$$

$$0,037 \leq \pi \leq 0,296$$

Los cálculos empleando Excel se muestran en la siguiente figura:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	N	500						
2	n	30						
3	X	5						
4	Confianza	95						
5	$\frac{n}{N} \cdot 100\% > 5\%$	6						
6								
7	$\frac{\alpha}{2}$	0,025						
8								
9	Z	-1,96	=INV.NORM.ESTAND(B7)					
10	Z	1,96	=B9*-1					
11	$p = \frac{X}{n}$	0,167	=B3/B2					
12								
13		$p - Z \sqrt{\frac{p(1-p)}{n} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}} \leq \pi \leq p + Z \sqrt{\frac{p(1-p)}{n} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}}$						
14		0,037	$\leq \mu \leq$	0,296				
15								
16		=B11-B10*RAIZ(B11*(1-B11)/B2)*RAIZ((B1-B2)/(B1-1))		=B11+B10*RAIZ(B11*(1-B11)/B2)*RAIZ((B1-B2)/(B1-1))				

El gráfico elaborado empleando Winstats y Paint se muestra en la siguiente figura:



TAREA DE INTERAPRENDIZAJE N° 15

1) Si $n = 200$ y $X = 50$, construya una estimación del intervalo de confianza con lectura en la tabla, Excel y Winstats para la proporción de la población con confianza del

1.1) 95%

$$0,19 \leq \pi \leq 0,31$$

1.2) 99%

$$0,171 \leq \pi \leq 0,3$$

2) Si $n = 400$ y $X = 25$, construya una estimación del intervalo de confianza con lectura en la tabla, Excel y Winstats para la proporción de la población con confianza del

2.1) 90%

$$0,0426 \leq \pi \leq 0,0824$$

2.2) 99%

$$0,031 \leq \pi \leq 0,094$$

3) En un almacén se está haciendo una auditoria para las facturas defectuosas. Se escoge una muestra de 100 facturas de venta, 10 de ellas contienen errores.

3.1) Construir una estimación del intervalo de confianza del 95% para la proporción de la población con lectura en la tabla, Excel y Winstats

$$0,041 \leq \pi \leq 0,159$$

3.2) ¿Cómo interpreta el resultado obtenido en el inciso 3.1?

4) Plantee y resuelva un ejercicio similar al anterior con lectura en la tabla, Excel y Winstats

5) El editor de un periódico desea estimar la proporción de periódicos impresos con algún defecto, tal como borraduras en exceso, disposición errónea de las hojas, páginas faltantes o duplicadas. Se selecciona una muestra aleatoria de 200 periódicos, 35 de ellos contienen algún tipo de defecto. Realice e interprete un intervalo de confianza del 90% para la proporción de periódicos impresos que tienen defectos con lectura en la tabla, Excel y Winstats.

$$13,1\% \leq \pi \leq 21,9\%$$

6) Una empresa telefónica desea estimar la proporción de hogares en los que se contrataría una línea telefónica adicional. Se seleccionó una muestra aleatoria de 500 hogares. Los resultados indican que a un costo reducido, 135 de los hogares contratarían una línea telefónica adicional. Construya e interprete una estimación del intervalo de confianza del 99% de la proporción poblacional de hogares que contratarían una línea telefónica adicional con lectura en la tabla, Excel y Winstats.

$$21,9\% \leq \pi \leq 32,1\%$$

7) Plantee y resuelva un ejercicio similar al anterior con lectura en la tabla, Excel y GeoGebra.

8) Miles de ecuatorianos organizan sus planes de viaje al exterior por Internet. En una encuesta reciente, se reportó que el 25% compra boletos de avión en Internet. Suponga que la encuesta se basó en 180 ecuatorianos que respondieron.

8.1) Construya una estimación del intervalo de confianza del 95% para la proporción poblacional de ecuatorianos que compran boletos de avión en Internet con lectura en la tabla, Excel y Winstats.

$$18,7\% \leq \pi \leq 31,3\%$$

8.2) Construya una estimación del intervalo de confianza del 90% para la proporción poblacional de ecuatorianos que compran boletos de avión en Internet con lectura en la tabla, Excel y Winstats.

$$19,7\% \leq \pi \leq 30,3\%$$

8.3) ¿Cuál intervalo es más amplio?. Explique por qué esto es cierto

9) Se hace una encuesta entre mujeres trabajadoras en Ecuador. De 1000 mujeres encuestadas, el 55% piensa que las empresas deben reservar los puestos de trabajo durante seis meses o menos para aquellas con permiso de maternidad, y el 45% considera que deberían reservar sus puestos durante más de seis meses.

9.1) Con lectura en la tabla, Excel y Winstats construya un intervalo de confianza del 95% para la proporción de las mujeres trabajadoras de Ecuador quienes creen que las empresas deberían reservar los puestos de trabajo durante seis meses o menos para aquellas con permiso de maternidad.

$$51,9\% \leq \pi \leq 58,1\%$$

9.2) Con lectura en la tabla, Excel y Winstats construya un intervalo de confianza del 95% para la proporción de las mujeres trabajadoras de Ecuador quienes creen que las empresas deberían reservar los puestos de trabajo durante más de seis meses para aquellas con permiso de maternidad.

$$41,9\% \leq \pi \leq 48,1\%$$

9.3) ¿Cuál intervalo es más amplio?. Explique por qué sucede

10) Plantee y resuelva un problema similar al anterior con lectura en la tabla, Excel y GeoGebra

3.4) DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA

En cada ejemplo de la estimación del intervalo de confianza, usted seleccionó un tamaño de muestra sin considerar la amplitud del intervalo de confianza. En el mundo de los negocios, determinar el tamaño adecuado de la muestra es un procedimiento complicado, ya que está sujeto a las restricciones de presupuesto, tiempo y cantidad aceptada de error de muestreo. Si por ejemplo usted desea estimar la media de la cantidad de ventas en dólares de la facturas de ventas o la proporción de facturas de ventas que contienen errores, debe determinar por anticipado cuán grande sería el error de muestreo para estimar cada uno de los parámetros. También debe determinar por anticipado el nivel del intervalo de confianza a usar al estimar el parámetro poblacional.

Recordemos los siguientes conceptos básicos

Población.- Llamado también universo o colectivo, es el conjunto de todos los elementos que tienen una característica común. Una población puede ser finita o infinita. Es *población finita* cuando está delimitada y conocemos el número que la integran, así por ejemplo: Estudiantes de la Universidad UTN. Es *población infinita* cuando a pesar de estar delimitada en el espacio, no se conoce el número de elementos que la integran, así por ejemplo: Todos los profesionales universitarios que están ejerciendo su carrera.

Muestra.- La muestra es un subconjunto de la población. Ejemplo: Estudiantes de 2do Semestre de la Universidad UTN.

Sus principales características son:

Representativa.- Se refiere a que todos y cada uno de los elementos de la población tengan la misma oportunidad de ser tomados en cuenta para formar dicha muestra.

Adecuada y válida.- Se refiere a que la muestra debe ser obtenida de tal manera que permita establecer un mínimo de error posible respecto de la población.

Para que una muestra sea fiable, es necesario que su tamaño sea obtenido mediante procesos matemáticos que eliminen la incidencia del error.

Elemento o individuo.- Unidad mínima que compone una población. El elemento puede ser una entidad simple (una persona) o una entidad compleja (una familia), y se denomina unidad investigativa.

A) DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA LA MEDIA

Para desarrollar una fórmula que permita determinar el tamaño apropiado de la muestra para construir una estimación del intervalo de confianza para la media, recuerde la ecuación

$$\bar{X} - Z \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + Z \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

La cantidad sumada o sustraída de \bar{X} es igual a la mitad de la amplitud del intervalo. Esta cantidad representa la cantidad de imprecisión en la estimación que resulta del error de muestreo. El error de muestreo e (también conocido como margen de error) se define como:

$$e = Z \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Al despejar n se obtiene el tamaño de muestra necesario para construir una estimación del intervalo de confianza adecuado para la media. “Adecuado” significa que el intervalo resultante tendrá una cantidad aceptable de error de muestreo.

El proceso de despejar n se muestra a continuación:

Elevando al cuadrado ambos miembros de la igualdad:

$$(e)^2 = \left(Z \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)^2$$

Resolviendo la potencia:

$$e^2 = Z^2 \frac{\sigma^2}{n}$$

Transponiendo n a la izquierda de la igualdad:

$$e^2 n = Z^2 \sigma^2$$

Transponiendo e^2 a la derecha de la igualdad y ordenando se obtiene la fórmula buscada:

$$n = \frac{\sigma^2 Z^2}{e^2}$$

Donde:

σ = Desviación estándar de la población que rara vez conoce su valor. En algunas ocasiones es posible estimar la desviación estándar a partir de datos pasados. En otras situaciones, puede hacer una cuidadosa conjetura tomando en cuenta el rango y la distribución de la variable. Por ejemplo, si supone que hay una distribución normal, el rango es aproximadamente igual a 6σ (es decir, $\pm 3\sigma$ alrededor de la media). Generalmente cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5.

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador.

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio del encuestador, sin embargo, se aconseja emplear el 5% o el 1%, por ser valores que guardan relación con el 95% y 99% de confianza, respectivamente.

Cuando en los datos se tiene el tamaño de la población se utiliza la siguiente fórmula:

$$n = \frac{N\sigma^2 Z^2}{(N-1)e^2 + \sigma^2 Z^2}$$

La fórmula anterior se obtiene de la fórmula de la estimación del intervalo de confianza para la media, la cual es:

$$\bar{X} - Z \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}} \leq \mu \leq \bar{X} + Z \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$$

De donde el error es:

$$e = Z \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$$

De esta fórmula del error de la estimación del intervalo de confianza para la media se despeja la n , para lo cual se sigue el siguiente proceso:

Elevando al cuadrado a ambos miembros de la fórmula se obtiene:

$$(e)^2 = \left(Z \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}} \right)^2 \Rightarrow e^2 = Z^2 \frac{\sigma^2 N - n}{n N - 1}$$

Multiplicando fracciones y eliminando denominadores:

$$e^2 = \frac{Z^2 \sigma^2 (N - n)}{n(N - 1)} \Rightarrow e^2 n(N - 1) = Z^2 \sigma^2 (N - n)$$

Eliminando paréntesis y transponiendo n a la izquierda:

$$e^2 n N - e^2 n = Z^2 \sigma^2 N - Z^2 \sigma^2 n \Rightarrow e^2 n N - e^2 n + Z^2 \sigma^2 n = Z^2 \sigma^2 N$$

Factor común de n y Despejando n :

$$n(e^2 N - e^2 + Z^2 \sigma^2) = Z^2 \sigma^2 N \Rightarrow n = \frac{Z^2 \sigma^2 N}{e^2 N - e^2 + Z^2 \sigma^2}$$

Sacando factor común e^2 y ordenando se obtiene la fórmula para calcular el tamaño de la muestra para la media cuando se conoce el tamaño de la población:

$$n = \frac{N \sigma^2 Z^2}{(N - 1) e^2 + \sigma^2 Z^2}$$

B) DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA LA PROPORCIÓN

Dado el intervalo de confianza

$$p - Z \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \leq \pi \leq p + Z \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

El error de muestreo e se define como:

$$e = Z \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

Al despejar n se obtiene la ecuación para calcular el tamaño de la muestra conocida la proporción.

$$n = \frac{p(1-p)Z^2}{e^2}$$

Al determinar p se tiene dos alternativas. En muchas situaciones se cuenta con información anterior o experiencias relevantes que proporcionan una estimación cuidadosa de p . O también, si no se cuenta con información anterior o experiencias relevantes, se trata de proporcionar un valor para p que nunca subestime el tamaño de muestra necesario. Con referencia a la ecuación anterior, observe que la cantidad $p(1-p)$ aparece en el numerador. Por eso, se requiere determinar el valor de p que haga la cantidad $p(1-p)$ lo más grande posible. Cuando $p = 0,5$, el producto $p(1-p)$ logra su resultado máximo. Para mostrar esto, los valores de p junto con los productos que los acompañan de $p(1-p)$ son como sigue:

Cuando $p = 0,9 \Rightarrow p(1-p) = 0,9(1-0,9) = 0,09$

Cuando $p = 0,7 \Rightarrow p(1-p) = 0,7(1-0,7) = 0,21$

Cuando $p = 0,5 \Rightarrow p(1-p) = 0,5(1-0,5) = 0,25$

Cuando $p = 0,3 \Rightarrow p(1 - p) = 0,3(1 - 0,3) = 0,21$

Cuando $p = 0,1 \Rightarrow p(1 - p) = 0,1(1 - 0,1) = 0,09$

Por lo tanto, cuando no se tiene conocimiento previo o una estimación de la proporción muestral p , se debería emplear $p = 0,5$ para determinar el tamaño de la muestra. Esto produce el tamaño de muestra más grande posible y deriva en el mayor costo posible del muestreo.

La expresión que permite calcular el tamaño de la muestra para la proporción cuando se conoce el tamaño de la población es:

$$n = \frac{Np(1 - p)Z^2}{(N - 1)e^2 + p(1 - p)Z^2}$$

Ejemplo ilustrativo

Calcule el tamaño de la muestra de una población de 500 elementos con un nivel de confianza del 95% y $\sigma = 0,5$ y un error de muestreo del 5%.

Solución:

Remplazando valores de la fórmula se tiene:

$$n = \frac{N\sigma^2Z^2}{(N - 1)e^2 + \sigma^2Z^2} \Rightarrow n = \frac{500 \cdot 0,5^2 \cdot 1,96^2}{(500 - 1)0,05^2 + 0,5^2 \cdot 1,96^2} = 217$$

Los cálculos empleando Excel se muestran en la siguiente figura:

	A	B	C	D	E	F
1	N	500				
2	e	0,05	5 %			
3	σ	0,5				
4	Confianza	95				
5	Área a la izquierda de -Z	0,025	= $(100-B4)/200$			
6	-Z	-1,96	= $INV.NORM.ESTAND(B5)$			
7	Z	1,96	= $B6*-1$			
8	$\frac{N\sigma^2Z^2}{(N - 1)e^2 + \sigma^2Z^2}$	217,49	= $B1*B3^2*B7^2/((B1-1)*B2^2+B3^2*B7^2)$			
9		217	= $REDONDEAR(B8;0)$			

TAREA DE INTERAPRENDIZAJE N° 16

- 1) Realice un organizador gráfico sobre el tamaño de la muestra
- 2) Proponga 3 ejemplos de población, de muestra y de elemento.
- 3) Escriba
 - 3.1) ¿Qué significa “adecuado” para una estimación del intervalo de confianza que permite calcular el tamaño de la muestra?
 - 3.2) ¿A partir de qué ecuación se obtiene el error de muestreo para la media cuando se conoce el tamaño de la población?
 - 3.3) ¿Con qué otro nombre se le conoce al error de muestreo?

3.4) ¿Por qué se emplea la distribución Z en lugar de la distribución t para determinar el nivel de confianza deseado del tamaño de la muestra?

3.5) ¿Qué valores suelen utilizarse para Z y e cuando no se conocen sus valores?

3.6) ¿Por qué cuando no se tiene conocimiento previo o una estimación de la proporción poblacional π se debe emplear $p = 0,5$?

4) Calcule el valor de σ si se sabe $p = 0,5$

0,5

5) Escriba el proceso para obtener la siguiente expresión

$$n = \frac{p(1-p)Z^2}{e^2}$$

6) Escriba el proceso para obtener la siguiente expresión

$$n = \frac{Np(1-p)Z^2}{(N-1)e^2 + p(1-p)Z^2}$$

7) Con lectura en la tabla, Excel y Winstats calcule el tamaño de la muestra con un error de muestreo del 5% para $N=500$, si se desea tener un nivel de confianza en la estimación del:

7.1) 95%

218

7.2) 99 %

285

8) Una Parroquia de una determinada ciudad está compuesta de 3 barrios, el barrio A de 3500 habitantes, el barrio B de 2500 habitantes y el barrio C de 1000 habitantes. Se va a realizar un estudio de mercado. Realice los cálculos en forma manual, empleando Excel y Winstats.

8.1) ¿Cuántas encuestas se debe aplicar si se emplea el cálculo del tamaño de la muestra al 95% de confianza con un error de muestreo del 5%?

364

8.2) ¿Cuántas encuestas se deben aplicar en cada barrio?

A=182; B=130; C=52

9) Cree y resuelva empleando Excel y Winstats un ejercicio similar al anterior.

10) Una muestra de 280 fue calculada de una población con un nivel de confianza del 95% y un error de muestreo del 5%. Calcule el tamaño de la población.

1030

11) Una muestra de 286 fue calculada de una población de 500 con un error de muestreo del 5%. Calcule el nivel de confianza empleado para calcular la mencionada muestra.

99%

12) Consulte en la biblioteca o en el internet sobre los tipos de muestreo y presente la consulta a través de un organizador gráfico.

CAPÍTULO IV

PRUEBA DE HIPÓTESIS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL CAPÍTULO

Al finalizar el presente capítulo el lector podrá evidenciar que:

- ✓ Interpreta las definiciones, características, propiedades y aplicaciones de las hipótesis para toma de decisiones.
- ✓ Aplica algoritmos para comprobar hipótesis según sus distintas opciones de manera manual, empleando Excel, Winstats y GeoGebra.
- ✓ Plantea y resuelve ejercicios y problemas de aplicación sobre prueba de hipótesis de manera manual, utilizando Excel, Winstats y GeoGebra.

CONTENIDOS

- ✓ Prueba de hipótesis para medias: De una y dos muestras
- ✓ Análisis de varianza: Estimación interna, intermediente y la razón F de Fisher
- ✓ Prueba de hipótesis para proporciones: De una, dos, k muestras (χ^2) y bondad de Ajuste χ^2

4.1) PRUEBAS DE HIPÓTESIS PARA MEDIAS

En vez de estimar el valor de un parámetro, a veces se debe decidir si una afirmación relativa a un parámetro es verdadera o falsa. Es decir, *probar una hipótesis* relativa a un parámetro. Se realiza una prueba de hipótesis cuando se desea probar una afirmación realizada acerca de un parámetro o parámetros de una población.

Una *hipótesis* es un enunciado acerca del valor de un parámetro (media, proporción, etc.).


Prueba de Hipótesis es un procedimiento basado en evidencia muestral (estadístico) y en la teoría de probabilidad (distribución muestral del estadístico) para determinar si una hipótesis es razonable y no debe rechazarse, o si es irrazonable y debe ser rechazada.

La hipótesis de que el parámetro de la población es igual a un valor determinado se conoce como *hipótesis nula*. Una hipótesis nula es siempre una de status quo o de no diferencia. Se simboliza con el símbolo H_0 . Y cuando se desarrolla la prueba se asume que la hipótesis nula es verdadera y este supuesto será rechazado solo si se encuentran suficientes evidencias en base a la información muestral.


Siempre que se especifica una hipótesis nula, también se debe especificar una *hipótesis alternativa*, o una que debe ser verdadera si se encuentra que la hipótesis nula es falsa. La hipótesis alternativa se simboliza H_1 . La hipótesis alternativa representa la conclusión a la que se llegaría si hubiera suficiente evidencia de la información de la muestra para decidir que es improbable que la hipótesis nula sea verdadera, y por tanto rechazarla. Es siempre opuesta a la Hipótesis Nula.

En toda prueba de hipótesis se presentan 3 casos de *zonas críticas* o llamadas también *zonas de rechazo de la hipótesis nula*, estos casos son los siguientes:


1) Prueba Bilateral o a dos colas: $H_0: \mu = X; H_1 \neq X$



2) Prueba Unilateral con cola hacia la derecha: $H_0: \mu \leq X; H_1 > X$



3) Prueba Unilateral con cola hacia la izquierda: $H_0: \mu \geq X; H_1 < X$



En toda prueba de hipótesis se pueden cometer 2 tipos de errores:

- 1) Error tipo I: se comete error tipo I, cuando se rechaza la H_0 , siendo esta realmente verdadera. A la probabilidad de cometer error tipo I, se le conoce como nivel de significación y se le denota como α
- 2) Error tipo II: se comete error tipo II, cuando no se rechaza la H_0 , siendo esta realmente falsa. A la probabilidad de cometer error tipo II, se le denota como β

El complemento de la probabilidad de cometer error tipo II, se le llama potencia de la prueba y se denota como $1 - \beta$

Como resumen se da la siguiente tabla:

	Se Acepta H_0	Se Rechaza H_0
H_0 es Verdadera	Decisión Correcta	Error de Tipo I
H_0 es Falsa	Error de Tipo II	Decisión Correcta

TAREA DE INTERAPRENDIZAJE N° 17

Conteste

- 1) ¿Qué es probar una hipótesis relativa a un parámetro?
- 2) ¿Cuándo se realiza una prueba de hipótesis?
- 3) ¿Qué es una hipótesis?
- 4) ¿Qué es prueba de hipótesis?
- 5) ¿Qué es hipótesis nula?
- 6) ¿Qué es hipótesis alternativa o alterna?
- 7) ¿Cuáles son los casos de zonas de rechazo de la hipótesis nula?
- 8) ¿Cuáles son los tipos de errores que se pueden cometer en toda prueba de hipótesis?
- 9) Consulte en la biblioteca o en el internet sobre la importancia de la prueba de hipótesis. Presente la consulta mediante un organizador gráfico.
- 10) Consulte en la biblioteca o en el internet un ejercicio resuelto sobre prueba de hipótesis de medias de una muestra. Presente el ejercicio resuelto empleando Excel.

A) PRUEBA MEDIAS DE UNA MUESTRA

Se utiliza una prueba de una muestra para probar una afirmación con respecto a una media de una población única.

Si se conoce la desviación estándar de la población (σ), la distribución de muestreo adecuada es la distribución normal. Si la población que se muestra es normal, la distribución de muestreo será normal en el caso de todos los tamaños de la muestra, y el valor estadístico de prueba a utilizar es:

$$Z_{prueba} = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

Si la población no es normal, o si se desconoce su forma, se emplea la ecuación anterior solamente para tamaños de muestra iguales o mayores 30, es decir, para $n \geq 30$

Si no se conoce la desviación estándar de la población (σ), el valor estadístico de prueba es:

$$t_{prueba} = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}}$$

Nota: Se considera práctico utilizar la distribución t solamente cuando se requiera que el tamaño de la muestra sea menor de 30, ya que para muestras más grandes los valores t y z son aproximadamente iguales, y es posible emplear la distribución normal en lugar de la distribución t.

Las anteriores ecuaciones se aplican para poblaciones infinitas, pero cuando la población es finita y el tamaño de la muestra n constituye más del 5% del tamaño de la población N , es decir:

$$\frac{n}{N} \cdot 100\% > 5\%$$

En este caso se debe usar el factor finito de corrección para modificar las desviaciones estándar, por lo tanto se aplican las siguientes ecuaciones para (σ) conocida y desconocida, respectivamente.

$$Z_{prueba} = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \cdot \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}}$$

$$t_{prueba} = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}} \cdot \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}}$$

Ejemplos ilustrativos:

1) La duración media de una muestra de 300 focos producidos por una compañía resulta ser de 1620 horas. Se conoce que desviación típica de la población es 150 horas. Comprobar la hipótesis $\mu = 1600$ contra la hipótesis alternativa $\mu \neq 1600$ horas con un nivel de significación de 0,05 si la muestra fue tomada de 5000 focos.

Solución:

Los datos son:

$$n = 300; \bar{x} = 1620; \sigma = 150; \alpha = 0,05; N = 5000$$

Las hipótesis son:

$$H_0: \mu = 1600; H_1: \mu \neq 1600$$

Al observar $H_1: \mu \neq 1600$ se trata de una prueba a dos colas, por lo que se tiene que calcular:

$$\frac{\alpha}{2} = \frac{0,05}{2} = 0,025$$

Como se conoce la desviación estándar de la población σ se debe utilizar la distribución normal. Con lectura en la tabla para un área de 0,025 le corresponde un valor $Z_{tabla} = \pm 1,96$. Se toma en cuenta el valor positivo y el negativo porque se trata de una prueba de hipótesis a dos colas.

Como se tiene como dato el tamaño de la población se tiene que verificar si cumple con la condición para utilizar el factor finito de corrección.

$$\frac{n}{N} \cdot 100\% > 5\% \Rightarrow \frac{300}{5000} \cdot 100\% = 6\%$$


Entonces para calcular el valor de Z_{prueba} se emplea la siguiente ecuación:

$$Z_{prueba} = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \cdot \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}} \Rightarrow Z_{prueba} = \frac{1620 - 1600}{\frac{150}{\sqrt{300}} \cdot \sqrt{\frac{5000 - 300}{5000 - 1}}} = 2,24$$

Los cálculos empleando Excel se muestran en la siguiente imagen:

	A	B	C	D	E	F
1	N	5000				
2	n	300				
3	\bar{x}	1620				
4	σ	150				
5	μ	1600				
6	$H_0: \mu = 1600$					
7	$H_1: \mu \neq 1600$					
8	α	0,05				
9	$\frac{\alpha}{2}$	0,025	=B8/2			
10	$\frac{n}{N} \cdot 100\% > 5\%$					
11	$\frac{n}{N} \cdot 100\% > 5\%$	6,00	=(B2/B1)*100			
12						
13	Z_{tabla}	-1,96	=INV.NORM.ESTAND(B9)			
14		1,96	=B13*-1			
15	$Z_{prueba} = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \cdot \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}}$	2,24	=(B3-B5)/(B4/RAIZ(B2))*RAIZ((B1-B2)/(B1-1))			
16						
17						

El gráfico elaborado con Winstats y Paint se muestra en la siguiente imagen:



Decisión: Dado que $Z_{prueba} 2,24 > Z_{tabla} \pm 1,96$ no se acepta la H_0 , y por lo tanto se acepta H_1

2) La duración media de lámparas producidas por una compañía han sido en el pasado de 1120 horas. Una muestra de 8 lámparas de la producción actual dio una duración media de 1070 horas con una desviación típica de 125 horas. Comprobar la hipótesis $\mu = 1120$ horas contra la hipótesis alternativa $\mu < 1120$ horas mediante un error tipo I de 0,05.

Solución:

Los datos son:

$$\mu = 1120; n = 8; \bar{x} = 1070; S = 125; \alpha = 0,05$$

Las hipótesis son:

$$H_0: \mu = 1120; H_1: \mu < 1120$$

Como se conoce la desviación estándar de la muestra S se debe utilizar la distribución t de Student. Con lectura en la tabla para un área de 0,05 y con $n - 1 = 8 - 1 = 7$ grados de libertad le corresponde un valor $t_{tabla} = -1,8946$. Se toma en cuenta el valor negativo porque se trata de una prueba de hipótesis a cola izquierda como se puede observar en la H_1 .

Entonces para calcular el valor de t_{prueba} se emplea la siguiente ecuación:

$$t_{prueba} = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}}$$


$$t_{prueba} = \frac{1070 - 1120}{\frac{125}{\sqrt{8}}} = -1,131$$

Los cálculos empleando Excel se muestran en la siguiente imagen:


	A	B	C	D
1	n	8		
2	\bar{x}	1070		
3	S	125		
4	μ	1120		
5	$H_0: \mu = 1120$			
6	$H_1: \mu < 1120$			
7	α	0,05		
8	$n-1$	7	=B1-1	
9	t_{tabla}	-1,895	=INV.T(B7;B8)	
10	$t_{prueba} = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}}$	-1,131	=(B2-B4)/(B3/RAIZ(B1))	
11				
12				

Los cálculos empleando GeoGebra se realizan se la siguiente forma:


a) Ingrese a GeoGebra




b) Clic en Vista



c) Clic en Cálculos de probabilidad. Aparece la ventana de Cálculos de probabilidad



d) Maximece la venta de Cálculos de probabilidad




e) Clic en Estadísticas


The screenshot shows the "Estadísticas" tab of the "Cálculos de probabilidad" software. The "Test Z de una media" section is active. It includes input fields for the null hypothesis ($\mu = ?$), alternative hypothesis (with radio buttons for $<$, $>$, and \neq), and sample characteristics (Media, σ , and N). The "Resultado" section displays a table of calculated values:

Test Z de una media	
Media	?
σ	?
ES	?
N	?
Z	?
P	?

f) Clic en la pestaña de Test



g) En la pestaña de Test, clic en Test T de una Media



h) En el espacio para Hipótesis Nula escribir 1120. En Hipótesis Alternativa, clic en $<$, porque en este caso se está realizando una prueba de hipótesis a cola izquierda. En el espacio para Media, escriba 1070. En el espacio para la desviación estándar “s”, escriba 125. En el espacio para N, escriba 8. Enter

Distribución Estadísticas

Test T de una media

Hipótesis nula $\mu =$ 1120

Hipótesis alternativa $<$ $>$ \neq

Muestra

Media 1070

s 125


N 8

Resultado

Test T de una media

Media	1070
s	125
ES	44.1942
N	8
glib	7
t	-1.1314
P	0.1476

El gráfico elaborado con Winstats y Paint se muestra en la siguiente imagen:



Decisión: Dado que $t_{prueba} = -1,131 > t_{tabla} = -1,8946$ se Acepta la H_0

TAREA DE INTERAPRENDIZAJE N° 18

1) Contestar

1.1) ¿En qué caso se emplea la distribución normal para la pruebas de significación de medias?

1.2) ¿En qué caso se emplea la distribución t para la pruebas de significación de medias?

1.3) ¿En qué caso se emplea el factor finito de corrección para modificar las desviaciones estándar?

Los siguientes problemas resolver con lectura en la tabla, Excel y GeoGebra (para los cálculos) y el programa Winstats (para las gráficas)

2) La duración media de una muestra de 200 tubos fluorescentes producidos por una compañía resulta ser de 1620 horas. Se sabe que la desviación típica de la población es de 100 horas. Comprobar la hipótesis $\mu = 1600$ contra la hipótesis alternativa $\mu \neq 1600$ horas con un nivel de significación de 0,05.

Dado que $Z_{prueba} 2,83 > Z_{tabla} \pm 1,96$ no se acepta la H_0

3) La duración media de las bombillas producidas por una compañía han sido en el pasado de 1000 horas. Una muestra de 28 bombillas de la producción actual dio una duración media de 1050 horas con una desviación típica de 120 horas. Comprobar la hipótesis $\mu = 1000$ horas contra la hipótesis alternativa $\mu < 1000$ horas mediante un nivel de significancia de 0,05.

Dado que $t_{prueba} 2,205 > t_{tabla} - 1,703$ se acepta la H_0

4) Plantear y resolver un problema de prueba de hipótesis conociendo la desviación estándar de la población.

5) Plantear y resolver un problema de prueba de hipótesis conociendo la desviación estándar de la muestra y el tamaño de la población.

B) PRUEBA MEDIAS DE DOS MUESTRAS

Las pruebas de dos muestras se utilizan para decidir si las medias de dos poblaciones son iguales. Se requieren dos muestras independientes, una de cada una de las dos poblaciones. Considérese, por ejemplo, una compañía investigadora que experimentan con dos diferentes mezclas de pintura, para ver si se puede modificar el tiempo de secado de una pintura para uso doméstico. Cada mezcla es probada un determinado número de veces, y comparados posteriormente los tiempos medios de secado de las dos muestras. Una parece ser superior, ya que su tiempo medio de secado (muestra) es 30 minutos menor que el de la otra muestra. Pero, ¿son realmente diferentes los tiempos medios de secado de las dos pinturas, o esta diferencia muestral es nada más la variación aleatoria que se espera, aun cuando las dos fórmulas presentan idénticos tiempos medios de secado? Una vez más, las diferencias casuales se deben distinguir de las diferencias reales.

Con frecuencia se utilizan pruebas de dos muestras para comparar dos métodos de enseñanza, dos marcas, dos ciudades, dos distritos escolares y otras cosas semejantes.

La hipótesis nula puede establecer que las dos poblaciones tienen medias iguales:

$$H_0: \mu_1 = \mu_2$$

Las alternativas pueden ser alguna de las siguientes:

$$H_1: \mu_1 \neq \mu_2 \quad H_1: \mu_1 > \mu_2 \quad H_1: \mu_1 < \mu_2$$

Cuando se conocen las desviaciones estándar de la población σ_1 y σ_2 , el valor estadístico de prueba es el siguiente:

$$Z_{prueba} = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

Cabe suponer que el valor real de Z, cuando H_0 es verdadera, está distribuido normalmente con una media de 0 y una desviación estándar de 1 (es decir, la distribución normal estandarizada) para casos en los que la suma $n_1 + n_2$ es igual o mayor de 30. Para tamaños más pequeños de muestra, Z estará distribuida normalmente sólo si las dos poblaciones que se muestrean también lo están.

Cuando no se conocen las desviaciones estándar de la población, y $n_1 + n_2$ es menor a 30, el valor estadístico de prueba es como el que se presenta a continuación.

$$t_{prueba} = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$$

Cuando los tamaños de las dos muestras no son iguales, y su suma es menor de 30, la fórmula para el valor estadístico de prueba se convierte en:

$$t_{prueba} = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\left[\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2} \right] \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$$

El valor de t cuando H_0 es verdadera, tiene una distribución t con $n_1 + n_2 - 2$ *grados de libertad*, sí se puede suponer que ambas poblaciones son aproximadamente normales.

Ejemplo ilustrativo

La media de las calificaciones de dos muestras de 15 estudiantes de primer semestre en la asignatura de Estadística de la universidad UTN resulta ser de 7 y 8,5. Se sabe que la desviación típica de las calificaciones en esta asignatura fue en el pasado de 1,5. Comprobar la hipótesis $\mu_1 = \mu_2$ contra la hipótesis alternativa $\mu_1 < \mu_2$ con un nivel de significación de 0,025.

Solución:

Los datos son:

$$n_1 = n_2 = 15$$

$$\bar{x}_1 = 7$$

$$\bar{x}_2 = 8,5$$

$$\sigma_1 = \sigma_2 = 1,5$$

$$\alpha = 0,025$$

Las hipótesis son:

$$H_0: \mu_1 = \mu_2$$

$$H_1: \mu_1 < \mu_2$$

Como se conoce la desviación estándar de la población σ se debe utilizar la distribución normal. Con lectura en la tabla para un área de 0,025 le corresponde un valor $Z_{tabla} = -1,96$. Se toma en cuenta el valor negativo porque se trata de una prueba de hipótesis a cola izquierda.

Se reemplaza valores en la siguiente fórmula porque se conoce la desviación estándar de la población σ y el tamaño de las muestras son iguales y $n_1 + n_2$ es igual o mayor de 30:

$$Z_{prueba} = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \Rightarrow Z_{prueba} = \frac{7 - 8,5}{\sqrt{\frac{1,5^2}{15} + \frac{1,5^2}{15}}} = -2,74$$

Los cálculos empleando Excel se muestran en la siguiente figura:


	A	B	C	D	E
1	n_1	15			
2	n_2	15			
3	\bar{x}_1	7			
4	\bar{x}_2	8,5			
5	σ_1	1,5			
6	σ_2	1,5			
7	α	0,025			
8	$H_0: \mu_1 = \mu_2$				
9	$H_1: \mu_1 < \mu_2$				
10	Z_{tabla}	-1,96	=INV.NORM.ESTAND(B7)		
11	$Z_{prueba} = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$	-2,74	=(B3-B4)/RAIZ(B5^2/B1+B6^2/B2)		
12					
13					
14					

Los cálculos empleando GeoGebra se muestran en la siguiente figura:

Cálculos de Probabilidad
 Distribución Estadísticas
 Prueba Z, Diferencia de Medios
 Hipótesis Nula $\mu_1 - \mu_2 = 0$
 Hipótesis Alternativa < > ≠
 Muestra 1: Media 7, σ 1.5, N 15
 Muestra 2: Media 8.5, σ 1.5, N 15
 Resultado:
 Prueba Z, Diferencia de Medios

	Muestra 1	Muestra 2
Media	7	8.5
σ	1.5	1.5
N	15	15
ES	0.5477	
Z	-2.7386	
P	0.0031	

El gráfico elaborado con Winstats y Paint se muestra en la siguiente imagen:



Decisión: No se acepta H_0 , ya que $Z_{prueba} < Z_{tabla}$

TAREA DE INTERAPRENDIZAJE N° 19

1) Responder

1.1) ¿Para qué se utilizan las pruebas de dos muestras?

1.2) ¿Qué son muestras independientes?. Explique con un ejemplo

1.3) ¿En qué se concentra la prueba de hipótesis de dos muestras?

1.4) ¿En qué caso se emplea la prueba z ?, y ¿Qué elementos están presentes en la fórmula de la prueba z ?.

1.5) ¿Qué cabe suponer para el valor real de z cuando H_0 es verdadera?

1.6) ¿En qué caso se emplea la prueba t ?, y ¿Qué elementos están presentes en la fórmula de la prueba t ?.

1.7) ¿En qué caso el valor de t , suponiendo que H_0 es verdadera se puede aproximar mediante z ?

1.8) ¿Qué fórmula para el valor estadístico de prueba de hipótesis se emplearía cuando los tamaños de las dos muestras no son iguales, y su suma es mayor de 30?.

Realizar la prueba de hipótesis con lectura en la tabla, Excel y GeoGebra (para los cálculos) y el programa Winstats (para las gráficas)

2) $H_0: \mu_1 = \mu_2$, $H_1: \mu_1 > \mu_2$, $\alpha = 0,05$, $\bar{x}_1 = 20$, $\bar{x}_2 = 18$, $\sigma_1 = \sigma_2 = 3$, $n_1 = n_2 = 36$

No se acepta H_0 , ya que $z_{prueba} = 2,83 > z_{tabla} = 1,65$

3) $H_0: \mu_1 = \mu_2$, $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$, $\alpha = 0,05$, $\bar{x}_1 = 5,4$, $\bar{x}_2 = 5$, $S_1 = 1,1$, $S_2 = 1,2$, $n_1 = n_2 = 14$

Se aprueba H_0 , ya que $t_{prueba} = 0,92$ se encuentra dentro del intervalo de aceptación

4) La media de las edades de dos muestras de 36 estudiantes de primer semestre de una universidad resulta ser de 20 años y 18 años. Se sabe que la desviación típica de todos los estudiantes fue en el pasado de 3 años. Comprobar la hipótesis $\mu_1 = \mu_2$ contra la hipótesis alternativa $\mu_1 > \mu_2$ con un nivel de significación de 0,05

No se acepta H_0 , ya que $z_{prueba}=2,83 > z_{tabla}=1,65$

5) La duración media de dos muestras de 10 y 14 pantalones producidos por dos empresas resulta ser de 5,4 años y 5 años, con una desviación típica de 1,1 años y 1,2 años, respectivamente. Comprobar la hipótesis $\mu_1 = \mu_2$ contra la hipótesis alternativa $\mu_1 \neq \mu_2$ con un nivel de significación de 0,05

Se acepta H_0 , ya que $t_{prueba}=0,83$ se encuentra dentro del intervalo de aceptación $t_{tabla}=\pm 2,0739$

6) Seleccione dos cursos de diferente paralelo de su institución educativa. Seleccione dos muestras iguales y menores a 30 de cada curso. Investigue las calificaciones de cada curso en la asignatura que usted crea conveniente y que imparta clases el mismo maestro. Con esas calificaciones calcule la media y la desviación típica de cada muestra. Comprobar la hipótesis $\mu_1 = \mu_2$ contra la hipótesis alternativa $\mu_1 \neq \mu_2$ con un nivel de significación de 0,05.

7) Plantee y resuelva un problema de prueba de hipótesis similar al anterior de cualquier tema de su preferencia.

4.2) ANÁLISIS DE VARIANZA

El análisis de varianza es una técnica que se puede utilizar para decidir si las medias de dos o más poblaciones son iguales. La prueba se basa en una muestra única, obtenida a partir de cada población. El análisis de varianza puede servir para determinar si las diferencias entre las medias muestrales revelan las verdaderas diferencias entre los valores medios de cada una de las poblaciones, o si las diferencias entre los valores medios de la muestra son más indicativas de una variabilidad de muestreo.

Si el valor estadístico de prueba (análisis de varianza) nos impulsa a aceptar la hipótesis nula, se concluiría que las diferencias observadas entre las medias de las muestras se deben a la variación casual en el muestreo (y por tanto, que los valores medios de población son iguales). Si se rechaza la hipótesis nula, se concluiría que las diferencias entre los valores medios de la muestra son demasiado grandes como para deberse únicamente a la casualidad (y por ello, no todas las medias de población son iguales).

Los datos para el análisis de varianza se obtienen tomando una muestra de cada población y calculando la media muestral y la variancia en el caso de cada muestra.

Existen tres supuestos básicos que se deben satisfacer antes de que se pueda utilizar el análisis de variancia.

- 1) Las muestras deben ser de tipo aleatorio independiente.
- 2) Las muestras deben ser obtenidas a partir de poblaciones normales.
- 3) Las poblaciones deben tener variancias iguales (es decir, $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \dots = \sigma_k^2$)

El análisis de varianza, como su nombre lo indica, comprende el cálculo de varianzas. La varianza de una muestra es el promedio de las desviaciones elevadas al cuadrado de la media del grupo. Simbólicamente, esto se representa de la siguiente manera:

$$\text{varianza de la muestra} = s^2 = \frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$

Cabe observar que se debe utilizar $n - 1$, ya que se está trabajando con datos muestrales. De ahí que, para obtener la varianza muestral, el procedimiento sea el siguiente:

- 1) Calcular la media muestral
- 2) Restar la media de cada valor de la muestra.
- 3) Elevar al cuadrado cada una de las diferencias.
- 4) Sumar las diferencias elevadas al cuadrado.
- 5) Dividir entre $n - 1$

A) ESTIMACIÓN INTERNA DE VARIANZA (WITHIN ESTÍMATE) s_w^2

Aunque parezca extraño un examen de las varianzas puede revelar si todas las medias de la población son iguales o no. El análisis de varianza utiliza dos métodos un poco diferentes para estimar las varianzas de la población (iguales). Si las dos estimaciones son aproximadamente iguales, esto tiende a confirmar H_0 ; si una de las dos estimaciones es mucho mayor que la otra, esto tiende a confirmar H_1 . Si la hipótesis nula es verdadera, entonces las muestras se habrán obtenido de poblaciones con medias iguales. Y como se supone que todas las poblaciones son normales y poseen variancias iguales, cuando H_0 es verdadera se presenta una situación conceptualmente idéntica a otra en la que todas las muestras hayan sido tomadas realmente a partir de una población única. Si H_0 es falsa, entonces las muestras provendrán de poblaciones que no presentan todas la misma media, sin embargo, cabe observar que, aún en ese caso, se debe suponer que las poblaciones son normales y tienen variancias iguales.

Una forma de calcular la varianza poblacional es sacar el promedio de las varianzas de las muestras. Es evidente que se podrá utilizar cualquiera de las varianzas muestrales, pero el promedio de todas ellas por lo general proporcionará la mejor estimación debido al mayor número de observaciones que representa. Como cada varianza muestral sólo refleja la variación dentro de una muestra en particular, la estimación de la varianza basada en el promedio de las varianzas muestrales se llama *estimación interna de variancia*. La estimación interna de variancia se calcula de la siguiente manera:

$$s_w^2 = \frac{s_1^2 + s_2^2 + s_3^2 + \dots + s_k^2}{k}$$

Donde:

s_1^2 = variancia de la muestra 1 ; s_2^2 = variancia de la muestra 2; s_3^2 = variancia de la muestra 3
 s_k^2 = variancia de la muestra k ; k = número de muestras

B) ESTIMACIÓN INTERMEDIANTE DE VARIANZA (BETWEEN ESTÍMATE) s_x^2

Como se supone que las varianzas de la población son iguales, independientemente de si las medias lo son o no, la estimación interna de varianza no se altera por la verdad o falsedad de H_0 . Por tanto, *no se puede utilizar por sí misma para determinar si las medias de la población podrían ser iguales*. No obstante, sirve como una norma de comparación respecto a la cual puede evaluarse una segunda estimación llamada estimación intermediente de varianza. *Esta segunda estimación es sensible a diferencias entre las medias de población*.

La estimación interna de varianza sirve como una norma respecto a la cual se puede comparar la estimación intermediente de varianza.

La estimación de varianza entre muestras determina una estimación de las varianzas iguales de la población de una forma indirecta a través de una distribución de muestreo de medias. Recuérdese que si H_0 , es verdadera, esto equivale a tomar todas las muestras de la misma población normal. Además, por el Teorema del Límite Central, se sabe que la distribución de muestreo de medias, obtenida de una población normal, estará distribuida normalmente, y que la desviación estándar de la distribución de muestreo (raíz cuadrada de su varianza) está directamente relacionada con el tamaño de la desviación estándar de la población (raíz cuadrada de la varianza de la población). Es decir,

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}}$$

Donde:

$s_{\bar{x}}$ = desviación estándar del muestreo de distribución de medias

s_x = desviación estándar de la población

n = tamaño de la muestra

Elevando al cuadrado ambos miembros de la ecuación, se obtiene la relación en términos de variancias:

$$\sigma_{\bar{x}}^2 = \frac{\sigma_x^2}{n}$$

Ahora, si se conoce la variancia de la distribución de muestreo, únicamente multiplicándola por el tamaño de la muestra, se obtendrá exactamente el valor de σ_x^2 decir,

$$\sigma_x^2 = n\sigma_{\bar{x}}^2$$

Pero como por lo general no se conoce σ_x^2 se emplea

$$s_x^2 = ns_{\bar{x}}^2$$

Donde

$$s_{\bar{x}}^2 = \text{varianza de las medidas aritméticas} = \frac{\sum(\bar{x} - \bar{\bar{x}})^2}{k - 1}$$

Ejemplos ilustrativos

1) Calcular la varianza muestral de 16, 19, 17, 16, 20, 19, 20

Solución:

Calculando la media aritmética se obtiene:

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{16 + 19 + 17 + 16 + 20 + 19 + 20}{7} = \frac{127}{7} = 18,143$$

Llenando la tabla para obtener datos para reemplazar valores de la fórmula de la varianza se obtiene:


x_i	$(x_i - \bar{x})$	$(x_i - \bar{x})^2$
16	-2,143	4,592
19	0,857	0,734
17	-1,143	1,306
16	-2,143	4,592
20	1,857	3,448
19	0,857	0,734
20	1,857	3,448
Total		18,854

Remplazando valores en la fórmula y realizando las operaciones respectivas se tiene:

$$s^2 = \frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n - 1} = \frac{18,854}{7 - 1} = \frac{18,854}{6} = 3,14$$

Los cálculos empleando Excel y GeoGebra se muestran en la siguientes figuras:

	A	B	C
1	16		
2	19		
3	17		
4	16		
5	20		
6	19		
7	20		
8	$s^2 = \frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$	3,14	=VAR.S(A1:A7)
9			



2) Dado la siguiente tabla con datos acerca del peso en kg por 1,7 m de estatura

Observación	Muestra			
	1	2	3	4
1	70	74	68	75
2	75	77	70	70
3	74	70	65	73
4	72	80	60	72
5	68	72	72	71
6	59	76	73	72

- a) Calcular la estimación interna de variancia
- b) Calcular la estimación intermediente de variancia

Solución:

Calculando las medias aritméticas se obtiene:

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

$$\bar{x}_1 = \frac{70 + 75 + 74 + 72 + 68 + 59}{6} = \frac{418}{6} = 69,667$$

$$\bar{x}_2 = \frac{74 + 77 + 70 + 80 + 72 + 76}{6} = \frac{449}{6} = 74,833$$

$$\bar{x}_3 = \frac{68 + 70 + 65 + 60 + 72 + 73}{6} = \frac{408}{6} = 68$$

$$\bar{x}_4 = \frac{75 + 70 + 73 + 72 + 71 + 72}{6} = \frac{433}{6} = 72,167$$

Se llena la siguiente tabla:

Observación	Muestra				$(x_1 - \bar{x}_1)^2$	$(x_2 - \bar{x}_2)^2$	$(x_3 - \bar{x}_3)^2$	$(x_4 - \bar{x}_4)^2$
	1	2	3	4				
1	70	74	68	75	0,111	0,694	0	8,026
2	75	77	70	70	28,441	4,696	4	4,696
3	74	70	65	73	18,775	23,358	9	0,694
4	72	80	60	72	5,443	26,698	64	0,028
5	68	72	72	71	2,779	8,026	16	1,361
6	59	76	73	72	113,785	1,362	25	0,028
Total	418	449	408	433	169,334	64,834	118	14,833

Remplazando los datos en la fórmula de la varianza se obtienen las varianzas de las 4 muestras.

$$s^2 = \frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$

Varianza de la muestra 1

$$s_1^2 = \frac{169,334}{5} = 33,867$$

Varianza de la muestra 2

$$s_2^2 = \frac{64,834}{5} = 12,967$$

Varianza de la muestra 3

$$s_3^2 = \frac{118}{5} = 23,6$$

Varianza de la muestra 4

$$s_4^2 = \frac{14,833}{5} = 2,967$$

a) Calculando la estimación interna de varianza se obtiene:

$$s_w^2 = \frac{s_1^2 + s_2^2 + s_3^2 + \dots + s_k^2}{k} \Rightarrow s_w^2 = \frac{33,867 + 12,967 + 23,6 + 2,967}{4} = \frac{73,401}{4} = 18,35$$

Nota: La estimación interna de varianza es la media aritmética de las varianzas.

b) Para calcular la estimación intermedia de varianza primero se calcula la varianza de las medias aritméticas

$$s_{\bar{x}}^2 = \frac{\sum(\bar{x} - \bar{\bar{x}})^2}{k - 1}$$

Para calcular la varianza de las medias aritméticas se calcula la media aritmética de las medias aritméticas, la cual es:

$$\bar{\bar{x}} = \frac{\sum \bar{x}_i}{k} = \frac{69,667 + 74,833 + 68 + 72,167}{4} = \frac{284,667}{4} = 71,167$$

Se llena la siguiente tabla:

\bar{x}	$(\bar{x} - \bar{\bar{x}})^2$
69,667	2,25
74,833	13,44
68	10,03
72,167	1
Total	26,72

Se reemplaza los datos de la tabla para calcular varianza de las medias aritméticas

$$s_{\bar{x}}^2 = \frac{\sum(\bar{x} - \bar{\bar{x}})^2}{k - 1} = \frac{26,72}{3} = 8,907$$

Finalmente se calcula la estimación intermedia de varianza, la cual queda:

$$s_x^2 = n \cdot s_{\bar{x}}^2 = 6 \cdot 8,907 = 53,44$$

Los cálculos en Excel se muestra en la siguiente figura:

	A	B	C	D	E	F	G	
1			Muestra					
2	Observación	1	2	3	4	\bar{x}		
3	1	70	74	68	75	69,667	=PROMEDIO(B3:B8)	
4	2	75	77	70	70	74,833	=PROMEDIO(C3:C8)	
5	3	74	70	65	73	68,000	=PROMEDIO(D3:D8)	
6	4	72	80	60	72	72,167	=PROMEDIO(E3:E8)	
7	5	68	72	72	71			
8	6	59	76	73	72			
9		33,87	12,97	23,60	2,97			
10	s^2	=VAR.S(B3:B8)	=VAR.S(C3:C8)	=VAR.S(D3:D8)	=VAR.S(E3:E8)			
11								
12	Estimación interna		18,350	=PROMEDIO(B9:E9)		$s_w^2 = \frac{s_1^2 + s_2^2 + s_3^2 + \dots + s_k^2}{k}$		
13	Varianza de las medias aritméticas		8,907	=VAR.S(F3:F6)		$s_{\bar{x}}^2 = \frac{\sum(\bar{x} - \bar{\bar{x}})^2}{k - 1}$		
14	n		6	=CONTAR(A3:A8)				
15	Estimación intermedia		53,44	=C14*C13		$s_x^2 = n \cdot s_{\bar{x}}^2$		

TAREA DE INTERAPRENDIZAJE N° 20

- 1) Realizar un organizador gráfico sobre el análisis de varianza
- 2) Obtenga la varianza de los siguientes datos muestrales empleando la fórmula, Empleando Excel y GeoGebra:
 - 2.1) 7, 8, 10, 15, 20, 20 y 25 $s^2 = 48$
 - 2.2) 16, 19, 20, 21, 20, 20, 24 $s^2 = 5,67$
- 3) Dado la siguiente tabla con datos acerca del kilometraje por litro de gasolina

Observación	Muestra			
	1	2	3	4
1	15,2	14,8	15,6	15,4
2	15,4	15,3	15,4	15,8
3	14,9	14,8	16,2	15,6
4	15,8	14,6	15,4	15,2
5	15,6	14,2	15,2	15,5
6	15,2	15,2	15,4	15,3

- 3.1) Realizar una estimación interna de varianza de manera manual y empleando Excel $s_w^2 = 0,1085$
- 3.2) Calcular la estimación intermedia de varianza de manera manual y empleando Excel $s_x^2 = 0,636$
- 4) Crear y resolver un ejercicio similar al anterior

C) LA RAZÓN F

A diferencia de otras pruebas de medias que se basan en la diferencia existente entre dos valores, el análisis de varianza emplea la razón de las estimaciones, dividiendo la estimación intermedia entre la estimación interna

$$\text{Razón } F = \frac{s_x^2}{s_w^2} = \frac{ns_x^2}{(s_1^2 + s_2^2 + s_3^2 + \dots + s_k^2)/k}$$

Esta razón F fue creada por el matemático británico Ronald Fisher (1890-1962). El valor estadístico de prueba resultante se debe comparar con un valor tabular de F, que indicará el valor máximo del valor estadístico de prueba que ocurriría si H_0 fuera verdadera, a un nivel de significación seleccionado. Antes de proceder a efectuar este cálculo, se debe considerar las características de la distribución F

i) Características de la distribución F

- Existe una distribución F diferente para cada combinación de tamaño de muestra y número de muestras. En el caso de la distribución F, los valores críticos para los niveles 0,05 y 0,01 generalmente se proporcionan para determinadas combinaciones de tamaños de muestra y número de muestras.

- La distribución es continua respecto al intervalo de 0 a $+\infty$. La razón más pequeña es 0. La razón no puede ser negativa, ya que ambos términos de la razón F están elevados al cuadrado.

- La forma de cada distribución de muestreo teórico F depende del número de grados de libertad que estén asociados a ella. Tanto el numerador como el denominador tienen grados de libertad relacionados.

ii) Determinación de los grados de libertad


Los grados de libertad para el numerador y el denominador de la razón F se basan en los cálculos necesarios para derivar cada estimación de la variancia de la población. La *estimación intermedia* de variancia (numerador) comprende la división de la suma de las diferencias elevadas al cuadrado entre el número de medias (muestras) menos uno, o bien, $k - 1$. Así, **$k - 1$ es el número de grados de libertad para el numerador.**

En forma semejante, el calcular cada variancia muestral, la suma de las diferencias elevadas al cuadrado entre el valor medio de la muestra y cada valor de la misma se divide entre el número de observaciones de la muestra menos uno, o bien, $n - 1$. Por tanto, el promedio de las variancias muestrales se determina dividiendo la suma de las variancias de la muestra entre el número de muestras, o k . **Los grados de libertad para el denominador son entonces, $k(n - 1)$.**

iii) Uso de la tabla de F del análisis de variancia (ANOVA)

En la tabla 5 se ilustra la estructura de una tabla de F para un nivel de significación de 0,01 o 1% y 0,05 o 5%. Se obtiene el valor tabular, localizando los grados de libertad del numerador n_1 (que se listan en la parte superior de la tabla), así como los del denominador n_2 (que se listan en una de las columnas laterales de la tabla) que corresponden a una situación dada. Utilizando el nivel de significación de 0,05 para $n_1 = 7$ y $n_2 = 3$ grados de libertad, el valor de F es 8,89

**TABLA N° 5
DISTRIBUCIÓN F DE FISHER**



Ejemplos:

Para $n_1 = 9$; $n_2 = 12$ grados de libertad

$$P(F > 2,80) = 0,05 = 5\%$$

$$P(F > 4,39) = 0,01 = 1\%$$

5% (normal) y 1% (**negritas**)

n_1 = grados de libertad del numerador

n_2 = grados de libertad del denominador

$n_1 \backslash n_2$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	20	25	50	100
1	161,45	199,50	215,71	224,58	230,16	233,99	236,77	238,88	240,54	241,88	245,95	248,01	249,26	251,77	253,04
	4052,2	4999,5	5403,4	5624,6	5763,6	5859,0	5928,4	5981,1	6022,5	6055,8	6157,3	6208,7	6239,8	6302,5	6334,1
2	18,51	19,00	19,16	19,25	19,30	19,33	19,35	19,37	19,38	19,40	19,43	19,45	19,46	19,48	19,49
	98,50	99,00	99,17	99,25	99,30	99,33	99,36	99,37	99,39	99,40	99,43	99,45	99,46	99,48	99,49
3	10,13	9,55	9,28	9,12	9,01	8,94	8,89	8,85	8,81	8,79	8,70	8,66	8,63	8,58	8,55
	34,12	30,82	29,46	28,71	28,24	27,91	27,67	27,49	27,35	27,23	26,87	26,69	26,58	26,35	26,24

iv) Cálculo de la razón F a partir de datos muestrales

$$F_{prueba} = \frac{\text{estimación intermediente de variancia}}{\text{estimación interna de variancia}} \Rightarrow F_{prueba} = \frac{s_x^2}{s_w^2} = \frac{ns_{\bar{x}}^2}{(s_1^2 + s_2^2 + s_3^2 + \dots + s_k^2)/k}$$

v) Hipótesis Nula y Alternativa

H_0 : Todas las proporciones de la población son iguales.

H_1 : No todas las proporciones de la población son iguales.

Ejemplo ilustrativo

Los pesos en kg por 1,7 m de estatura se ilustran en la siguiente tabla. La finalidad es determinar si existen diferencias reales entre las cuatro muestras. Emplear un nivel de significación de 0,05

Observación	Muestra			
	1	2	3	4
1	70	74	68	75
2	75	77	70	70
3	74	70	65	73
4	72	80	60	72
5	68	72	72	71
6	59	76	73	72

Solución:

Las hipótesis Nula y Alternativa son:

H_0 : Todas las proporciones de la población son iguales.

H_1 : No todas las proporciones de la población son iguales.

Calculando los grados de libertad de numerador se tiene:

$$k - 1 = 4 - 1 = 3$$

Calculando los grados de libertad del denominador se tiene:

$$k(n - 1) = 4(6 - 1) = 20$$

Con 3 grados de libertad en el numerador, 20 grados de libertad en el denominador y con un nivel de significación $\alpha = 0,05$ con lectura la tabla se obtiene $F_{tabla} = 3,10$
 Para calcular F_{prueba} se procede de la siguiente manera:

Calculando las medias aritméticas se obtiene:

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

$$\bar{x}_1 = \frac{70 + 75 + 74 + 72 + 68 + 59}{6} = \frac{418}{6} = 69,667$$

$$\bar{x}_2 = \frac{74 + 77 + 70 + 80 + 72 + 76}{6} = \frac{449}{6} = 74,833$$

$$\bar{x}_3 = \frac{68 + 70 + 65 + 60 + 72 + 73}{6} = \frac{408}{6} = 68$$

$$\bar{x}_4 = \frac{75 + 70 + 73 + 72 + 71 + 72}{6} = \frac{433}{6} = 72,167$$

Se llena la siguiente tabla para calcular las varianzas muestrales:

Observación	Muestra				$(x_1 - \bar{x}_1)^2$	$(x_2 - \bar{x}_2)^2$	$(x_3 - \bar{x}_3)^2$	$(x_4 - \bar{x}_4)^2$
	1	2	3	4				
1	70	74	68	75	0,111	0,694	0	8,026
2	75	77	70	70	28,441	4,696	4	4,696
3	74	70	65	73	18,775	23,358	9	0,694
4	72	80	60	72	5,443	26,698	64	0,028
5	68	72	72	71	2,779	8,026	16	1,361
6	59	76	73	72	113,785	1,362	25	0,028
Total	418	449	408	433	169,334	64,834	118	14,833

Remplazando los datos en la fórmula de la varianza se obtienen las varianzas de las 4 muestras.

$$s^2 = \frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$

$$s_1^2 = \frac{169,334}{5} = 33,867$$

$$s_2^2 = \frac{64,834}{5} = 12,967$$

$$s_3^2 = \frac{118}{5} = 23,6$$

$$s_4^2 = \frac{14,833}{5} = 2,967$$

Calculando la estimación interna de varianza se obtiene:

$$s_w^2 = \frac{s_1^2 + s_2^2 + s_3^2 + \dots + s_k^2}{k}$$

$$s_w^2 = \frac{33,867 + 12,967 + 23,6 + 2,967}{4} = \frac{73,401}{4} = 18,35$$

Para calcular la estimación intermedia de varianza primero se calcula la varianza de las medias aritméticas

$$s_{\bar{x}}^2 = \frac{\sum(\bar{x} - \bar{\bar{x}})^2}{k - 1}$$

Para calcular la varianza de las medias aritméticas se calcula la media aritmética de las medias aritméticas, la cual es:

$$\bar{\bar{x}} = \frac{\sum \bar{x}_i}{k} = \frac{69,667 + 74,833 + 68 + 72,167}{4} = \frac{284,667}{4} = 71,167$$

Se llena la siguiente tabla:

\bar{x}	$(\bar{x} - \bar{\bar{x}})^2$
69,667	2,25
74,833	13,44
68	10,03
72,167	1
Total	26,72

Se reemplaza los datos de la tabla para calcular varianza de las medias aritméticas

$$s_{\bar{x}}^2 = \frac{\sum(\bar{x} - \bar{\bar{x}})^2}{k - 1} = \frac{26,72}{3} = 8,907$$

Calculando la estimación intermedia de varianza se obtiene:

$$s_x^2 = n \cdot s_{\bar{x}}^2 = 6 \cdot 8,907 = 53,44$$


Finalmente calculando F_{prueba} se tiene:

$$F_{prueba} = \frac{s_x^2}{s_w^2} = \frac{53,44}{18,35} = 2,91$$


Los cálculos empleando Excel se muestran en la siguiente figura:

	A	B	C	D	E	F	G	H	
1			Muestra k						
2	Observación n	1	2	3	4	\bar{x}			
3	1	10	12	15	18	12,833	=PROMEDIO(B3:B8)		
4	2	11	14	16	15	13,667	=PROMEDIO(C3:C8)		
5	3	13	15	14	14	16,167	=PROMEDIO(D3:D8)		
6	4	14	15	20	15	16,167	=PROMEDIO(E3:E8)		
7	5	15	10	16	20				
8	6	14	16	16	15				
9	s^2	3,77	5,07	4,17	5,37				
10		=VAR.S(B3:B8)	=VAR.S(C3:C8)	=VAR.S(D3:D8)	=VAR.S(E3:E8)				
11									
12	Estimación interna		4,59	=PROMEDIO(B9:E9)		$s_w^2 = \frac{s_1^2 + s_2^2 + s_3^2 + \dots + s_k^2}{k}$			
13	Varianza de las medias aritméticas		2,95	=VAR.S(F3:F6)		$s_{\bar{x}}^2 = \frac{\sum(\bar{x} - \bar{\bar{x}})^2}{k - 1}$			
14	n		6	=CONTAR(A3:A8)					
15	Estimación intermedia		17,71	=C14*C13		$s_x^2 = n \cdot s_{\bar{x}}^2$			
16	F_{prueba}		3,86	=C15/C12		$F_{prueba} = \frac{s_x^2}{s_w^2}$			
17									
18	k		4	=CONTAR(B2:E2)					
19	k - 1		3	=C18-1					
20	k(n - 1)		20	=C18*(C14-1)					
21	α		0,05						
22	F_{tabla}		3,10	=INV.F.CD(C21;C19;C20)					

La gráfica elaborada empleando Winstats y Paint se muestra en la siguiente figura:



La gráfica elaborada empleando GeoGebra se muestra en la siguiente figura:



Decisión: Como F_{prueba} es menor que F_{tabla} , H_0 se acepta, por lo tanto no existen diferencias reales en los pesos de las 4 muestras, es decir, todas las proporciones de la población son iguales.

TAREA DE INTERAPRENDIZAJE N° 21

- 1) ¿Qué es razón F?
- 2) Describa brevemente las características de la distribución F
- 3) ¿En qué se asemeja la distribución F a la distribución t?. y ¿En qué se diferencian?
- 4) Las calificaciones promedio de 4 asignaturas de un curso de cierta universidad se ilustran en la siguiente tabla. La finalidad es determinar si existen diferencias reales entre las calificaciones de las cuatro asignaturas. Emplear un nivel de significación de 0,05. Resuelva de forma manual, Empleando Excel, Winstats y GeoGebra.

Observación	Muestra			
	1	2	3	4
1	5	5	7	9
2	10	7	9	8
3	9	10	8	10
4	6	8	10	4
5	7	9	10	7

Como $F_{prueba} = 0,52$ es menor que $F_{tabla} = 3,24$, H_0 se acepta, por lo tanto no existen diferencias reales en las calificaciones de las 4 asignaturas.

- 5) Determinar si existen diferencias reales entre 4 asignaturas que usted recibe, empleando 7 observaciones y un nivel de significación de 0,05. Resuelva de forma manual, Empleando Excel y Winstats

4.3) PRUEBAS DE HIPÓTESIS PARA PROPORCIONES

Las pruebas de proporciones son adecuadas cuando los datos que se están analizando constan de cuentas o frecuencias de elementos de dos o más clases. El objetivo de estas pruebas es evaluar las afirmaciones con respecto a una proporción (o Porcentaje) de población. Las pruebas se basan en la premisa de que una proporción muestral (es decir, x ocurrencias en n observaciones, o x/n) será igual a la proporción verdadera de la población si se toman márgenes o tolerancias para la variabilidad muestral. Las pruebas suelen enfocarse en la diferencia entre un número esperado de ocurrencias, suponiendo que una afirmación es verdadera, y el número observado realmente. La diferencia se compara con la variabilidad prescrita mediante una distribución de muestreo que tiene como base el supuesto de que H_0 es realmente verdadera.

En muchos aspectos, las pruebas de proporciones se parecen a las pruebas de medias, excepto que, en el caso de las primeras, los datos muestrales se consideran como cuentas en lugar de como mediciones. Por ejemplo, las pruebas para medias y proporciones se pueden utilizar para evaluar afirmaciones con respecto a:

- 1) Un parámetro de población único (prueba de una muestra)
- 2) La igualdad de parámetros de dos poblaciones (prueba de dos muestras), y
- 3) La igualdad de parámetros de más de dos poblaciones (prueba de k muestras). Además, para tamaños grandes de muestras, la distribución de muestreo adecuada para pruebas de proporciones de una y dos muestras es aproximadamente normal, justo como sucede en el caso de pruebas de medias de una y dos muestras.

A) PRUEBA DE PROPORCIONES DE UNA MUESTRA

Cuando el objetivo del muestreo es evaluar la validez de una afirmación con respecto a la proporción de una población, es adecuado utilizar una prueba de una muestra. La metodología de prueba depende de si el número de observaciones de la muestra es grande o pequeño.

Como se habrá observado anteriormente, las pruebas de grandes muestras de medias y proporciones son bastante semejantes. De este modo, los valores estadísticos de prueba miden la desviación de un valor estadístico de muestra a partir de un valor propuesto. Y ambas pruebas se basan en la distribución normal estándar para valores críticos. Quizá la única diferencia real entre las ambas radica en la forma como se obtiene la desviación estándar de la distribución de muestreo.

Esta prueba comprende el cálculo del valor estadístico de prueba Z

$$Z_{prueba} = \frac{\frac{x}{n} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}}$$

Donde:

x = *ocurrencias*

n = *observaciones*

$\frac{x}{n}$ = *proporción de la muestra*

p_0 = *proporción propuesta*

$\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}$ = *desviación estándar de la proporción*

Si se muestrea a partir de una población finita

$$\frac{n}{N} \cdot 100\% > 5\%$$

Se debe utilizar el factor finito de corrección

$$Z_{prueba} = \frac{\frac{x}{n} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}} \cdot \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}}$$

Posteriormente este valor es comparado con el valor de Z, obtenido a partir de una tabla normal a un nivel de significación seleccionado.

Como ocurrió con la prueba de medias de una muestra, las pruebas de proporciones pueden ser de una o dos colas. El tipo de prueba refleja H_1 . Por ejemplo, hay tres posibilidades para H_1 :

$$H_1: p > p_0 \quad H_1: p < p_0 \quad H_1: p \neq p_0$$

La hipótesis nula es: $H_0: p = p_0$

La primera alternativa establece una prueba de cola derecha, la segunda, izquierda y la tercera, una prueba de dos colas.

Ejemplo ilustrativo

En un estudio se afirma que 3 de 10 estudiantes universitarios trabajan. Pruebe esta aseveración, a un nivel de significación de 0,025, respecto a la alternativa de que la proporción real de los estudiantes universitarios trabajan es mayor de lo que se afirma, si una muestra aleatoria de 600 estudiantes universitarios revela que 200 de ellos trabajan. La muestra fue tomada de 10000 estudiantes.

Los datos son:

$$p_0 = \frac{3}{10} = 0,3; \alpha = 0,025; n = 600; X = 200; N = 10000$$

Las hipótesis son:

$$H_0: p = p_0$$

$$H_1: p > p_0$$

Con lectura en la tabla para un área de 0,025 le corresponde un valor $Z_{tabla} = 1,96$. Se toma en cuenta el valor positivo porque se trata de una prueba de hipótesis a cola derecha.

Como en los datos aparece el tamaño de la población, se debe verificar si el tamaño de la muestra es mayor que el 5%. Se reemplaza valores en la siguiente fórmula:

$$\frac{n}{N} \cdot 100\% > 5\% \Rightarrow \frac{600}{10000} \cdot 100\% = 6\%$$


Por lo tanto se debe utilizar la fórmula con el factor finito de corrección.

$$Z_{prueba} = \frac{\frac{x}{n} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n} \cdot \frac{N-n}{N-1}}} = \frac{\frac{200}{600} - 0,3}{\sqrt{\frac{0,3(1-0,3)}{600} \cdot \frac{10000-600}{10000-1}}} = 1,84$$

Los cálculos empleando Excel se muestran en la siguiente figura:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	p_0	0,3	=3/10						
2	n	600							
3	x	200							
4	α	0,025							
5	N	10000							
6	$\frac{n}{N} \cdot 100\% > 5\%$	6	=(B2/B5)*100						
7	$H_0: p = p_0$								
8	$H_1: p > p_0$								
9	Z_{tabla}	-1,96	=DISTR.NORM.ESTAND.INV(B4)						
10		1,96	=B8*-1						
11									
12	$Z_{prueba} = \frac{\frac{x}{n} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n} \cdot \frac{N-n}{N-1}}}$			1,84					
13									
14									
15									

El gráfico elaborado empleando Winstats y Paint se muestra a continuación:



Decisión: H_0 es aceptada, ya que $Z_{prueba} = 1,84$ es menor que $Z_{tabla} = 1,96$, por lo tanto es cierto que 3 de 10 estudiantes universitarios trabajan.

TAREA DE INTERAPRENDIZAJE N° 22

Los siguientes problemas resolver en forma manual (con lectura en la tabla), Empleando Excel y Winstats

1) Un fabricante asegura que un embarque de ciertos sacos contiene menos del 0,5% de piezas defectuosas. Una muestra aleatoria de 100 de ellos presenta 2 defectuosos. Se desea evitar que acepte una remesa con más del 0,5% de sacos defectuosos. Realiza una prueba al nivel 0,02

H_0 no se acepta, ya que $Z_{prueba} (2,13)$ es mayor que $Z_{tabla} (2,05)$

2) En un estudio se afirma que 6 de 10 estudiantes universitarios trabajan. Pruebe esta aseveración, a un nivel de significación de 0,025, respecto a la alternativa de que la proporción real de los estudiantes universitarios trabajan es menor de lo que se afirma, si una muestra aleatoria de 200 estudiantes universitarios revela que 110 de ellos trabajan.

H_0 es aceptada, ya que $Z_{prueba} (-1,44)$ es mayor que $Z_{tabla} (-1,96)$

3) En una ciudad se afirma que aproximadamente el 90% de los jóvenes en su área terminan la educación secundaria. Ponga a prueba esta aseveración contra la alternativa de que el porcentaje verdadero no es el 90%, y utilice una probabilidad del 5% de que se comete un error de tipo I. Una muestra de 100 jóvenes indica que el 80% de ellos terminan la educación secundaria.

H_0 no se acepta, ya que $Z_{prueba} (-3,3)$ está en la zona de rechazo de $Z_{tabla} (\pm 1,96)$

4) Una empresa fabricante de zapatos asegura que menos del 2% de las cajas de zapatos están con defectos. Una comprobación aleatoria revela que 2 de 50 cajas están con defectos. La muestra fue tomada de una remesa de 200 cajas de zapatos. Se quiere evitar que haya demasiadas cajas con defectos. Realice la prueba con un 0,0075 nivel de significación.

H_0 es aceptada, ya que $Z_{prueba} (1,16)$ está en la zona de aceptación de $Z_{tabla} (2,43)$

5) Consulte en la biblioteca o en el internet un ejercicio resuelto sobre prueba de hipótesis para proporciones. Presente el ejercicio resuelto empleando Excel y Winstats.

B) PRUEBA DE PROPORCIONES DE DOS MUESTRAS

El objetivo de una prueba de dos muestras es determinar si las dos muestras independientes fueron tomadas de dos poblaciones, las cuales presentan la misma proporción de elementos con determinada característica. La prueba se concentra en la diferencia relativa (diferencia dividida entre la desviación estándar de la distribución de muestreo) entre las dos proporciones muestrales. Diferencias pequeñas denotan únicamente la variación casual producto del muestreo (se acepta H_0), en tanto que grandes diferencias significan lo contrario (se rechaza H_0). El valor estadístico de prueba (diferencia relativa) es comparado con un valor tabular de la distribución normal, a fin de decidir si H_0 es aceptada o rechazada. Una vez más, esta prueba se asemeja considerablemente a la prueba de medias de dos muestras.

La hipótesis nula en una prueba de dos muestras es

$$H_0: p_1 = p_2$$

Las hipótesis alternativas posibles son

$$H_1: p_1 \neq p_2 \quad H_1: p_1 > p_2 \quad H_1: p_1 < p_2$$

La estimación combinada de p se calcula de la siguiente manera:

$$p = \frac{x_1 + x_2}{n_1 + n_2}$$

Donde:

p = proporción muestral; x_1 = número de aciertos en la muestra 1

x_2 = número de aciertos en la muestra 2 ; n_1 = número de observaciones de la muestra 1

n_2 = número de observaciones de la muestra 2

Este valor de p se utiliza para calcular el valor estadístico de prueba

$$Z_{prueba} = \frac{\frac{x_1}{n_1} - \frac{x_2}{n_2}}{\sqrt{p(1-p) \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$$

Ejemplo ilustrativo

Se ponen a prueba la enseñanza de la Estadística empleando Excel y Winstats. Para determinar si los estudiantes difieren en términos de estar a favor de la nueva enseñanza se toma una muestra de 20 estudiantes de dos paralelos. Del paralelo A 18 están a favor, en tanto que del paralelo B están a favor 14. ¿Es posible concluir con un nivel de significación de 0,05 que los estudiantes que están a favor de la nueva enseñanza de la Estadística es la misma en los dos paralelos?.

Los datos son:

$$n_1 = 20 ; n_2 = 20; x_1 = 18; x_2 = 14; x_2 = 14$$

Las hipótesis son:

$$H_0: p_1 = p_2; H_1: p_1 \neq p_2$$

Como se trata de una prueba de hipótesis a dos colas se debe calcular

$$\frac{\alpha}{2} = \frac{0,05}{2} = 0,025$$

Con lectura en la tabla para un área de 0,025 le corresponde un valor $Z_{tabla} = \pm 1,96$.

Calculando la proporción muestral se obtiene:

$$p = \frac{x_1 + x_2}{n_1 + n_2} = \frac{18 + 14}{20 + 20} = 0,8$$


Calculando Z_{prueba} se obtiene:

$$Z_{prueba} = \frac{\frac{x_1}{n_1} - \frac{x_2}{n_2}}{\sqrt{p(1-p)\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}} = \frac{\frac{18}{20} - \frac{14}{20}}{\sqrt{0,8(1-0,8)\left(\frac{1}{20} + \frac{1}{20}\right)}} = 1,58$$


Los cálculos empleando Excel se muestran en la siguiente figura:

	A	B	C	D	E	F
1	n_1	20				
2	n_2	20				
3	x_1	18				
4	x_2	14				
5	α	0,05				
6	$H_0: p_1 = p_2$					
7	$H_1: p_1 \neq p_2$					
8	$\frac{\alpha}{2}$	0,025				
9	$\frac{\alpha}{2}$					
10	Z_{tabla}	-1,96	=DISTR.NORM.ESTAND.INV(B8)			
11		1,96	=B10*-1			
12	$p = \frac{x_1 + x_2}{n_1 + n_2}$	0,8	=(B3+B4)/(B1+B2)			
13						
14						
15	$Z_{prueba} = \frac{\frac{x_1}{n_1} - \frac{x_2}{n_2}}{\sqrt{p(1-p)\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$	1,58	=(B3/B1-B4/B2)/RAIZ(B12*(1-B12)*(1/B1+1/B2))			
16						
17						

El gráfico elaborado empleando Winstats y Paint se muestra a continuación:



Los cálculos empleando GeoGebra se muestran en la siguiente figura:



Decisión: H_0 es aceptada, ya que $Z_{prueba} = 1,58$ está en la zona de aceptación $Z_{tabla} = \pm 1,96$, entonces, la proporción de los estudiantes que están a favor de la nueva enseñanza de la Estadística es la misma en los dos paralelos.

TAREA DE INTERAPRENDIZAJE N° 23

- 1) ¿Cuál es el objetivo de una prueba de proporciones de dos muestras?
- 2) Los siguientes problemas resolver en forma manual (con lectura en la tabla), Empleando Excel, GeoGebra y Winstats
 - a) A los votantes de dos ciudades se les pregunta si están a favor o en contra de una ley que está actualmente en estudio en la Asamblea Constituyente. Para determinar si los votantes de las dos ciudades difieren en términos del porcentaje que está a favor, se toma una muestra de 100 votantes de cada ciudad. Treinta de los muestreados de una ciudad están a favor, en tanto que, en la otra, lo están veinte. ¿Se podría decir que la proporción de votantes que están a favor de la aprobación de la ley es la misma en estas ciudades?. Realice la prueba con un nivel de significación de 0,05

H_0 es aceptada, ya que $Z_{prueba} (1,63)$ está en la zona de aceptación de $Z_{tabla} (\pm 1,96)$
 - b) Se ponen a prueba dos métodos posibles para tatar botellas. En un lote de 1000, la máquina A genera 30 rechazos, en tanto que la máquina B solamente genera 20. ¿Es posible concluir con un nivel de significación de 0,05 que las dos máquinas son diferentes?

H_0 es aceptada, ya que $Z_{prueba} (1,43)$ está en la zona de aceptación de $Z_{tabla} (\pm 1,96)$
- 3) Consulte en la biblioteca o en internet un problema similar a cualquiera de los anteriores y presente resuelto empleando Excel y GeoGebra.

C) PRUEBA DE PROPORCIONES DE k MUESTRAS

La finalidad de una prueba de k muestras es evaluar la aseveración que establece que todas las k muestras independientes provienen de poblaciones que presentan la misma proporción de algún elemento. De acuerdo con esto, las hipótesis nula y alternativa son:

H_0 : Todas las proporciones de la población son iguales.

H_1 : No todas las proporciones de la población son iguales.

La estimación combinada de la proporción muestral “p” se calcula de la siguiente manera:

$$p = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n_1 + n_2 + n_3 + \dots + n_n}$$

En una muestra se puede dar un conjunto de sucesos, los cuales ocurren con frecuencias observadas “o” (las que se observa directamente) y frecuencias esperadas o teóricas “e” (las que se calculan de acuerdo a las leyes de probabilidad).

La frecuencia esperada “e” se calcula así:

$$e = p \cdot o_{total}$$

Donde:

p = proporción muestral

o_{total} = frecuencia total observada

El estadístico de prueba es

$$\chi^2_{prueba} = \frac{(o_1 - e_1)^2}{e_1} + \frac{(o_2 - e_2)^2}{e_2} + \frac{(o_3 - e_3)^2}{e_3} + \dots + \frac{(o_n - e_n)^2}{e_n} \Rightarrow \chi^2_{prueba} = \sum \frac{(o_i - e_i)^2}{e_i}$$

Donde:

χ es la letra griega ji ; χ^2 se lee ji cuadrado


Por lo tanto el valor estadístico de prueba para este caso es la prueba *ji cuadrado* o conocida también como *chi cuadrado*. **La prueba chi cuadrado se emplea para determinar si dos variables cualitativas son independientes.**

Como sucede con las distribuciones t y F, la distribución ji cuadrado tiene una forma que depende del número de grados de libertad asociados a un determinado problema.

Para obtener un valor crítico (valor que deja un determinado porcentaje de área en la cola) a partir de una tabla de ji cuadrado, se debe seleccionar un nivel de significación y determinar los grados de libertad para el problema que se esté resolviendo.

Los grados de libertad son una función del número de casillas en una tabla de $2 \cdot k$. Es decir, los grados de libertad reflejan el tamaño de la tabla. Los grados de libertad de la columna son el número de filas (categorías) menos 1, o bien, $r - 1$. Los grados de libertad de cada fila es igual al número de columnas (muestras) menos 1, o bien, $k - 1$. El efecto neto es que el número de grados de libertad para la tabla es el producto de (número de filas -1) por (número de columnas -1), o bien, $(r - 1)(k - 1)$. Por lo tanto con 2 filas y 4 columnas, los grados de libertad son $(2 - 1)(4 - 1) = 3$

La prueba ji cuadrado requiere la comparación del χ^2_{prueba} con el χ^2_{tabla} . Si el valor estadístico de prueba es menor que el valor tabular, la hipótesis nula es aceptada, caso contrario, H_0 no es aceptada.



Nota: Un valor estadístico de χ^2_{prueba} menor que el valor crítico χ^2_{tabla} o igual a él se considera como prueba de la variación casual en donde H_0 es aceptada.


Ejemplos ilustrativos:

1) El siguiente valor $4 \cdot 5$ representa el tamaño de una tabla $r \cdot k$. Determine el número de grados de libertad y obtenga el valores crítico en el niveles 0,05 se significación.

Solución:

Los grados de libertad se calculan aplicando la fórmula:

$Grados\ de\ libertad = (r - 1)(k - 1); Grados\ de\ libertad = (4 - 1)(5 - 1) = 12$



	0,995	0,990	0,975	0,950	0,900	0,750	0,500	0,250	0,100	0,050	0,025	0,010	0,005
1	0,000	0,000	0,001	0,004	0,016	0,102	0,455	1,323	2,706	3,841	5,024	6,635	7,879
2	0,010	0,020	0,051	0,103	0,211	0,575	1,386	2,773	4,605	5,991	7,378	9,210	10,597
3	0,072	0,115	0,216	0,352	0,584	1,213	2,366	4,108	6,251	7,815	9,348	11,345	12,838
4	0,207	0,297	0,484	0,711	1,064	1,923	3,357	5,385	7,779	9,488	11,143	13,277	14,860
5	0,412	0,554	0,831	1,145	1,610	2,675	4,351	6,626	9,236	11,070	12,833	15,086	16,750
6	0,676	0,872	1,237	1,635	2,204	3,455	5,348	7,841	10,645	12,592	14,449	16,812	18,548
7	0,989	1,239	1,690	2,167	2,833	4,255	6,346	9,037	12,017	14,067	16,013	18,475	20,278
8	1,344	1,646	2,180	2,733	3,490	5,071	7,344	10,219	13,362	15,507	17,535	20,090	21,955
9	1,735	2,088	2,700	3,325	4,168	5,899	8,343	11,389	14,684	16,919	19,023	21,666	23,589
10	2,156	2,558	3,247	3,940	4,865	6,737	9,342	12,549	15,987	18,307	20,483	23,209	25,188
11	2,603	3,053	3,816	4,575	5,578	7,584	10,341	13,701	17,275	19,675	21,920	24,725	26,757
12	3,074	3,571	4,404	5,226	6,304	8,438	11,340	14,845	18,549	21,026	23,337	26,217	28,300

Con lectura en la tabla con 12 grados de libertad y 0,05 de área se obtiene $\chi_{tabla}^2 = 21,026$
 Los cálculos empleando Excel se muestran en la siguiente figura:

	A	B	C	D	E
1	r	4			
2	k	5			
3					
4	(r-1)(k-1)	12	=(B1-1)*(B2-1)		
5					
6	α	0,05			
7	χ_{tabla}^2	21,0261	=INV.CHICUAD.CD(B6;B4)		
8					
9	α	0,01			
10	χ_{tabla}^2	26,2170	=INV.CHICUAD.CD(B9;B4)		

2) La siguiente tabla muestra las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas al lanzar un dado 60 veces. Contrastar la hipótesis de que el dado es bueno, con un nivel de significación de 0,01.

Cara del dado	1	2	3	4	5	6
Frecuencia observada	6	8	9	15	14	8
Frecuencia esperada	10	10	10	10	10	10

Solución:

$$r = 2$$

$$k = 6$$

$$\alpha = 0,01$$

Las hipótesis son:

H_0 : Todas las proporciones de la población son iguales.

H_1 : No todas las proporciones de la población son iguales.

Los grados de libertad se calculan aplicando la fórmula:

$$\text{Grados de libertad} = (2 - 1)(6 - 1)$$

$$\text{Grados de libertad} = 5$$

Con lectura en la tabla con 5 grados de libertad y 0,01 de área se obtiene $\chi_{tabla}^2 = 15,086$

Calculando χ_{prueba}^2 se obtiene:

$$\chi_{prueba}^2 = \sum \frac{(o_i - e_i)^2}{e_i}$$

$$\chi_{prueba}^2 = \frac{(6 - 10)^2}{10} + \frac{(8 - 10)^2}{10} + \frac{(9 - 10)^2}{10} + \frac{(15 - 10)^2}{10} + \frac{(14 - 10)^2}{10} + \frac{(8 - 10)^2}{10}$$


$$\chi_{prueba}^2 = 1,6 + 0,4 + 0,1 + 2,5 + 1,6 + 0,4$$

$$\chi_{prueba}^2 = 6,6$$


Los cálculos empleando Excel se muestran en la siguiente figura:


	A	B	C	D	E	F	G
1	Cara del dado	1	2	3	4	5	6
2	Frecuencia observada	6	8	9	15	14	8
3	Frecuencia esperada	10	10	10	10	10	10
4							
5	α	0,01					
6	r	2	=CONTAR(B2:B3)				
7	k	6	=CONTAR(B2:G2)				
8	$(r-1)(k-1)$	5	=(B6-1)*(B7-1)				
9	χ^2_{tabla}	15,086	=INV.CHICUAD.CD(B5;B8)				
10							
11	Probabilidad de χ^2_{prueba}	0,2521	=PRUEBA.CHICUAD(B2:G2;B3:G3)				
12	$\chi^2_{prueba} = \sum \frac{(o_i - e_i)^2}{e_i}$	6,6	=INV.CHICUAD.CD(B11;B8)				
13							

Los cálculos empleando GeoGebra (en Entrada se escribe TestChiCuadrado) se muestran en la siguiente figura:




El gráfico elaborado Empleando GeoGebra se muestra a continuación:





El gráfico elaborado empleando Winstats y Paint se muestra a continuación:



Decisión: H_0 es aceptada, ya que χ^2_{prueba} (6,6) es menor que χ^2_{tabla} (15,086), por lo tanto, se concluye que todas las proporciones de la población son iguales, es decir, el dado es bueno.

3) En una fábrica se producen piezas para repuestos en tres turnos distintos: mañana, tarde y noche. Las piezas pueden resultar de calidad excelente, buena o mediocre. Los resultados de un día de trabajo se muestran a continuación

	Mañana	Tarde	Noche	Totales
Excelentes	65	68	62	195
Buenas/Mediocres	35	32	38	105
Totales	100	100	100	300

Aplice el test de chi-cuadrado para determinar si la calidad de la pieza fabricada es independiente del turno con un nivel de significación de 0,01

Solución:

Las Hipótesis son:

H_0 : La calidad de la pieza fabricada es independiente del turno

H_1 : La calidad de la pieza fabricada no es independiente del turno

Calculando las frecuencias esperadas

Excelentes:

$$\frac{195}{300} \cdot 100 = 65$$

Buenas/Mediocres:


$$\frac{105}{300} \cdot 100 = 35$$

	Mañana	Tarde	Noche	Totales
Excelentes	65	65	65	195
Buenas/Mediocres	35	35	35	105
Totales	100	100	100	300

Calculando los grados de libertad

$$\text{Grados de libertad} = (N^{\circ} \text{ de filas} - 1)(N^{\circ} \text{ de columnas} - 1) = (2 - 1)(3 - 1) = 2$$

Con lectura en la tabla con 2 grados de libertad y a un nivel de 5% de calidad se obtiene $\chi^2_{\text{tabla}} = 5,991$



Empleando Excel

9	filas	2		
10	columnas	3		
11	Grados de libertad	2	= (B9-1)*(B10-1)	
12	Significación	0,05		
13	χ^2_{tabla}	5,991	= INV.CHICUAD.CD(B12;C11)	

Calculando χ^2_{prueba} con la fórmula

$$\chi^2_{\text{prueba}} = \sum \frac{(o_i - e_i)^2}{e_i}$$

$$\chi^2_{\text{prueba}} = \frac{(65 - 65)^2}{65} + \frac{(68 - 65)^2}{65} + \frac{(62 - 65)^2}{65} + \frac{(35 - 35)^2}{35} + \frac{(32 - 35)^2}{35} + \frac{(38 - 35)^2}{35}$$

$$\chi^2_{prueba} = 0,791$$

Calculando χ^2_{prueba} Empleando Excel

	A	B	C	D	E	F
1	Frecuencia observada					
2	65	68	62			
3	35	32	38			
4						
5	Frecuencia esperada					
6	65	65	65			
7	35	35	35			
8						
9	Probabilidad de χ^2_{prueba}		0,67327299	=PRUEBA.CHICUAD(A2:C3;A6:C7)		
10						
11		χ^2_{prueba}	0,79120879	=INV.CHICUAD.CD(C9;2)		

Calculando χ^2_{prueba} Empleando GeoGebra

Distribución Estadísticas

Test ChiCuadrado

Filas 2 Columnas 3

Fila % Columna % Frecuencia esperada Contribución X²


	65	68	62
	35	32	38
	100	100	62

Resultado

Test ChiCuadrado

glib	2
X²	0.7912
P	0.6733

Graficando en Winstats



Decisión: Dado que $\chi^2_{prueba} = 0,791 < \chi^2_{tabla} = 5,991$ se acepta la hipótesis nula, es decir, existe evidencia para afirmar que la calidad de la pieza fabricada es **independiente** del turno

4) Caso de experimentación sobre la germinación de semillas de fréjol en tres ambientes diferentes

Los ambientes son:

Ambiente A	Ambiente B	Ambiente C
8 semillas	8 semillas	8 semillas
Luz roja y azul (12 horas diarias)	Luz roja y azul (12 horas diarias)	Luz natural (12 h diarias)
Música clásica (2 horas diarias)	Música Pop (2 horas diarias)	Sin música

Realizado el experimento se observa:

Número observado de germinaciones						
Nº de Día \ Ambiente	1	2	3	4	5	6
A	0	0	0	1	3	7
B	0	0	1	2	3	4
C	0	0	0	1	1	2

El experimento planteado como ejercicio:

Una estudiante del 2do BI de la Unidad Educativa Ibarra realiza el experimento de plantar 24 semillas de fréjol en el mismo terreno. Las semillas las divide en 3 grupos de 8 semillas cada uno. Cada grupo de semillas los expone a tres ambientes diferentes cada uno (A, B, C). El ambiente A fue exponer al primer grupo a luz roja y azul (12 horas diarias) con música clásica (2 horas diarias), el ambiente B fue exponer al segundo grupo a luz roja y azul (12 horas diarias) con música Pop (2 horas diarias) y el ambiente C

fue exponer al tercer grupo a luz natural (sol) y sin música. Al cumplirse el 6to día de plantar las semillas no todas germinaron. La estudiante desea determinar si el número de germinaciones son independientes del tipo de ambiente expuesto a un nivel de significación de 0,05 empleando la prueba χ^2 . Los resultados se muestran en la siguiente tabla:

Ambiente \ Resultado	A	B	C	Totales
Germinaron	7	4	2	13
No Germinaron	1	4	6	11
Totales	8	8	8	24

Solución:

Planteando las hipótesis

H_0 : El número de germinaciones de las semillas de frejol son independientes del tipo de ambiente expuesto

H_1 : El número de germinaciones de las semillas de frejol no son independientes del tipo de ambiente expuesto

Calculando la proporción muestral “p” se tiene:

$$p = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots x_n}{n_1 + n_2 + n_3 + \dots n_n}$$

Para las semillas que germinaron

$$p_g = \frac{7 + 4 + 2}{8 + 8 + 8} = \frac{13}{24}$$

Para las semillas que no germinaron

$$p_{ng} = \frac{1 + 4 + 6}{8 + 8 + 8} = \frac{11}{24}$$

Calculando las frecuencias esperadas

$$e = p \cdot o_{total}$$

Para las semillas que germinaron:

$$\frac{13}{24} \cdot 8 = \frac{13}{3} = 4,33$$

Para las semillas que no germinaron:

$$\frac{11}{24} \cdot 8 = \frac{11}{3} = 3,67$$

Ambiente \ Resultado	A	B	C	Totales
Germinaron	4,33	4,33	4,33	13
No Germinaron	3,67	3,67	3,67	11
Totales	8	8	8	24

Cálculo de los grados de libertad


$Grados\ de\ libertad = (N^{\circ}\ de\ filas - 1)(N^{\circ}\ de\ columnas - 1) = (r - 1)(k - 1)$

$Grados\ de\ libertad = (2 - 1)(3 - 1)$

$Grados\ de\ libertad = 2$

Obtención de χ^2_{tabla} con lectura en la tabla

Con 2 grados de libertad y 0,05 de área se obtiene $\chi^2_{tabla} = 5,991$



Cálculo de χ^2_{prueba}

$$\chi^2_{prueba} = \sum \frac{(o_i - e_i)^2}{e_i}$$

$$\chi^2_{prueba} = \frac{(7 - 4,33)^2}{4,33} + \frac{(4 - 4,33)^2}{4,33} + \frac{(2 - 4,33)^2}{4,33} + \frac{(1 - 3,67)^2}{3,67} + \frac{(4 - 3,67)^2}{3,67} + \frac{(6 - 3,67)^2}{3,67}$$

$$\chi^2_{prueba} = 6,38$$

Cálculo de las frecuencias esperadas y de χ^2_{prueba} Empleando GeoGebra:


The screenshot shows the GeoGebra interface for a Chi-Square Test. The 'Test ChiCuadrado' dropdown is selected. The input parameters are 'Filas 2' and 'Columnas 3'. The 'Frecuencia esperada' checkbox is checked. The input data table is as follows:

	7	4	2
	4.3333	4.3333	4.3333
	1	4	6
	3.6667	3.6667	3.6667
	8	8	8

The results section, titled 'Resultado', shows the following values:

glib	2
χ^2	6.3776
P	0.0412

Graficando χ^2_{tabla} y χ^2_{prueba} empleando Winstats y Paint se tiene



Decisión:

Debido a que $\chi^2_{prueba} > \chi^2_{tabla}$ se concluye que el número de germinaciones de las semillas de frejol **no son independientes** del tipo de ambiente expuesto

TAREA DE INTERAPRENDIZAJE N° 24

- 1) ¿Cuál es la finalidad de la prueba Chi cuadrado?
- 2) ¿Qué es valor crítico?
- 3) Elabore un organizador gráfico sobre Prueba de significación de proporciones de k muestras

Resuelva los ejercicios y problemas de forma manual, empleando Excel, GeoGebra y el Winstats

4) Cada uno de los siguientes valores representa el tamaño de una tabla $r \cdot k$. Determine el número de grados de libertad y obtenga los valores críticos en los niveles 0,05 y 0,01

4.1) $3 \cdot 4$

6; 12,59; 16,81

4.2) $4 \cdot 3$

6; 12,59; 16,81

5) La siguiente tabla muestra las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas al lanzar un dado 60 veces. Contrastar la hipótesis de que el dado es bueno, con un nivel de significación de 0,05.

Cara del dado	1	2	3	4	5	6
Frecuencia observada	13	8	7	12	12	8
Frecuencia esperada	10	10	10	10	10	10

H_0 es aceptada, ya que $\chi^2_{prueba}(3,4)$ es menor que $\chi^2_{tabla}(11,07)$, por lo tanto, se concluye que todas las proporciones de la población son iguales, es decir, el dado es bueno.

6) Un fabricante de helados desea determinar cuál de los sabores es el más popular entre sus clientes. Una muestra de 200 clientes reveló lo siguiente:

Helados	Chocolate	Mora	Fresa	Coco
Frecuencia observada	62	55	45	38
Frecuencia esperada	50	50	50	50

¿Es razonable concluir que hay una diferencia en la proporción de clientes que gustan cada sabor? Use el 0,05 nivel de significación.

H_0 es aceptada, ya que $\chi^2_{prueba}(6,76)$ es menor que $\chi^2_{tabla}(7,81)$, por lo tanto, se concluye que no existe una diferencia en la proporción de clientes que gustan cada sabor.

7) En un estudio para determinar la preferencia por determinados sabores de helados en diferentes regiones del país, se recopilieron los siguientes datos:

Sabor del helado	Frecuencias observadas por región		
	Costa	Sierra	Amazonía
Vainilla	86	44	70
Chocolate	45	30	50
Fresa	34	6	10
Otros	85	20	20
Total	250	100	150

a) Plantee las hipótesis

b) Calcule la proporción muestral “p” de cada sabor del helado

Respuesta: $p_v = 0,4$; $p_{ch} = 0,25$; $p_f = 0,10$; $p_o = 0,25$

c) Calcule las frecuencias esperadas de cada sabor del helado en cada región

Respuesta:

Sabor del helado	Frecuencias esperadas por región		
	Costa	Sierra	Amazonía
Vainilla	100	40	60
Chocolate	62,5	25	37,5
Fresa	25	10	15
Otros	62,5	25	37,5

d) Determine si la preferencia por cierto sabor es independiente de la región (es la misma en cada región), utilizando el nivel de significación 0,05

H_0 no se acepta, ya que $\chi^2_{prueba}(37,87)$ es mayor que $\chi^2_{tabla}(12,592)$, por lo tanto, se concluye que la preferencia por cierto sabor no es independiente de la región.

8) Los estudiantes de un determinado curso de una universidad practican tres deportes, fútbol, básquet y natación. La siguiente tabla muestra el número de estudiantes, por sexo, que practican con mayor frecuencia uno de los tres deportes. Se utiliza la prueba Chi cuadrado con un nivel de significación del 1% para determinar si la elección del tipo de deporte de los estudiantes es independiente del sexo. Realice la prueba de hipótesis en forma manual, Empleando Excel y Winstats.

Deporte \ Sexo	Fútbol	Básquet	Natación
Hombre	4	3	3
Mujer	5	6	4

H_0 se acepta, ya que $\chi^2_{prueba} = 0,26$ es menor que $\chi^2_{tabla} = 9,21$, por lo tanto, se concluye la elección del tipo de deporte que practican los estudiantes de un determinado curso de la universidad es independiente del sexo de los estudiantes.

9) A los habitantes del barrio “La Florida” de la ciudad de Ibarra se les pregunta sobre la preferencia de tres tipos de flores. La siguiente tabla muestra el número de habitantes, por género, que les gusta con mayor frecuencia uno de los tres tipos de flores. Se emplea la prueba Chi cuadrado con un nivel de significación del 5% para determinar si la preferencia del tipo de flor es independiente del género. Realice la prueba de hipótesis en forma manual, Empleando GeoGebra y Winstats.

Flor \ Género	Rosas	Claveles	Girasoles
Masculino	35	37	28
Femenino	28	43	29

H_0 se acepta, ya que $\chi^2_{prueba} = 0,11$ es menor que $\chi^2_{tabla} = 5,99$, por lo tanto, se concluye la preferencia por el tipo de flor es independiente del género de los habitantes del barrio “La Florida”.

10) Plantee y resuelva un problema de aplicación de la prueba chi cuadrado en forma manual y empleando Excel, GeoGebra y Winstats.

11) Realice un experimento sobre cualquier tema de su preferencia en el que aplique la prueba chi cuadrado (el ejemplo ilustrativo presentado en este tema puede darle orientaciones para realizar el experimento). Presente resuelto en forma manual, Empleando GeoGebra y Winstats.

12) Consulte en la biblioteca o en el internet sobre la corrección de Yates (el autor es Frank Yates, matemático inglés 1902-1994) para calcular Chi cuadrado. Presente un problema resuelto empleando la corrección de Yates de forma manual , empleando Excel y Empleando GeoGebra.

D) BONDAD DE AJUSTE DE LA PRUEBA JI CUADRADO

La prueba χ^2 de bondad de ajuste es una variante de la prueba χ^2 . El cálculo del valor estadístico de prueba y su evaluación son muy semejantes en ambos casos, aunque existen unas cuantas excepciones. Entre las principales excepciones se encuentran la forma como se plantea H_0 y H_1 , cómo se calculan las frecuencias esperadas y cómo se determinan los grados de libertad. Se emplea para determinar la calidad del ajuste mediante distribuciones teóricas (como la distribución normal o la binomial) de distribuciones empíricas (o sea las obtenidas de los datos de la muestra)

En realidad, una prueba de bondad de ajuste es una prueba de una muestra, pero en la que la población se ha dividido en k proporciones. Así pues, difiere de una prueba de proporciones de una muestra, estudiada anteriormente, la cual incluye sólo dos categorías (éxito y fracaso) en la población.

Los grados de libertad para una prueba de bondad de ajuste son $(k-1) - c$, en donde

k = número de categorías o clases

c = número de valores estadísticos o parámetros utilizados de la muestra que se utilizan para determinar frecuencias esperadas (número de decimales de la frecuencia esperada)

Ejemplo ilustrativo

La siguiente tabla muestra las frecuencias observadas al lanzar un dado 100 veces. Contrastar la hipótesis de que el dado es bueno empleando la Bondad de Ajuste de la Prueba Ji Cuadrado, con un nivel de significación de 0,01.

Cara del dado	1	2	3	4	5	6
Frecuencia observada	18	13	17	22	12	18

Solución:

Las hipótesis son:

H_0 : Todas las proporciones de la población son iguales.

H_1 : No todas las proporciones de la población son iguales.

El nivel de significación es: $\alpha = 0,01$

Se calcula la frecuencia esperada e

$$e = p \cdot o_{total}$$

$$p = \text{proporción muestral} = \text{probabilidad} = \frac{1}{6}$$

$$o_{total} = \text{frecuencia total observada} = 100$$

Cada número del dado (categoría) tiene la misma probabilidad o frecuencia esperada

$$e = p \cdot o_{total} = \frac{1}{6} \cdot 100 = 16,67$$

Número del dado	1	2	3	4	5	6
Frecuencia observada	18	13	17	22	12	18
Frecuencia esperada	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67

Observando la tabla se tiene que:

$$k = 6; c = 2$$

Calculando los grados de libertad se tiene:

$$\text{Grados de libertad} = (k - 1) - c = (6 - 1) - 2 = 3$$


Con lectura en la tabla con 3 grados de libertad y 0,01 de área se obtiene $\chi^2_{tabla} = 11,345$

Calculando χ^2_{prueba} se obtiene:

$$\chi^2_{prueba} = \frac{(18 - 16,67)^2}{16,67} + \frac{(13 - 16,67)^2}{16,67} + \frac{(17 - 16,67)^2}{16,67} + \frac{(22 - 16,67)^2}{16,67} + \frac{(12 - 16,67)^2}{16,67} + \frac{(18 - 16,67)^2}{16,67}$$

$$\chi^2_{prueba} = 2,14$$

El gráfico elaborado empleando Winstats y Paint se muestra en la siguiente figura:



Decisión: H_0 es aceptada, ya que χ^2_{prueba} (2,14) es menor que χ^2_{tabla} (11,345), por lo tanto, se concluye que todas las proporciones de la población son iguales, es decir, el dado es bueno.

TAREA DE INTERAPRENDIZAJE N° 25

- 1) Elabore un organizador gráfico sobre Bondad de Ajuste de la Prueba Ji Cuadrado
- 2) Se pone a prueba un dado para verificar si está cargado o no (trucado o no), es decir, se quiere probar que H_0 : El dado no está cargado (es decir, las diferencias se deben únicamente a la variación casual en el muestreo); H_1 : El dado está cargado (es decir, que las categorías no son igualmente probables). Cabe esperar que la frecuencia de ocurrencias de cada uno de los seis posibles resultados (categorías) sean igualmente probables. Se lanza el dado 180 veces, con los siguientes resultados

Cara del dado	1	2	3	4	5	6
Frecuencia observada	20	35	25	35	32	33

2.1) Calcule las frecuencias esperadas

2.2) Calcule los grados de libertad

30

5

- 2.3) Calcule el valor estadístico de χ^2_{tabla} con un nivel de significación de 0,05 empleando la tabla y Empleando Excel. 11,07
- 2.4) Calcule el valor estadístico de χ^2_{prueba} con la fórmula y Empleando Excel 6,27
- 2.5) Elabore un gráfico empleando Winstats
- 2.6) Realice la comprobación de hipótesis
Se acepta H_0 , ya que $\chi^2_{prueba} (6,27)$ es menor que $\chi^2_{tabla}(11,07)$
- 3) Consulte en la biblioteca o en el internet un problema de aplicación de la Bondad de Ajuste de la Prueba Ji Cuadrado. Presente resuelto en forma manual, empleando Excel (para los cálculos) y Winstats (para la gráfica)
- 4) Consulte en la biblioteca o en el internet sobre las aplicaciones de la Bondad de Ajuste de la Prueba Ji Cuadrado. Presente la consulte a través de un organizador gráfico.

CAPÍTULO V

APLICACIONES DE GRÁFICAS ESTADÍSTICAS EN EL CONTROL DE LA CALIDAD

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL CAPÍTULO

Al finalizar el presente capítulo el lector podrá evidenciar que:

- ✓ Interpreta las definiciones, características, propiedades y aplicaciones de las gráficas de control de la calidad.
- ✓ Aplica algoritmos relativos a las gráficas de control de la calidad en la resolución de ejercicios y problemas prácticos de manera manual, empleando Excel y Graph.
- ✓ Plantea y resuelve ejercicios de aplicación sobre las gráficas de control de la calidad de manera manual, utilizando Excel y Graph.

CONTENIDOS

- ✓ Introducción
- ✓ Gráficas de control para variables: Gráficas R y \bar{X}
- ✓ Gráficas de control para atributos: Gráficas p y c

5.1) INTRODUCCIÓN

Las gráficas de control permiten monitorear la variación en una característica del producto o servicio a lo largo del tiempo. Las gráficas de control se utilizan para estudiar el desempeño pasado, para evaluar las condiciones presentes, o para predecir los resultados futuros. La información obtenida al analizar una gráfica de control constituye la base para el proceso de mejoramiento.

Para construir una gráfica de control se recolectan muestras de las salidas de un proceso a lo largo del tiempo. Los estadísticos utilizados comúnmente incluyen la fracción disconforme y la media y el rango de una variable numérica. Entonces se grafican los valores contra el tiempo y se agregan los límites de control a la gráfica. La forma más común de gráfica de control establece límites de control que están dentro de ± 3 desviaciones estándar de la medida estadística de interés.

5.2) GRÁFICAS DE CONTROL PARA VARIABLES

Estas gráficas de control ayudan a la detección de la variación de causa asignable (variación en el producto o proceso de producción que señala que el proceso está fuera de control y que se requieren medidas correctivas)

A) La Gráfica R

Mide la variación en el rango de las muestras. Aunque la desviación estándar es una medida que depende de la dispersión, las técnicas de control de calidad generalmente confían en el rango como un indicio de la variabilidad del proceso.

Límite superior de control para el rango

$$LSC_R = \bar{R} + 3s_R$$

Límite inferior de control para el rango

$$LIC_R = \bar{R} - 3s_R$$

Donde s_R es la desviación estándar en los rangos muestrales. Sin embargo, en la práctica, es más simple de utilizar

Límite superior de control para el rango

$$LSC_R = D_4 \bar{R}$$

Límite inferior de control para el rango

$$LIC_R = D_3 \bar{R}$$

Los valores D_4 y D_3 se toman de la tabla de factores críticos de las gráficas o cartas de control de acuerdo al tamaño n de la muestra y el rango promedio de los rangos muestrales $\bar{R} = \frac{\Sigma R}{k}$, siendo k = número de muestras

B) La Gráfica \bar{X}

Se diseña para medir la variación en las medias muestrales alrededor de algún nivel generalmente aceptado.

Límite superior de control para el rango

$$LSC_{\bar{X}} = \bar{\bar{X}} + 3\sigma_{\bar{X}}$$

Límite inferior de control para el rango

$$LIC_{\bar{X}} = \bar{\bar{X}} - 3\sigma_{\bar{X}}$$

Donde $\sigma_{\bar{X}}$ es la desviación estándar para las medias. Sin embargo, en la práctica, se estima $3\sigma_{\bar{X}}$ como $A_2 \bar{R}$, en donde \bar{R} es el rango promedio de los rangos muestrales, y A_2 es una constante basada en el tamaño de la muestra. Los valores de A_2 se hallan en la tabla de factores críticos de las gráficas o cartas de control. Utilizando $A_2 \bar{R}$ en lugar de $3\sigma_{\bar{X}}$ produce resultados similares y es considerablemente más fácil de calcular. Se tiene entonces:

Límite superior de control para las medias

$$LSC_{\bar{X}} = \bar{\bar{X}} + A_2\bar{R}$$

Límite inferior de control para las medias

$$LIC_{\bar{X}} = \bar{\bar{X}} - A_2\bar{R}$$

Donde:

$$\bar{\bar{X}} = \frac{\Sigma \bar{X}}{k}$$

Siendo k = número de muestras

TABLA					
Factores críticos de las gráficas o cartas de control					
n	Gráfica para medias	Gráfica para rangos			
	Factor para el límite de control $A_2 = 3/(d_2\sqrt{n})$	Factor para la recta central d_2	Factores de los límites de control $D_3 = 1-3(d_3/d_2)$ $D_4 = 1+3(d_3/d_2)$ d_3		
2	1,881	1,128	-1,267=0	3,267	0,8525
3	1,023	1,693	-0,574=0	2,574	0,8884
4	0,729	2,059	-0,282=0	2,282	0,8798
5	0,577	2,326	-0,114=0	2,114	0,8641
6	0,483	2,534	-0,004=0	2,004	0,8480
7	0,419	2,704	0,076	1,924	0,8330
8	0,373	2,847	0,136	1,864	0,8200
9	0,337	2,970	0,184	1,816	0,8080
10	0,308	3,078	0,223	1,777	0,7970
11	0,285	3,173	0,256	1,744	0,7870
12	0,266	3,258	0,284	1,716	0,7780
13	0,249	3,336	0,308	1,692	0,7700
14	0,235	3,407	0,329	1,671	0,7620
15	0,223	3,472	0,348	1,652	0,7550
16	0,212	3,532	0,364	1,636	0,7490
17	0,203	3,588	0,379	1,621	0,7430
18	0,194	3,640	0,392	1,608	0,7380
19	0,187	3,689	0,404	1,596	0,7330
20	0,180	3,735	0,414	1,586	0,7290
21	0,173	3,778	0,425	1,575	0,7240
22	0,167	3,819	0,434	1,566	0,7200
23	0,162	3,858	0,443	1,557	0,7160
24	0,157	3,895	0,452	1,548	0,7120
25	0,153	3,931	0,459	1,541	0,7090

Fuente: Webster, Allen, (2000), *Estadística Aplicada a los Negocios y a la Economía*, Ed. McGraw Hill.

Ejemplo ilustrativo

Una fábrica elabora planchas de madera para tapas de mesas, las cuales deben cumplir ciertas especificaciones de tamaño. Para garantizar que se cumplan estos estándares de calidad, se recolecta $K=24$ muestras (subgrupos) de tamaño $n=6$, y mide su largo. Los resultados aparecen en la siguiente tabla:

Nº de muestra	Medias muestrales					
1	14,5	15,9	15,7	16,3	14,5	16,2
2	15,4	15,2	15,9	15,2	14,5	14,5
3	16,5	15,9	14,8	16,2	16,5	16,2
4	14,8	16,8	15,5	15,2	15,2	14,2
5	15,7	14,5	16,9	14,2	14,5	15,2
6	15,9	15,4	17,1	14,8	16,8	14,8
7	15,2	14,2	18,5	15,8	15,9	15,7
8	14,5	14,8	17,2	16,2	15,0	16,8
9	15,6	15,7	19,2	16,1	16,8	15,9
10	16,5	16,8	18,4	14,8	18,9	16,1
11	14,5	15,8	14,2	14,5	18,7	16,3
12	17,1	15,8	16,2	15,4	15,7	16,2
13	18,5	15,9	17,2	14,2	15,9	14,7
14	17,2	15,7	16,8	14,8	14,8	14,9
15	19,2	15,7	15,9	15,7	15,5	14,8
16	18,4	16,8	15,0	16,8	16,9	14,7
17	14,2	16,9	16,8	15,8	17,1	15,4
18	16,2	17,2	18,9	15,8	18,5	18,9
19	17,2	17,6	18,7	15,9	17,2	16,0
20	16,8	14,5	19,8	15,7	18,2	18,7
21	15,9	17,9	18,7	15,7	18,4	17,5
22	15,0	18,0	18,2	16,8	14,2	17,8
23	16,8	18,9	20,0	16,9	16,2	18,5
24	18,9	17,9	17,4	17,5	17,2	16,5

- Calcular el rango promedio
- Calcular el límite superior de control para el rango
- Calcular el límite inferior de control para el rango
- Elaborar la gráfica R.
- Calcular $\bar{\bar{X}}$
- Calcular el límite superior de control para las medias
- Calcular el límite inferior de control para las medias
- Elaborar la gráfica \bar{X} .

Solución:

Calculando manualmente el rango se obtiene:

Recuerde que el rango es igual al valor mayor menos el valor menor, es decir:

$$R = X_{\text{máxima}} - X_{\text{mínima}}$$

Nº de muestra	Medias muestrales						R
1	14,5	15,9	15,7	16,3	14,5	16,2	1,8
2	15,4	15,2	15,9	15,2	14,5	14,5	1,4
3	16,5	15,9	14,8	16,2	16,5	16,2	1,7
4	14,8	16,8	15,5	15,2	15,2	14,2	2,6
5	15,7	14,5	16,9	14,2	14,5	15,2	2,7
6	15,9	15,4	17,1	14,8	16,8	14,8	2,3
7	15,2	14,2	18,5	15,8	15,9	15,7	4,3
8	14,5	14,8	17,2	16,2	15,0	16,8	2,7
9	15,6	15,7	19,2	16,1	16,8	15,9	3,6
10	16,5	16,8	18,4	14,8	18,9	16,1	4,1
11	14,5	15,8	14,2	14,5	18,7	16,3	4,5
12	17,1	15,8	16,2	15,4	15,7	16,2	1,7
13	18,5	15,9	17,2	14,2	15,9	14,7	4,3
14	17,2	15,7	16,8	14,8	14,8	14,9	2,4
15	19,2	15,7	15,9	15,7	15,5	14,8	4,4
16	18,4	16,8	15,0	16,8	16,9	14,7	3,7
17	14,2	16,9	16,8	15,8	17,1	15,4	2,9
18	16,2	17,2	18,9	15,8	18,5	18,9	3,1
19	17,2	17,6	18,7	15,9	17,2	16,0	2,8
20	16,8	14,5	19,8	15,7	18,2	18,7	5,3
21	15,9	17,9	18,7	15,7	18,4	17,5	3,0
22	15,0	18,0	18,2	16,8	14,2	17,8	4,0
23	16,8	18,9	20,0	16,9	16,2	18,5	3,8
24	18,9	17,9	17,4	17,5	17,2	16,5	2,4
Total							75,5

a) Calculando el rango promedio se tiene:

$$\bar{R} = \frac{\Sigma R}{k} = \frac{75,5}{24} = 3,146$$

b) Calcular el límite superior de control para el rango

Con lectura en la tabla para $n = 6$ se obtiene $D_4 = 2,004$

Calculando el límite superior se obtiene:

$$LSC_R = D_4 \bar{R} = 2,004 \cdot 3,146 = 6,3$$


c) Calcular el límite inferior de control para el rango

Con lectura en la tabla para $n = 6$ se obtiene $D_3 = 0$


Calculando el límite inferior se obtiene:

$$LIC_R = D_3 \bar{R} = 0 \cdot 3,146 = 0$$

d) Elaborando la gráfica R en Graph se obtiene:




Elaborando la gráfica en Minitab se tiene




Interpretación: Observando la gráfica se concluye que la misma está bajo control, ya que no existen variaciones de causa asignable, es decir, no existe ningún punto que se salga de los límites de control.

Para elaborar la gráfica R en Minitab se procede de la siguiente manera

Ingresa al programa



Copie los datos



Clic en Estadísticas, Gráficas de control, Gráficas de variables para subgrupos, R

Hoja de trabajo actual: Hoja de trabajo 1


	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19	C20
1	14,5	15,9	15,7	16,3	14,5	16,2														
2	15,4	15,2	15,9	15,2	14,5	14,5														
3	16,5	15,9	14,8	16,2	16,5	16,2														
4	14,8	16,8	15,5	15,2	15,2	14,2														
5	15,7	14,5	16,9	14,2	14,5	15,2														
6	15,9	15,4	17,1	14,8	16,8	14,8														
7	15,2	14,2	18,5	15,8	15,9	15,7														
8	14,5	14,8	17,2	16,2	15,0	16,8														
9	15,6	15,7	19,2	16,1	16,8	15,9														

Clic en R


Hoja de trabajo actual: Hoja de trabajo 1

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19	C20
1	14,5	15,9	15,7	16,3	14,5	16,2														
2	15,4	15,2	15,9	15,2	14,5	14,5														
3	16,5	15,9	14,8	16,2	16,5	16,2														
4	14,8	16,8	15,5	15,2	15,2	14,2														
5	15,7	14,5	16,9	14,2	14,5	15,2														
6	15,9	15,4	17,1	14,8	16,8	14,8														
7	15,2	14,2	18,5	15,8	15,9	15,7														
8	14,5	14,8	17,2	16,2	15,0	16,8														
9	15,6	15,7	19,2	16,1	16,8	15,9														

En la venta de Gráfica R, escoja Las observaciones para un subgrupo están en una fila de columnas



Enter



Clic en C1-Seleccionar y así continuar seleccionando C2, C3, C4, C5, C6

15/03/2017 22:00:41

Bienvenido a Minitab, presione F1 para obtener ayuda

Gráfica R

Las observaciones para un subgrupo están en una fila de columnas:

C1 C2 C3 C4 C5 C6

Escala... Etiquetas... Múltiples gráficas... Opciones de datos... Opciones de R...

Seleccionar Ayuda Aceptar Cancelar

	C1	C2	C3	C4	C5
1	14,5	15,9	15,7	16,3	14,5
2	15,4	15,2	15,9	15,2	14,5
3	16,5	15,9	14,8	16,2	16,5
4	14,8	16,8	15,5	15,2	15,2
5	15,7	14,5	16,9	14,2	14,5
6	15,9	15,4	17,1	14,8	16,8
7	15,2	14,2	18,5	15,8	15,9
8	14,5	14,8	17,2	16,2	15,0
9	15,6	15,7	19,2	16,1	16,8

Hoja de trabajo actual: Hoja de trabajo 1

Clic en Aceptar

Gráfica R de C1; ...; C6

Rango de la muestra

Muestra

LCS=6,304

$\bar{R}=3,146$

LCL=0

	C1	C2	C3	C4	C5
4	14,8	16,8	15,5	15,2	15,2
5	15,7	14,5	16,9	14,2	14,5
6	15,9	15,4	17,1	14,8	16,8
7	15,2	14,2	18,5	15,8	15,9
8	14,5	14,8	17,2	16,2	15,0
9	15,6	15,7	19,2	16,1	16,8

Hoja de trabajo actual: Hoja de trabajo 1

e) Calculando \bar{x} se obtiene:

N° de muestra	Medias muestrales						\bar{X}
1	14,5	15,9	15,7	16,3	14,5	16,2	15,52
2	15,4	15,2	15,9	15,2	14,5	14,5	15,12
3	16,5	15,9	14,8	16,2	16,5	16,2	16,02
4	14,8	16,8	15,5	15,2	15,2	14,2	15,28
5	15,7	14,5	16,9	14,2	14,5	15,2	15,17
6	15,9	15,4	17,1	14,8	16,8	14,8	15,80
7	15,2	14,2	18,5	15,8	15,9	15,7	15,88
8	14,5	14,8	17,2	16,2	15,0	16,8	15,75
9	15,6	15,7	19,2	16,1	16,8	15,9	16,55
10	16,5	16,8	18,4	14,8	18,9	16,1	16,92
11	14,5	15,8	14,2	14,5	18,7	16,3	15,67
12	17,1	15,8	16,2	15,4	15,7	16,2	16,07
13	18,5	15,9	17,2	14,2	15,9	14,7	16,07
14	17,2	15,7	16,8	14,8	14,8	14,9	15,70
15	19,2	15,7	15,9	15,7	15,5	14,8	16,13
16	18,4	16,8	15,0	16,8	16,9	14,7	16,43
17	14,2	16,9	16,8	15,8	17,1	15,4	16,03
18	16,2	17,2	18,9	15,8	18,5	18,9	17,58
19	17,2	17,6	18,7	15,9	17,2	16,0	17,10
20	16,8	14,5	19,8	15,7	18,2	18,7	17,28
21	15,9	17,9	18,7	15,7	18,4	17,5	17,35
22	15,0	18,0	18,2	16,8	14,2	17,8	16,67
23	16,8	18,9	20,0	16,9	16,2	18,5	17,88
24	18,9	17,9	17,4	17,5	17,2	16,5	17,57
Total							391,53

Calculando $\bar{\bar{X}}$ se obtiene:

$$\bar{\bar{X}} = \frac{\Sigma \bar{X}}{k} = \frac{391,53}{24} = 16,314$$

f) Con lectura en la tabla para $n = 6$ se obtiene $A_2 = 0,483$


Calculando el límite superior se obtiene:

$$LSC_{\bar{X}} = \bar{\bar{X}} + A_2 \bar{R} = 16,314 + 0,483 \cdot 3,146 = 17,83$$

g) Calculando el límite inferior se obtiene:

$$LIC_{\bar{X}} = \bar{\bar{X}} - A_2 \bar{R} = 16,314 - 0,483 \cdot 3,146 = 14,79$$

h) La gráfica \bar{X} elaborada con Minitab es




Interpretación: Observando la gráfica se concluye que la misma está fuera de control, ya que, la muestra 23 representa una variación de causa asignable, es decir, la muestra 23 se sale del límite superior de control.

Los cálculos empleando Excel se muestran en la siguiente figura:


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	N° Muestra:k			Medias muestrales:n				R			\bar{x}			
2	1	14,5	15,9	15,7	16,3	14,5	16,2	1,8	=MAX(B2:G2)-MIN(B2:G2)	15,5	=PROMEDIO(B2:G2)			
3	2	15,4	15,2	15,9	15,2	14,5	14,5	1,4	=MAX(B3:G3)-MIN(B3:G3)	15,1	=PROMEDIO(B3:G3)			
4	3	16,5	15,9	14,8	16,2	16,5	16,2	1,7	=MAX(B4:G4)-MIN(B4:G4)	16,0	=PROMEDIO(B4:G4)			
5	4	14,8	16,8	15,5	15,2	15,2	14,2	2,6	=MAX(B5:G5)-MIN(B5:G5)	15,3	=PROMEDIO(B5:G5)			
6	5	15,7	14,5	16,9	14,2	14,5	15,2	2,7	=MAX(B6:G6)-MIN(B6:G6)	15,2	=PROMEDIO(B6:G6)			
7	6	15,9	15,4	17,1	14,8	16,8	14,8	2,3	=MAX(B7:G7)-MIN(B7:G7)	15,8	=PROMEDIO(B7:G7)			
8	7	15,2	14,2	18,5	15,8	15,9	15,7	4,3	=MAX(B8:G8)-MIN(B8:G8)	15,9	=PROMEDIO(B8:G8)			
9	8	14,5	14,8	17,2	16,2	15,0	16,8	2,7	=MAX(B9:G9)-MIN(B9:G9)	15,8	=PROMEDIO(B9:G9)			
10	9	15,6	15,7	19,2	16,1	16,8	15,9	3,6	=MAX(B10:G10)-MIN(B10:G10)	16,6	=PROMEDIO(B10:G10)			
11	10	16,5	16,8	18,4	14,8	18,9	16,1	4,1	=MAX(B11:G11)-MIN(B11:G11)	16,9	=PROMEDIO(B11:G11)			
12	11	14,5	15,8	14,2	14,5	18,7	16,3	4,5	=MAX(B12:G12)-MIN(B12:G12)	15,7	=PROMEDIO(B12:G12)			
13	12	17,1	15,8	16,2	15,4	15,7	16,2	1,7	=MAX(B13:G13)-MIN(B13:G13)	16,1	=PROMEDIO(B13:G13)			
14	13	18,5	15,9	17,2	14,2	15,9	14,7	4,3	=MAX(B14:G14)-MIN(B14:G14)	16,1	=PROMEDIO(B14:G14)			
15	14	17,2	15,7	16,8	14,8	14,8	14,9	2,4	=MAX(B15:G15)-MIN(B15:G15)	15,7	=PROMEDIO(B15:G15)			
16	15	19,2	15,7	15,9	15,7	15,5	14,8	4,4	=MAX(B16:G16)-MIN(B16:G16)	16,1	=PROMEDIO(B16:G16)			
17	16	18,4	16,8	15,0	16,8	16,9	14,7	3,7	=MAX(B17:G17)-MIN(B17:G17)	16,4	=PROMEDIO(B17:G17)			
18	17	14,2	16,9	16,8	15,8	17,1	15,4	2,9	=MAX(B18:G18)-MIN(B18:G18)	16,0	=PROMEDIO(B18:G18)			
19	18	16,2	17,2	18,9	15,8	18,5	18,9	3,1	=MAX(B19:G19)-MIN(B19:G19)	17,6	=PROMEDIO(B19:G19)			
20	19	17,2	17,6	18,7	15,9	17,2	16,0	2,8	=MAX(B20:G20)-MIN(B20:G20)	17,1	=PROMEDIO(B20:G20)			
21	20	16,8	14,5	19,8	15,7	18,2	18,7	5,3	=MAX(B21:G21)-MIN(B21:G21)	17,3	=PROMEDIO(B21:G21)			
22	21	15,9	17,9	18,7	15,7	18,4	17,5	3,0	=MAX(B22:G22)-MIN(B22:G22)	17,4	=PROMEDIO(B22:G22)			
23	22	15,0	18,0	18,2	16,8	14,2	17,8	4,0	=MAX(B23:G23)-MIN(B23:G23)	16,7	=PROMEDIO(B23:G23)			
24	23	16,8	18,9	20,0	16,9	16,2	18,5	3,8	=MAX(B24:G24)-MIN(B24:G24)	17,9	=PROMEDIO(B24:G24)			
25	24	18,9	17,9	17,4	17,5	17,2	16,5	2,4	=MAX(B25:G25)-MIN(B25:G25)	17,6	=PROMEDIO(B25:G25)			
26								\bar{R}	3,146	=PROMEDIO(H2:H25)	\bar{x}	16,314	=PROMEDIO(J2:J25)	
27								n	6	=CONTAR(B2:G2)				
28								D_3	0		A_2	0,483		
29								D_4	2,004					
30								Limite superior	6,30425	=H29*H26	Limite Superior	17,83	=J26+J28*H26	
31								Limite inferior	0	=H28*H26	Limite inferior	14,79	=J26-J28*t	

Para elaborar la gráfica \bar{X} en Minitab se procede de la siguiente manera

Ingresa al programa



Copie los datos



Clic en Estadísticas, Gráficas de variables para subgrupos, Xbarra

Hoja de trabajo actual: Hoja de trabajo 1


	C1	C2	C3	C4	C5	C6
1	14,5	15,9	15,7	16,3	14,5	16,2
2	15,4	15,2	15,9	15,2	14,5	14,5
3	16,5	15,9	14,8	16,2	16,5	16,2
4	14,8	16,8	15,5	15,2	15,2	14,2
5	15,7	14,5	16,9	14,2	14,5	15,2
6	15,9	15,4	17,1	14,8	16,8	14,8
7	15,2	14,2	18,5	15,8	15,9	15,7
8	14,5	14,8	17,2	16,2	15,0	16,8
9	15,6	15,7	19,2	16,1	16,8	15,9

En la ventana Gráfica Xbarra seleccione: Las observaciones para un grupo están en una fila de columnas


Hoja de trabajo actual: Hoja de trabajo 1

	C1	C2	C3	C4	C5
1	14,5	15,9	15,7	16,3	14,5
2	15,4	15,2	15,9	15,2	14,5
3	16,5	15,9	14,8	16,2	16,5
4	14,8	16,8	15,5	15,2	15,2
5	15,7	14,5	16,9	14,2	14,5
6	15,9	15,4	17,1	14,8	16,8
7	15,2	14,2	18,5	15,8	15,9
8	14,5	14,8	17,2	16,2	15,0
9	15,6	15,7	19,2	16,1	16,8

Enter. Clic en C1-Seleccionar y así continuar seleccionando C2, C3, C4, C5, C6



Clic en Aceptar



TAREA DE INTERAPRENDIZAJE N° 26

- 1) Consulte en la biblioteca o en el internet sobre la administración o control de la calidad total y realice un organizador gráfico de la misma.
- 2) Consulte en la biblioteca o en el internet sobre la administración seis sigma y realice un organizador gráfico de la misma.

3) Consulte en la biblioteca o en el internet para contestar lo siguiente:

- ¿El control de la calidad tiene impacto en nuestro trabajo diario y en nuestras vidas personales?
- Escriba una semejanza y una diferencia entre causas especiales de variación y causas comunes de variación
- ¿Cuál es la importancia de las gráficas de control de la calidad y cuál es su proceso de construcción?
- ¿Qué es un límite de control?
- ¿En qué situación se dice que un proceso está fuera de control?. Ilustre su respuesta con una gráfica de control
- ¿En qué situación se dice que un proceso está bajo control?. Ilustre su respuesta con una gráfica de control
- ¿Cuáles son los dos tipos de errores que las gráficas de control nos ayudab a prevenir?
- ¿Qué es variación de causa asignable?

4) Realice un organizador gráfico de las Gráficas para la Media

5) Realice un organizador gráfico de las Gráficas para el Rango

Resuelva los siguiente ejercicios de forma manual, empleando Excel (para los cálculos), Graph y Mininatb (para la gráficas)

6) Una fábrica produce estructuras para computadores de mesa, los cuales deben cumplir ciertas especificaciones de tamaño. Para garantizar que se cumplan estos estándares de calidad, el gerente de la fábrica, recolecta $K=24$ muestras (subgrupos) de tamaño $n=6$, y mide su ancho. Los resultados aparecen en la siguiente tabla

Nº Muestra	Medias muestrales					
1	15,2	14,5	15,4	16,5	15,9	16,2
2	16,2	15,4	15,9	15,2	15,2	14,5
3	15,6	16,5	15,9	16,2	15,9	16,2
4	18,5	14,8	15,7	15,2	16,8	14,2
5	17,5	15,7	14,5	14,2	14,5	15,2
6	14,3	15,9	16,5	14,8	15,4	14,8
7	15,4	15,2	15,4	15,8	14,2	15,7
8	18,0	14,5	14,4	16,2	14,8	16,8
9	14,2	15,6	14,5	16,1	15,7	15,9
10	15,7	16,5	14,5	14,8	16,8	16,1
11	14,8	14,5	16,5	14,9	15,8	16,3
12	16,8	15,8	15,2	15,8	15,7	16,2
13	15,2	15,9	14,5	15,1	15,9	14,7
14	15,4	15,7	16,8	15,3	14,8	14,9
15	18,4	15,7	15,9	14,8	15,5	14,8
16	16,5	16,8	15,0	15,7	16,9	14,7
17	15,2	16,9	16,8	17,0	17,1	15,4
18	16,8	17,2	18,9	18,5	18,5	18,9
19	13,5	17,6	18,7	21,1	17,2	16,0
20	19,8	14,5	20,8	19,2	19,2	18,7
21	18,7	17,9	18,7	20,8	18,4	17,5
22	17,5	18,0	18,2	20,2	14,2	17,8
23	14,9	18,9	20,0	16,8	16,2	18,5
24	18,7	17,9	17,4	18,7	17,2	16,5

a) Calcule el rango promedio

2,9625

b) Calcule el límite superior de control para el rango

5,936

c) Calcule el límite inferior de control para el rango

d) Realice la gráfica R.

e) ¿El proceso está bajo control?. ¿Por qué?

7) Empleando los datos de la tabla del anterior ejercicio

a) Calcule $\bar{\bar{X}}$

16,3194

b) Calcule el límite superior de control para las medias

17,75

c) Calcule el límite inferior de control para las medias

14,89

d) Realice la gráfica \bar{X} .

e) ¿El proceso está bajo control?. ¿Por qué?

8) Plantee y resuelva un ejercicio aplicación de la gráfica R y de la gráfica \bar{X}

5.3) GRÁFICAS DE CONTROL PARA ATRIBUTOS

A) Gráfica de control para la proporción de artículos disconformes: la gráfica p

Se utilizan diferentes tipos de gráficas de control para monitorear procesos y para determinar si se encuentra presente en el proceso alguna causa especial de variación. Las gráficas de atributos se utilizan para variables categóricas o discretas. En esta sección se estudiará la gráfica p, que se utiliza cuando los elementos que son muestreados se clasifican de acuerdo a si se conforman o no con los requerimientos definidos operacionalmente. Por lo tanto, la gráfica p nos ayuda a monitorear y analizar la proporción de elementos disconformes que están en las muestras repetidas (es decir, subgrupos) que se seleccionan de un proceso.

Para iniciar la explicación de las gráficas p, recuerde que la proporción de muestra se define como

$$p = \frac{X}{n}, \text{ y la desviación estándar como } \sigma_p = \sqrt{\frac{\pi(1-\pi)}{n}}$$

Los límites de control para la gráfica p son:

$$\bar{p} \pm 3 \cdot \sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{\bar{n}}}$$
$$LCS = \bar{p} + 3 \sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{\bar{n}}}$$
$$LCI = \bar{p} - 3 \sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{\bar{n}}}$$

Para igual n_i

$$\bar{n} = n_i \text{ y } \bar{p} = \frac{\sum p_i}{k}$$

O en general,

$$\bar{n} = \frac{\sum n_i}{k} \text{ y } \bar{p} = \frac{\sum X_i}{\sum n_i}$$

Donde:

X_i = número de elementos disconformes en el subgrupo i

n_i = tamaño de muestra (o subgrupo) para el subgrupo i

$p_i = \frac{X_i}{n_i}$ = proporción de elementos disconformes en el subgrupo i

k = número de subgrupos seleccionados

\bar{n} = tamaño promedio del subgrupo

\bar{p} = proporción estimada de elementos disconformes

Cualquier valor negativo para el límite de control inferior significa que el límite de control inferior no existe.

Otros casos de Gráficas p

En la construcción de las gráficas p simplemente se toma nota de la proporción de artículos defectuosos en una muestra. Esta proporción, p es

$$p = \frac{\text{Número de defectos en una muestra}}{\text{Tamaño de la muestra}} = \frac{X}{n}$$

Si se toman varias muestras, produciendo varios valores para p . La proporción media de defectos para estas varias muestras, \bar{p} se calcula de la siguiente manera

$$\bar{p} = \frac{\text{Número total de defectos en todas las muestras}}{\text{Tamaño total de todos los artículos inspeccionados}}$$

La desviación estándar para la proporción de defectos es:

$$\sigma_p = \sqrt{\frac{\pi(1-\pi)}{n}}$$

La desviación estándar para la proporción de defectos cuando σ es desconocida es:

$$S_p = \sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}}$$

El límite superior de control para las proporciones es:

$$LSC = \bar{p} + 3S_p = \bar{p} + 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}}$$

El límite inferior de control para las proporciones es:

$$LIC = \bar{p} - 3S_p = \bar{p} - 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}}$$

Ejemplo ilustrativo

Durante la fase de análisis del modelo Seis Sigma DMAIC, se recolectaron los datos de las disconformidades diariamente de una muestra de 200 habitantes de un hotel. La siguiente tabla lista el número y proporción de habitaciones disconformes para cada día durante un periodo de 4 semanas

Día	Habitaciones estudiadas (n)	Habitaciones no preparadas (X)	Proporción (X/n)
1	200	16	0,08
2	200	7	0,035
3	200	21	0,105
4	200	17	0,085
5	200	25	0,125
6	200	19	0,095
7	200	16	0,08
8	200	15	0,075
9	200	11	0,055
10	200	12	0,06
11	200	22	0,11
12	200	20	0,1
13	200	17	0,085
14	200	26	0,13
15	200	18	0,09
16	200	13	0,065
17	200	15	0,075
18	200	10	0,05
19	200	14	0,07
20	200	25	0,125
21	200	19	0,095
22	200	12	0,06
23	200	6	0,03
24	200	12	0,06
25	200	18	0,09
26	200	15	0,075
27	200	20	0,1
28	200	22	0,11
Total	5600	463	2,315

Para estos datos, $k = 28$; $\sum p_i = 2,315$; $\bar{n} = n = 200$; $\bar{p} = \frac{\sum p_i}{k} = \frac{2,315}{28} = 0,0827$

Remplazando valores en

$$\bar{p} \pm 3 \cdot \sqrt{\frac{\bar{p}(1 - \bar{p})}{\bar{n}}}$$

Se obtiene:


$$0,0827 \pm 3 \cdot \sqrt{\frac{0,0827(1 - 0,0827)}{200}}$$

Entonces

$$\text{LSC} = 0,0827 + 0,0584 = 0,1411$$

$$\text{LIC} = 0,0827 - 0,0584 = 0,0243$$

La siguiente figura realizada en el programa Minitab representa la gráfica de Control p para cuartos que no están listos




Interpretación: Se observa que la proporción de disconformidades es mayor en el día N° 14 y menor en el día N° 23

No hay causas especiales de variación, ya que las proporciones están dentro de los límites de control

Para realizar la gráfica p en Minitab se procede de la siguiente manera

Ingresa los datos en el programa



Clic en Estadísticas, Gráficas de atributos, P

Hoja de trabajo actual: Hoja de trabajo 1

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19	C20	
1	200	16																			
2	200	7																			
3	200	21																			
4	200	17																			
5	200	25																			
6	200	19																			
7	200	16																			
8	200	15																			
9	200	11																			

Clic en P

Hoja de trabajo actual: Hoja de trabajo 1

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19	C20	
1	200	16																			
2	200	7																			
3	200	21																			
4	200	17																			
5	200	25																			
6	200	19																			
7	200	16																			
8	200	15																			
9	200	11																			

En la casilla variables, seleccionar C2. En la casilla Tamaños de los subgrupos, seleccionar C1

Minitab - Sin título

Archivo Editar Datos Calc Estadísticas Gráfica Editor Herramientas Ventana Ayuda Asistente

Sesión

15/03/2017 22:40:32

Bienvenido a Minitab, presione F1 para obtener ayuda

Gráfica P

Variables: C2

Tamaños de los subgrupos: C1
(ingresar un número o columna que contenga los tamaños)

Escala... Etiquetas... Múltiples gráficas... Opciones de gráficos... Opciones de Gráfica P...

Seleccionar Ayuda Aceptar Cancelar

	C1	C2	C3	C4	C5
1	200	16			
2	200	7			
3	200	21			
4	200	17			
5	200	25			
6	200	19			
7	200	16			
8	200	15			
9	200	11			

Hoja de trabajo actual: Hoja de trabajo 1

Clic en Aceptar

Minitab - Sin título

Archivo Editar Datos Calc Estadísticas Gráfica Editor Herramientas Ventana Ayuda Asistente

Sesión

Gráfica P de C2

Gráfica P de C2

Proporción

Muestra

LCS=0,1411

$\bar{P}=0,0827$

LCI=0,0243

	C1	C2	C3	C4	C5
4	200	17			
5	200	25			
6	200	19			
7	200	16			
8	200	15			
9	200	11			

Hoja de trabajo actual: Hoja de trabajo 1

TAREA DE INTERAPRENDIZAJE N° 27

1) Los siguientes datos fueron recolectados de disconformidades durante un periodo de 10 días

Día	Tamaño de la muestra	Disconformidades
1	100	10
2	100	11
3	100	13
4	100	14
5	100	15
6	100	17
7	100	9
8	100	14
9	100	13
10	100	12

1.1) ¿En qué día la proporción de disconformidades es mayor?. ¿Y menor?

Día 6, Día 7

1.2) ¿Cuáles son los límites de control inferior y superior?

0,0278 y 0,2282

1.3) ¿Hay algunas causas especiales de variación?

No, las proporciones están dentro de los límites de control

1.4) Realice la gráfica p en forma manual y con Graph

2) Los siguientes datos fueron recolectados de disconformidades durante un periodo de 10 días

Día	Tamaño de la muestra	Disconformidades
1	111	12
2	93	14
3	105	10
4	92	18
5	117	22
6	88	14
7	117	15
8	87	13
9	119	14
10	107	16

2.1) ¿En qué día la proporción de disconformidades es mayor?. ¿Y menor?

Día 4, Día 3

2.2) ¿Cuáles son los límites de control inferior y superior?

0,0397 y 0,2460

2.3) ¿Hay algunas causas especiales de variación?

No, las proporciones están dentro de los límites de control

2.4) Realice la gráfica p en forma manual y con Minitab

3) Una fábrica de instrumentos musicales realiza un procedimiento de control de calidad para detectar los defectos en un modelo de guitarras, para lo cual selecciona 15 muestras de tamaño 40. El número de defectos en cada muestra se indica en la siguiente tabla

Muestra	Número de defectos
1	10
2	12
3	9
4	15
5	27
6	8
7	11
8	11
9	13
10	15
11	17
12	3
13	25
14	18
15	17

- 3.1) Calcular el número total de defectos en todas las muestras 211
- 3.2) Calcular el tamaño total de todos los artículos inspeccionados 600
- 3.3) Calcular \bar{p} 0,3517
- 3.4) Calcular el límite superior de control para proporciones 0,5782
- 3.5) Calcular el límite inferior de control para proporciones 0,1252
- 3.6) Elabore la gráfica p en forma manual y con Graph
- 4) Consulte en la biblioteca o en el internet un ejercicio de aplicación de la gráfica p. Presente el ejercicio empleando Excel y Minitab .

B) Las Gráficas c

Estas gráficas están diseñadas para detectar el número de defectos en una sola unidad. Al desarrollar la gráficas p una unidad completa se consideraba defectuosa o no defectuosa. Sin embargo, en muchos casos, la presencia de uno o más defectos puede no producir necesariamente una unidad inaceptable. Un fabricante de muebles puede encontrar defectos menores en un sofá y sin embargo no considerarlo inaceptable. Si los defectos por cada 100 metros cuadrados de tapetes para el piso fueran pocas y menores, el fabricante puede decidir ofrecerlos en venta a pesar de estas imperfecciones. Una gráfica c se utiliza para analizar el número de imperfecciones por unidad de producción.

La gráfica c tiene que ver con el número de imperfecciones (defectos) por unidad (por sofá o por cada 100 metros cuadrados). Los límites de control se establecen alrededor del número de defectos en la población, c . En el caso probable de que c sea desconocido, se estima mediante \bar{c} , el número promedio de defectos en las unidades (número de defectos dividido para el número de muestras)

Una unidad puede constar de un solo artículo como un sofá, o una pieza de tapete de 100 metros cuadrados, o por ejemplo puede contener, un envío de 50 páginas impresas en las cuales se detectaron errores tipográficos. La unidad debe ser consistente en tamaño, número o área. Anteriormente se definió la desviación estándar del número de ocurrencias como la raíz cuadrada del número promedio de defecto.

Así:

Desviación estándar para el número de defectos

$$s_{\bar{c}} = \sqrt{\bar{c}}$$

Los límites de control están a tres desviaciones estándar por encima y por debajo de \bar{c}

Límite superior de control para el número de defectos

$$LSC_c = \bar{c} + 3s_{\bar{c}}$$

Límite inferior de control para el número de defectos

$$LIC_c = \bar{c} - 3s_{\bar{c}}$$

Nota: Si $LIC_c < 0$, se considera que $LIC_c = 0$

Ejemplo ilustrativo

Una empresa dedicada a la elaboración de papel para computador inspeccionó 20 hojas de un nuevo tipo de papel para buscar defectos. Los resultados se observan en la siguiente tabla:

Hoja	Número de defectos
1	5
2	4
3	3
4	5
5	16
6	1
7	8
8	9
9	9
10	4
11	3
12	15
13	10
14	8
15	4
16	2
17	10
18	12
19	7
20	17

- Calcule \bar{c}
- Calcule el límite superior de control para el número de defectos
- Calcule el límite inferior de control para el número de defectos
- Elabore la gráfica c en Minitab


Solución

Los cálculos empleando Excel:


	A	B	C	D	E
1	Hoja	Número de defectos			
2	1	5			
3	2	4			
4	3	3			
5	4	5			
6	5	16			
7	6	1			
8	7	8			
9	8	9			
10	9	9			
11	10	4			
12	11	3			
13	12	15			
14	13	10			
15	14	8			
16	15	4			
17	16	2			
18	17	10			
19	18	12			
20	19	7			
21	20	17			
22	Total	152	=SUMA(B2:B21)		
23	\bar{c}	7,6	=B22/CONTAR(A2:A21)		
24	$s_{\bar{c}}$	2,757	=RAIZ(B23)		
25	$LSC_c = \bar{c} + 3s_{\bar{c}}$	15,87	=B23+3*B24		
26	$LIC_c = \bar{c} - 3s_{\bar{c}}$	-0,670	=B23-3*B24		

Para realizar las gráfica c en Minitab se sigue el siguiente proceso


Ingrese los datos al programa




Clic en Gráficas de control, Gráficas de atributos, C




Clic en C



En la casilla Variables, seleccionar C1




Clic en Aceptar



TAREA DE INTERAPRENDIZAJE N° 28

- 1) Elabore un organizador gráfico sobre las gráficas c
- 2) ¿Por qué, si $LIC_c < 0$, se considera que $LIC_c = 0$?
- 3) Emplenario los datos de la tabla del ejemplo ilustrativo presentado en el presente tema

3.1) Elabore la gráfica c manualmente y con Graph



3.2) Realice una interpretación de la gráfica c

4) Cree y resuelva un ejercicio similar al anterior. La gráfica resuelva empleando Minitab

5) El jefe de personal de una empresa con 90 empleados ha introducido una estrategia para controlar el número de empleados ausentes al trabajo cada día. Para probar la efectividad del procedimiento, se seleccionan 20 días aleatoriamente y se registran los números de trabajadores ausentes, información que se indica en la siguiente tabla:

Día	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Número de ausencias	6	3	3	5	2	0	5	12	0	0	5	6	5	8	7	5	6	3	5	6

5.1) Calcular \bar{c}

1,022

5.2) Calcular el límite superior de control para el número de defectos

4,055

5.3) Calcular el límite inferior de control para el número de defectos

0

5.4) Elabore la gráfica c manualmente, con Minitab y Graph

5.5) Realice una interpretación de la gráfica c

SOLUCIONARIO DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

1) Elabore un diagrama de caja y bigotes dada la siguiente distribución: 6, 9, 9, 12, 12, 12, 15 y 17.

Solución:

Para calcular los cuartiles se ordena los datos de menor a mayor

6	9	9	12	12	12	15	17
x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8

Aplicando la ecuación para el cuartil uno se obtiene:

$$Q_k = X_{\left[\frac{n \cdot k + 2}{4}\right]} = X_{\left[\frac{n+2}{4}\right]} = X_{\left[\frac{8+2}{4}\right]} = X_{\left[\frac{10}{4}\right]} = X_{2,5}$$

Como la posición del cuartil 1 es 2,5, su valor es el promedio de los datos segundo y tercero

$$Q_1 = X_{2,5} = \frac{x_2 + x_3}{2} = \frac{9 + 9}{2} = 9$$

O también la posición 2,5 dice que el cuartil 1 está ubicado al 50% del trayecto comprendido entre el segundo dato, que es 9 y el tercer dato que es 9, es decir, $Q_1 = 9 + 0,5(9-9) = 9$

Interpretación: Este resultado indica que el 25% de los datos es inferior a 9

En Excel:

	A	B	C	D
1	6			
2	9			
3	9			
4	12			
5	12			
6	12			
7	15			
8	17			
9				
10	Q_1	9	=CUARTIL.INC(A1:A8;1)	

Empleando GeoGebra

Aplicando la ecuación para el cuartil dos se obtiene:

$$Q_k = X_{\left[\frac{n \cdot k + 2}{4}\right]} \Rightarrow Q_2 = X_{\left[\frac{n \cdot 2 + 2}{4}\right]} = X_{\left[\frac{2n+2}{4}\right]} = X_{\left[\frac{2 \cdot 8 + 2}{4}\right]} = X_{\left[\frac{16+2}{4}\right]} = X_{4,5} = \frac{x_4 + x_5}{2} = \frac{12 + 12}{2} = 12$$

O también la posición 4,5 dice que el cuartil 2 está ubicado al 50% del trayecto comprendido entre el cuarto dato, que es 12 y el quinto dato que también es 12, es decir,

$$Q_2 = 12 + 0,5(12 - 12) = 12$$


Interpretación: Este resultado indica que el 50% de los datos es inferior a 12

Empleando Excel:

	A	B	C	D
1	6			
2	9			
3	9			
4	12			
5	12			
6	12			
7	15			
8	17			
9				
10	Q ₂	12	=CUARTIL.INC(A1:A8;2)	

Empleando GeoGebra

Para calcular el cuartil 2 se repite los pasos para calcular la Mediana:



Aplicando la ecuación para el cuartil tres se obtiene:


$$Q_k = X_{\lceil \frac{n \cdot k + 2}{4} \rceil} \Rightarrow Q_3 = X_{\lceil \frac{3n+2}{4} \rceil} = X_{\lceil \frac{3 \cdot 8 + 2}{4} \rceil} = X_{\lceil \frac{24+2}{4} \rceil} = X_{\frac{26}{4}} = X_{6,5} = \frac{x_6 + x_7}{2} = \frac{12 + 15}{2} = 13,5$$

O también la posición 6,5 dice que el cuartil 2 está ubicado al 50% del trayecto comprendido entre el doceavo dato, que es 12 y el quinceavo dato que es 15, es decir, $Q_3 = 12 + 0,5(15 - 12)$

$$Q_3 = 12 + 0,5(3) = 12 + 1,5 = 13,5$$

Interpretación: Este resultado indica que el 75% de los datos es inferior a 13,5

Empleando GeoGebra



Empleando Excel: Repetir los pasos para el cuartil 1, y en la opción de cuartil escribir 3.

	A	B	C	D
1	6			
2	9			
3	9			
4	12			
5	12			
6	12			
7	15			
8	17			
9				
10	Q ₃	12,75	=CUARTIL.INC(A1:A8;3)	

Notas importantes:

-Los cálculos empleando Excel para un número impar de datos coinciden con los cálculos realizados con las ecuaciones.

-Para un número par de datos, aunque en ciertas ocasiones coinciden, suele existir diferencias en los cálculos del Q₁ y Q₃ realizados Empleando Excel. Este error de cálculo es: $e = 0,25d$, en donde d es la distancia de separación de los datos

-Para el Q₁ se resta el error al valor obtenido empleando Excel

-Para el Q₃ se suma el error al valor obtenido empleando Excel

En nuestro ejemplo $e = 0,25(x_7 - x_6) = 0,25(15 - 12) = 0,25(3) = 0,75$. Al sumar el error al valor Q₃ inicialmente calculado empleando Excel se obtiene el valor correcto como se muestra en la siguiente figura:

	A	B	C	D	E
1	6				
2	9				
3	9				
4	12				
5	12				
6	12				
7	15				
8	17				
9					
10	Q ₃	13,5	=CUARTIL.INC(A1:A8;3)+0,25*(A7-A6)		


Diagrama de caja y bigotes

Un diagrama de caja y bigotes es una representación gráfica que ayuda a visualizar una distribución de datos: caja desde Q₁ a Q₃ (50% de los datos), y bigotes el recorrido (distancia desde valor mínimo hasta el valor máximo).

De acuerdo al ejemplo ilustrativo del cálculo de cuartiles para datos sin agrupar de la distribución de datos 6, 9, 9, 12, 12, 12, 15 y 17 se obtienen:


Valor mínimo = 6 Q₁ = 9; Q₂ = 12; Q₃ = 13,5 Valor máximo = 17

Por lo tanto el diagrama de caja y bigotes es:




El diagrama de caja y bigotes empleando GeoGebra se elabora de la siguiente manera:


a) Ingrese al programa. En la casilla Entrada escriba las primeras letras de DiagramaCaja



b) Seleccione DiagramaCaja[<Offset_y>, <Escala_y>, <Lista de Datos en Bruto>] y dicha opción escriba DiagramaCaja[2,1,{6,9,9,12,12,12,15,17}]. Enter



c) Editando el diagrama de caja y bigotes se obtiene:



2) Calcule la moda empleando la fórmula y empleando un histograma con los siguientes datos:

Intervalo o Clase	f
10-19	3
20-29	7
30-39	15
40-49	12
50-59	8

Solución: Se observa que la clase modal es 30-39, ya que es el intervalo con la mayor frecuencia. Aplicando la ecuación

$$Mo = L_{Mo} + \left(\frac{D_a}{D_a + D_b} \right) \cdot i$$

Donde:

L_{Mo} = Límite inferior de la clase modal.

D_a = Diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal y la clase que la antecede.

D_b = Diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal y la clase que le sigue.

i = ancho de la clase modal.


Reemplazando valores se tiene:

$$Mo = 30 + \left(\frac{15 - 7}{(15 - 7) + (15 - 12)} \right) \cdot 10$$

$$Mo = 30 + \left(\frac{8}{8 + 3} \right) \cdot 10$$

$$Mo = 30 + \frac{80}{11} = 37,27$$

Gráficamente empleando un histograma se calcula la moda de la siguiente manera:



La clase modal es 30-39, ya que es el intervalo con la mayor frecuencia

Observando el histograma se tiene que $Mo = 30 + FB$

Los triángulos ABC y EBD son semejantes, por lo que se cumple:

$$\frac{FB}{AC} = \frac{BG}{DE}$$

Donde:

AC = Diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal y la clase que la antecede.

BG es igual al ancho del intervalo 30-39 menos FB.

DE = Diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal y la clase que le sigue.

Remplazando valores y despejando FB se tiene:

$$\frac{FB}{15 - 7} = \frac{10 - FB}{15 - 12} \Rightarrow \frac{FB}{8} = \frac{10 - FB}{3} \Rightarrow 3FB = 8(10 - FB) \Rightarrow 3FB = 80 - 8FB$$

$$3FB + 8FB = 80 \Rightarrow 11FB = 80 \Rightarrow FB = \frac{80}{11} = 7,27$$

$$\text{Por lo tanto } Mo = 30 + FB = 30 + 7,27 = 37,27$$

3) Calcule el punto centroeide con los datos de la siguiente tabla sobre la altura en centímetros (X) y los pesos en kilogramos (Y) de una muestra de estudiantes varones tomada al azar del segundo semestre de una universidad. Estimar el valor de Y cuando $X = 200$. Elabore las gráficas respectivas.

X	152	157	162	167	173	178	182	188
Y	56	61	67	72	70	72	83	92

Solución: Se llena la siguiente tabla:

X	Y	XY	X ²	Y ²
152	56	8512	23104	3136
157	61	9577	24649	3721
162	67	10854	26244	4489
167	72	12024	27889	5184
173	70	12110	29929	4900
178	72	12816	31684	5184
182	83	15106	33124	6889
188	92	17296	35344	8464
$\Sigma X = 1359$	$\Sigma Y = 573$	$\Sigma XY = 98295$	$\Sigma X^2 = 231967$	$\Sigma Y^2 = 41967$

a) Remplazando valores en el sistema se tiene:

$$\begin{cases} \Sigma Y = a_0 N + a_1 \Sigma X & 573 = a_0 \cdot 8 + a_1 \cdot 1359 \\ \Sigma XY = a_0 \Sigma X + a_1 \Sigma X^2 & 98295 = a_0 \cdot 1359 + a_1 \cdot 231967 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 8a_0 + 1359a_1 = 573 \\ 1359a_0 + 231967a_1 = 98295 \end{cases}$$

Resolviendo el sistema por determinantes (regla de Cramer) se obtiene:


$$a_0 = \frac{\Delta a_0}{\Delta} = \frac{\begin{vmatrix} 573 & 1359 \\ 98295 & 231967 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 8 & 1359 \\ 1359 & 231967 \end{vmatrix}} = \frac{573 \cdot 231967 - 98295 \cdot 1359}{8 \cdot 231967 - 1359 \cdot 1359} = \frac{-665814}{8855} = -75,191$$

$$a_1 = \frac{\Delta a_1}{\Delta} = \frac{\begin{vmatrix} 8 & 573 \\ 1359 & 98295 \end{vmatrix}}{8855} = \frac{8 \cdot 98295 - 1359 \cdot 573}{8855} = \frac{7653}{8855} = 0,864$$

Para calcular los valores de a_1 y a_0 empleando Excel se calcula de la siguiente manera:

	A	B	C	D	E
1	X	Y			
2	152	56			
3	157	61			
4	162	67			
5	167	72			
6	173	70			
7	178	72			
8	182	83			
9	188	92			
10					
11		0,8642575	-75,19074		

Los cálculos empleando GeoGebra se muestran en la siguiente figura:



Remplazando valores en la ecuación respectiva se obtiene:

$$Y = a_0 + a_1 X \Rightarrow Y = -75,191 + 0,864X$$

Interpretación:

- El valor $a_1 = 0,864$ indica que la recta tiene una pendiente positiva aumentando a razón de 0,864
- El valor de $a_0 = -75,191$ indica el punto en donde la recta interseca al eje Y cuando $X = 0$

b) Otra forma de calcular a_0 y a_1 . Con los datos de la tabla anterior se substituye valores en las siguientes ecuaciones:

$$a_0 = \frac{\sum Y \cdot \sum X^2 - \sum X \cdot \sum XY}{N \sum X^2 - (\sum X)^2} = \frac{573 \cdot 231967 - 1359 \cdot 98295}{8 \cdot 231967 - (1359)^2} = \frac{-665814}{8855} = -75,191$$

$$a_1 = \frac{N \sum XY - \sum X \cdot \sum Y}{N \sum X^2 - (\sum X)^2} = \frac{8 \cdot 98295 - 1359 \cdot 573}{8 \cdot 231967 - (1359)^2} = \frac{7653}{8855} = 0,864$$

Remplazando valores en la ecuación respectiva se obtiene:

$$Y = a_0 + a_1 X \Rightarrow Y = -75,191 + 0,864X$$

c) Otra forma de calcular a_0 y a_1 . Se calcula las medias aritméticas de X y Y para llenar la siguiente tabla:

$$\bar{X} = \frac{1359}{8} = 169,875; \bar{Y} = \frac{573}{8} = 71,625$$

X	Y	$x = X - \bar{X}$	$y = Y - \bar{Y}$	xy	x^2	y^2
152	56	-17,88	-15,625	279,297	319,516	244,141
157	61	-12,88	-10,625	136,797	165,766	112,891
162	67	-7,875	-4,625	36,422	62,016	21,391
167	72	-2,875	0,375	-1,078	8,266	0,141
173	70	3,125	-1,625	-5,078	9,766	2,641
178	72	8,125	0,375	3,047	66,016	0,141
182	83	12,125	11,375	137,922	147,016	129,391
188	92	18,125	20,375	369,297	328,516	415,141
$\Sigma X = 1359$	$\Sigma Y = 573$			$\Sigma xy = 956,625$	$\Sigma x^2 = 1106,875$	$\Sigma y^2 = 925,875$

Remplazando valores en la fórmula respectiva se obtiene:

$$y = \left(\frac{\sum xy}{\sum x^2} \right) x \Rightarrow y = \frac{956,625}{1106,875} x \Rightarrow Y - \bar{Y} = \frac{956,625}{1106,875} (X - \bar{X})$$

$$Y - 71,625 = \frac{956,625}{1106,875} (X - 169,875) \Rightarrow 1106,875(Y - 71,625) = 956,625(X - 169,875)$$

$$1106,875Y - 79280,20838 = 956,625X - 162510,4984$$

$$1106,875Y = 956,625X - 162510,4984 + 79280,20838$$

$$1106,875Y = 956,625X - 83230,29$$

$$Y = \frac{956,625X - 83230,29}{1106,875} \Rightarrow Y = \frac{956,625X}{1106,875} - \frac{83230,29}{1106,875} \Rightarrow Y = 0,864X - 75,19$$

$$Y = -75,19 + 0,864X$$

d) Para calcular b_0 y b_1 . Remplazando valores en sistema respectivo se obtiene:

$$\begin{cases} \Sigma X = b_0 N + b_1 \Sigma Y & 1359 = b_0 \cdot 8 + b_1 \cdot 573 & 8b_0 + 573b_1 = 1359 \\ \Sigma XY = b_0 \Sigma Y + b_1 \Sigma Y^2 & 98295 = b_0 \cdot 573 + b_1 \cdot 41967 & 573b_0 + 41967b_1 = 98295 \end{cases}$$


Resolviendo el sistema se obtiene:

$$b_0 = 95,871; b_1 = 1,033$$

Remplazando valores en la ecuación de la recta de mínimos cuadrados se obtiene:

$$X = b_0 + b_1 Y \Rightarrow X = 95,871 + 1,033Y$$

Los cálculos empleando GeoGebra insertando Ajuste Lineal se muestran en la siguiente figura:



Interpretación:


- El valor $b_1 = 1,033$ indica que la recta tiene una pendiente positiva aumentando a razón de 1,033
- El valor de $b_0 = 95,871$ indica el punto en donde la recta interseca al eje X cuanto Y = 0

e) Para calcular el centroide (\bar{X}, \bar{Y}) se resuelve el sistema formado por las dos rectas de los mínimos cuadrados en donde X es \bar{X} y Y es \bar{Y} .

$$\begin{cases} Y = -75,191 + 0,864X \\ X = 95,871 + 1,033Y \end{cases}$$

Al resolver el sistema se obtiene el centroide: X = 169,3 y Y = 71,092

f) Empleando el programa Graph se obtiene la siguiente figura:



g) Reemplazando X = 200 en la ecuación se obtiene:

$$Y = -75,191 + 0,864X = -75,191 + 0,864 \cdot 200 = -75,191 + 172,8 = 97,609$$

4) Calcule y grafique la ecuación de la parábola $Y = a_0 + a_1X + a_2X^2$ por el método de los mínimos cuadrados dada la siguiente tabla sobre la población de un país. Estimar la población para el año 2020.

Año	1960	1965	1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010
Población (millones)	4,52	5,18	6,25	7,42	8,16	9,12	10,92	11,62	12,68	13,12	13,97

Solución:

La parábola de mínimos cuadrados que aproxima el conjunto de puntos $(X_1, Y_1), (X_2, Y_2), (X_3, Y_3), \dots (Y_N, Y_N)$ tiene ecuación dada por $Y = a_0 + a_1X + a_2X^2$, donde las constantes a_0, a_1 y a_2 se determinan al resolver simultáneamente el sistema de ecuaciones que se forma al multiplicar la ecuación $Y = a_0 + a_1X + a_2X^2$ por 1, X, X^2 sucesivamente, y sumando después.

$$\begin{cases} \Sigma Y = a_0N + a_1\Sigma X + a_2\Sigma X^2 \\ \Sigma XY = a_0\Sigma X + a_1\Sigma X^2 + a_2\Sigma X^3 \\ \Sigma X^2Y = a_0\Sigma X^2 + a_1\Sigma X^3 + a_2\Sigma X^4 \end{cases}$$

Nota: Se recomienda codificar o cambiar la numeración de los años, tratando que $X = 0$ esté ubicado en lo posible en el centro.

Para ajustar una parábola de mínimos cuadrados se llena la siguiente tabla:

Año	X	Y	X^2	X^3	X^4	XY	X^2Y
1960	-5	4,52	25	-125	625	-22,6	113
1965	-4	5,18	16	-64	256	-20,72	82,88
1970	-3	6,25	9	-27	81	-18,75	56,25
1975	-2	7,42	4	-8	16	-14,84	29,68
1980	-1	8,16	1	-1	1	-8,16	8,16
1985	0	9,12	0	0	0	0	0
1990	1	10,92	1	1	1	10,92	10,92
1995	2	11,62	4	8	16	23,24	46,48
2000	3	12,68	9	27	81	38,04	114,12
2005	4	13,12	16	64	256	52,48	209,92
2010	5	13,97	25	125	625	69,85	349,25
Σ	0	102,96	110	0	1958	109,46	1020,66

Se reemplaza valores en el sistema y se obtiene:

$$\begin{cases} \Sigma Y = a_0N + a_1\Sigma X + a_2\Sigma X^2 \\ \Sigma XY = a_0\Sigma X + a_1\Sigma X^2 + a_2\Sigma X^3 \\ \Sigma X^2Y = a_0\Sigma X^2 + a_1\Sigma X^3 + a_2\Sigma X^4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 102,96 = a_0 \cdot 11 + a_1 \cdot 0 + a_2 \cdot 110 \\ 109,46 = a_0 \cdot 0 + a_1 \cdot 110 + a_2 \cdot 0 \\ 1020,66 = a_0 \cdot 110 + a_1 \cdot 0 + a_2 \cdot 1958 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 11a_0 + 0a_1 + 110a_2 = 102,96 \\ 0a_0 + 110a_1 + 0a_2 = 109,46 \\ 110a_0 + 0a_1 + 1958a_2 = 1020,66 \end{cases}$$

Resolviendo el sistema empleando determinantes (regla de Cramer) se obtiene:

$$a_0 = \frac{\Delta a_0}{\Delta} = \frac{\begin{vmatrix} 102,96 & 0 & 110 \\ 109,46 & 110 & 0 \\ 1020,66 & 0 & 1958 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 11 & 0 & 110 \\ 0 & 110 & 0 \\ 110 & 0 & 1958 \end{vmatrix}} = \frac{\begin{vmatrix} 102,96 & 0 & 110 \\ 109,46 & 110 & 0 \\ 1020,66 & 0 & 1958 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 11 & 0 & 110 \\ 0 & 110 & 0 \\ 110 & 0 & 1958 \end{vmatrix}} = \frac{\begin{vmatrix} 102,96 & 0 & 110 \\ 109,46 & 110 & 0 \\ 1020,66 & 0 & 1958 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 11 & 0 & 110 \\ 0 & 110 & 0 \\ 110 & 0 & 1958 \end{vmatrix}} = \frac{22175524,8 + 0 + 0 - 12349986 - 0 - 0}{2369180 + 0 + 0 - 1331000 - 0 - 0} = \frac{9825538,8}{1038180} = 9,464$$

$$a_1 = \frac{\Delta a_1}{\Delta} = \frac{\begin{vmatrix} 11 & 102,96 & 110 \\ 0 & 109,46 & 0 \\ 110 & 1020,66 & 1958 \end{vmatrix}}{1038180} = \frac{\begin{vmatrix} 11 & 102,96 & 110 \\ 0 & 109,46 & 0 \\ 110 & 1020,66 & 1958 \end{vmatrix}}{1038180} = \frac{23577549,48 + 0 + 0 - 1324466 - 0 - 0}{1038180} = \frac{2357549,48}{1038180} = 0,995$$

$$a_2 = \frac{\Delta a_2}{\Delta} = \frac{\begin{vmatrix} 11 & 0 & 102,96 \\ 0 & 110 & 109,46 \\ 110 & 0 & 1020,66 \end{vmatrix}}{1038180} = \frac{\begin{vmatrix} 11 & 0 & 102,96 \\ 0 & 110 & 109,46 \\ 110 & 0 & 1020,66 \end{vmatrix}}{1038180} = \frac{1234998,6 + 0 + 0 - 1245816 - 0 - 0}{1038180} = \frac{-10817,4}{1038180} = -0,01$$

El sistema de ecuaciones resuelto empleando GeoGebra:

$$\frac{67669}{7150} = 9,464 ; \frac{5473}{5500} = 0,995 ; -\frac{149}{14300} = -0,01$$

Remplazando los valores encontrados se obtiene la ecuación de la parábola de mínimos cuadrados:


$$Y = a_0 + a_1X + a_2X^2 \Rightarrow Y = 9,464 + 0,995X - 0,01X^2$$

Para estimar la población del año 2020 se transforma este año a X, siguiendo la secuencia de la tabla anterior, por lo que X=7 para el 2020

Entonces para el 2020 se tiene:

$$Y = 9,464 + 0,995X - 0,01X^2 = 9,464 + 0,995(7) - 0,01(7)^2 = 9,464 + 6,965 - 0,49 = 15,939$$

El diagrama de dispersión y la parábola de los mínimos cuadrados empleando GeoGebra es:



5) Calcule la ecuación de la recta de tendencia por el método de los semipromedios, pronostique la tendencia de ventas para el 2011, elabore el diagrama de dispersión, y grafique la recta de tendencia con los siguientes datos sobre las ventas en millones de dólares de la Empresa D & M

Año(X)	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Ventas(Y)	1,5	1,8	2	1,5	2,2	2	3	2,8	2,4	2,9	3

Solución:

Este método se aplica con el objeto de simplificar los cálculos y consiste en:

Agrupar los datos en dos grupos iguales

Obtener el valor central (mediana) de los tiempos y la media aritmética de los datos de cada grupo, consiguiéndose así dos puntos de la recta de tendencia (X_1, Y_1) y (X_2, Y_2) .

Estos valores se reemplazan en el siguiente sistema:

$$\begin{cases} Y_1 = a_0 + a_1 X_1 \\ Y_2 = a_0 + a_1 X_2 \end{cases}$$

Resolviendo el sistema se encuentran los valores de a_0 y a_1 , los cuales se reemplazan en la ecuación de la recta de tendencia, la cual es:

$$Y = a_0 + a_1 X$$

Con esta recta de tendencia se puede realizar pronósticos, los cuales son menos exactos que los obtenidos con el método de los mínimos cuadrados, sin embargo, su diferencia es mínima.

Se codifica la numeración de los años 2000 como 1, 2001 como 2, y así consecutivamente para facilitar los cálculos. Se agrupa en dos grupos iguales.

Año	X	Y	Valor central X	Semipromedio Y
2000	1	1,5	3	1,8
2001	2	1,8		
2002	3	2		
2003	4	1,5		
2004	5	2,2		
2005	6	2		
2006	7	3	9	2,82
2007	8	2,8		
2008	9	2,4		
2009	10	2,9		
2010	11	3		

El año 2005 se dejó por fuera para tener grupos con el mismo número de años. El valor central de 3 corresponde a la mediana del primer grupo 1, 2, 3, 4 y 5. El valor central de 9 corresponde a la mediana del segundo grupo 7, 8, 9, 10 y 11. El semipromedio 1,8 corresponden a la media aritmética del primer grupo. El semipromedio 2,82 corresponden a la media aritmética del segundo grupo. De esta manera se obtienen dos puntos (3, 1.8) y (9, 2.82) de la recta de tendencia.

Reemplazando los puntos en el siguiente sistema se obtiene:

$$\begin{cases} Y_1 = a_0 + a_1 X_1 \\ Y_2 = a_0 + a_1 X_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 1,8 = a_0 + 3a_1 \\ 2,82 = a_0 + 9a_1 \end{cases}$$

Resolviendo el sistema empleando la regla de Cramer se obtiene:

$$a_0 = \frac{\Delta_{a_0}}{\Delta} = \frac{\begin{vmatrix} 1,8 & 3 \\ 2,82 & 9 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 9 \end{vmatrix}} = \frac{7,74}{6} = 1,29; \quad a_1 = \frac{\Delta_{a_1}}{\Delta} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1,8 \\ 1 & 2,82 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 9 \end{vmatrix}} = \frac{1,02}{6} = 0,17$$

Como a_1 es positiva, la recta tiene una tendencia ascendente (pendiente positiva).

Reemplazando los valores calculados se tiene la recta de tendencia, la cual es:

$$Y = a_0 + a_1 X \Rightarrow Y = 1,29 + 0,17X$$


Para pronosticar la tendencia de exportación para el 2011 se reemplaza $X = 12$ en la recta de tendencia, obteniendo el siguiente resultado:

$$Y = 1,29 + 0,17X \Rightarrow Y = 1,29 + 0,17 \cdot 12 \Rightarrow Y = 3,33$$

Los cálculos realizados empleando Excel se muestran en la siguiente figura:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Año (X)	X	Y	Valor central X		Semipomedio Y		Pronóstico	
2	2000	1	1,5						
3	2001	2	1,8						
4	2002	3	2	3	=MEDIANA(B2:B6)	2	=PROMEDIO(C2:C6)		
5	2003	4	1,5						
6	2004	5	2,2						
7	2005	6	2						
8	2006	7	3						
9	2007	8	2,8						
10	2008	9	2,4	9	=MEDIANA(B8:B12)	2,82	=PROMEDIO(C8:C12)		
11	2009	10	2,9						
12	2010	11	3						
13	2011	12						3,33	=H19+H22*B13
14									
15	$Y = a_0 + a_1 X$								
16	1,8	1	3		6	=MDETERM(B16:C17)			
17	2,82	1	9						
18									
19		1,80	3		7,74	=MDETERM(B19:C20)	a_0	1,29	=E19/E16
20		2,82	9						
21									
22		1	1,80		1,02	=MDETERM(B22:C23)	a_1	0,17	=E22/E16
23		1	2,82						

La gráfica de los datos y la recta de tendencia elaborada en Graph se muestran en la siguiente figura:



Interpretación: Existe una tendencia ascendente a un cambio promedio de 0,17 millones de dólares por cada año, por lo que el Gerente de ventas de la empresa debe seguir aplicando las políticas necesarias para mantener la tendencia ascendente y mejorar la tasa de crecimiento.

FORMULARIO SOBRE CONOCIMIENTOS ESTADÍSTICOS PREVIOS

- **Frecuencia Absoluta (f).**- Es el número de veces que se repite el valor de cada variable. La suma de frecuencias absolutas es siempre al total de datos observados.

- **Frecuencia Relativa (fr).**- Indica la proporción con que se repite un valor. Es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de datos. La suma de las frecuencias relativas es siempre 1

$$fr = \frac{f}{n}$$

- **Frecuencia Acumulada (fa).**- Indica el número de valores que son menores o iguales que el valor dado. Al sumar las frecuencias absolutas desde el menor puntaje hacia arriba tenemos la frecuencia acumulada, es decir, es la suma de la frecuencia absoluta primera con la segunda, este valor con la tercera, y así sucesivamente.

- **Frecuencia Porcentual ($f\%$).**- Llamada también frecuencia relativa porcentual. Se obtiene multiplicando la frecuencia relativa por 100. La suma de las frecuencias porcentuales es siempre 100%. Se calcula así:

$$f\% = fr \cdot 100$$

- **Frecuencia Relativa Acumulada (fra).**- Es la suma de la frecuencia relativa primera con la segunda, este valor con la tercera, y así sucesivamente.

- **Frecuencia Relativa Acumulada Porcentual ($fra\%$).**- Indica el número de valores que son menores o iguales que el valor dado. Se obtiene multiplicando la frecuencia relativa acumulada por 100. Se calcula así:

$$fra\% = fra \cdot 100$$

- **Rango (R).**- También se llama recorrido o amplitud total. Es la diferencia entre el valor mayor y el menor de los datos.

$$R = x_{\text{máx}} - x_{\text{mín}}$$

- **Número de Intervalos de Clase (n_i).**- No debe ser menor de 5 y mayor de 12, ya que un número mayor o menor de clases podría oscurecer el comportamiento de los datos. Para calcular el número de intervalos se aplica la regla de Sturges, propuesta por Herberth Sturges en 1926:

$$n_i = 1 + 3,32 \cdot \log(n)$$

Siendo n el tamaño de la muestra.

- **Ancho del Intervalo (i).**- Se obtiene dividiendo el Rango para el número de intervalos

$$i = \frac{R}{n_i}$$

Cuando el valor de i no es exacto, se debe redondear al valor superior más cercano. Esto altera el valor de rango por lo que es necesario efectuar un ajuste así:

$$\text{Nuevo } R = n_i \cdot i$$

- **Intervalos de Clase agregando $i - 1$** al límite inferior de cada clase, comenzando por el $x_{\text{mín}}$ del rango.

- **Marca de Clase (x_m).**- Es el valor medio de cada clase, se obtiene sumando los límites superior (L_s) e inferior (L_i) del intervalo y dividiendo ésta suma entre 2

$$x_m = \frac{L_s + L_i}{2}$$

Ejemplo ilustrativo: A 40 estudiantes se les pidió que estimen el número de horas que habrían dedicado a estudiar la semana pasada (tanto en clase como fuera de ella), obteniéndose los siguientes resultados:

36	30	47	60	32	35	40	50
54	35	45	52	48	58	60	38
32	35	56	48	30	55	49	39
58	50	65	35	56	47	37	56
58	50	47	58	55	39	58	45

Solución:

Empleando Excel:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	36	30	47	60	32	35	40	50
2	54	35	45	52	48	58	60	38
3	32	35	56	48	30	55	49	39
4	58	50	65	35	56	47	37	56
5	58	50	47	58	55	39	58	45
6								
7	n	40	=CONTAR(A1:H5)					
8	$x_{máx}$	65	=MAX(A1:H5)					
9	x_{min}	30	=MIN(A1:H5)					
10	R	35	=B8-B9	=MAX(A1:H5)-MIN(A1:H5)				
11	n_i	6	=ENTERO(1+3,32*LOG10(B7))					
12	i	6	=B10/B11					

Digite los datos, las clases y límites superiores de las clases.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	36	30	47	60	32	35	40	50
2	54	35	45	52	48	58	60	38
3	32	35	56	48	30	55	49	39
4	58	50	65	35	56	47	37	56
5	58	50	47	58	55	39	58	45
6								
7	Clase	L_s	f					
8	30-35	35						
9	36-41	41						
10	42-47	47						
11	48-53	53						
12	54-59	59						
13	60-65	65						

Seleccione C8:C13 donde las frecuencias absolutas deben ser calculadas.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	36	30	47	60	32	35	40	50
2	54	35	45	52	48	58	60	38
3	32	35	56	48	30	55	49	39
4	58	50	65	35	56	47	37	56
5	58	50	47	58	55	39	58	45
6								
7	Clase	L_s	f					
8	30-35	35						
9	36-41	41						
10	42-47	47						
11	48-53	53						
12	54-59	59						
13	60-65	65						

Insertar función. En Seleccionar una categoría, elija Estadísticas. En Seleccionar una función, elija FRECUENCIA

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	36	30	47	60	32	35	40	50		
2	54	35	45	52	48	58	60	38		
3	32	35	56	48	30	55	49	39		
4	58	50	65	35	56	47	37	56		
5	58	50	47	58	55	39	58	45		
6										
7	Clase	L_s	f							
8	30-35	35	=							
9	36-41	41								
10	42-47	47								
11	48-53	53								
12	54-59	59								
13	60-65	65								
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										

Insertar función ? X

Buscar una función:

Escriba una breve descripción de lo que desea hacer y, a continuación, haga clic en Ir Ir

O seleccionar una categoría: Estadísticas v

Seleccionar una función:

- ESTIMACION.LINEAL
- ESTIMACION.LOGARITMICA
- FI
- FISHER
- FRECUENCIA**
- GAMMA
- GAMMA.LN

FRECUENCIA(datos;grupos)

Calcula la frecuencia con la que ocurre un valor dentro de un rango de valores y devuelve una matriz vertical de números con más de un elemento que grupos.

[Ayuda sobre esta función](#) Aceptar Cancelar

Clic en Aceptar para que aparezca la ventana Argumentos de función. En la casilla datos, seleccionar los datos desde A1:H5, y en la casilla Grupos, seleccionar los datos desde B8:B13.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	36	30	47	60	32	35	40	50				
2	54	35	45	52	48	58	60	38				
3	32	35	56	48	30	55	49	39				
4	58	50	65	35	56	47	37	56				
5	58	50	47	58	55	39	58	45				
6												
7	Clase	L_s	f									
8	30-35	35	8									
9	36-41	41										
10	42-47	47										
11	48-53	53										
12	54-59	59										
13	60-65	65										
14												
15												
16												
17												
18												
19												

Argumentos de función

FRECUENCIA

Datos A1:H5 = {36\30\47\60\32\35\40\50\54\35\45\...}

Grupos B8:B13 = {35;41;47;53;59;65}

= {8;6;5;7;11;3;0}

Calcula la frecuencia con la que ocurre un valor dentro de un rango de valores y devuelve una matriz vertical de números con más de un elemento que grupos.

Grupos es una matriz, o una referencia, a rangos dentro de los cuales se desea agrupar los valores de datos.

Resultado de la fórmula = 8

[Ayuda sobre esta función](#)

Presione CTRL+SHIFT+ENTER

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	36	30	47	60	32	35	40	50
2	54	35	45	52	48	58	60	38
3	32	35	56	48	30	55	49	39
4	58	50	65	35	56	47	37	56
5	58	50	47	58	55	39	58	45
6								
7	Clase	L_s	f					
8	30-35	35	8					
9	36-41	41	6					
10	42-47	47	5					
11	48-53	53	7					
12	54-59	59	11					
13	60-65	65	3					
14								
15								

Los cálculos de la marca de clase y de las frecuencias empleando Excel se muestran en la siguiente figura:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	36	30	47	60	32	35	40	50								
2	54	35	45	52	48	58	60	38								
3	32	35	56	48	30	55	49	39								
4	58	50	65	35	56	47	37	56								
5	58	50	47	58	55	39	58	45								
6																
7	Clases	f	xm			fr		fa		f%		fra		fra%		
8	30 35	8	32,5	=(A8+B8)/2	0,2	=C8/SCS14	8	=C8	20	=G8*100	0,2	=G8	20	=M8*100		
9	36 41	6	38,5	=(A9+B9)/2	0,15	=C9/SCS14	14	=C9+I8	15	=G9*100	0,35	=G9+M8	35	=M9*100		
10	42 47	5	44,5	=(A10+B10)/2	0,125	=C10/SCS14	19	=C10+I9	12,5	=G10*100	0,475	=G10+M9	47,5	=M10*100		
11	48 53	7	50,5	=(A11+B11)/2	0,175	=C11/SCS14	26	=C11+I10	17,5	=G11*100	0,65	=G11+M10	65	=M11*100		
12	54 59	11	56,5	=(A12+B12)/2	0,275	=C12/SCS14	37	=C12+I11	27,5	=G12*100	0,925	=G12+M11	92,5	=M12*100		
13	60 65	3	62,5	=(A13+B13)/2	0,075	=C13/SCS14	40	=C13+I12	7,5	=G13*100	1	=G13+M12	100	=M13*100		
14	Total	40	=SUMA(C8:C13)		1	=SUMA(H8:H13)			100							

MEDIA ARITMÉTICA SIMPLE

a) Para Datos sin tabular

La media de una población es el parámetro μ (que se lee “miu”). Si hay N observaciones en el conjunto de datos de la población, la media se calcula así:

$$\mu = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_N}{N} = \frac{\sum x_i}{N}$$

La media de una muestra es un estadístico \bar{x} (que se lee “x barra”). Con n observaciones en el conjunto de datos de la muestra (x_1, x_2, \dots), la media se determina así:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n} = \frac{\sum x_i}{n}$$

b) Para datos ordenados en tablas de frecuencias.- Cuando una serie se la agrupa en *serie simple con frecuencias* para obtener la media aritmética, se multiplica la variable por la frecuencia respectiva (f), luego se obtiene la suma de todos estos productos y luego a este valor se lo divide para el número de elementos (n). Todo esto puede representarse mediante una fórmula matemática, así:

$$\bar{x} = \frac{f_1 \cdot x_1 + f_2 \cdot x_2 + f_3 \cdot x_3 + \dots + f_n \cdot x_n}{f_1 + f_2 + f_3 + \dots + f_n} = \frac{\sum f_i \cdot x_i}{\sum f} = \frac{\sum fx}{n}$$

Donde $n = \sum f$ es la frecuencia total (o sea, el número total de casos)

c) Para datos agrupados en intervalos.- Cuando una serie se la agrupa en *intervalos* para obtener la media aritmética, se multiplica la marca de clase de intervalo (xm) por la frecuencia respectiva (f), luego se obtiene la suma de todos estos productos y luego a este valor se lo divide para el número de elementos. Todo esto se representa mediante la siguiente fórmula matemática:

$$\bar{x} = \frac{f_1 \cdot xm_1 + f_2 \cdot xm_2 + f_3 \cdot xm_3 + \dots + f_n \cdot xm_n}{f_1 + f_2 + f_3 + \dots + f_n} = \frac{\sum f_i \cdot xm_i}{\sum f} = \frac{\sum f \cdot xm}{n}$$

Ejemplo ilustrativo: Calcular la media aritmética de las siguientes calificaciones de Estadística tomadas de una muestra de 20: 4, 8, 10, 10, 5, 10, 9, 8, 6, 8, 10, 8, 5, 7, 4, 4, 8, 8, 6 y 6

- 1) Sin tabular
- 2) Ordenando en tablas de frecuencias
- 3) Agrupando en intervalos.

Solución:

1) Empleado Excel:

	A	B	C	D
1	4	8	10	10
2	5	10	9	8
3	6	8	10	8
4	5	7	4	4
5	8	8	6	6
6				
7	\bar{x}	7,2	=PROMEDIO(A1:D5)	

2) Ordenando en tablas de frecuencias empleado Excel:

	A	B	C	D	E	F
1	4	8	10	10		
2	5	10	9	8		
3	6	8	10	8		
4	5	7	4	4		
5	8	8	6	6		
6						
7	x	f				
8	4	3	=CONTAR.SI(\$A\$1:\$D\$5;A8)			
9	5	2	=CONTAR.SI(\$A\$1:\$D\$5;A9)			
10	6	3	=CONTAR.SI(\$A\$1:\$D\$5;A10)			
11	7	1	=CONTAR.SI(\$A\$1:\$D\$5;A11)			
12	8	6	=CONTAR.SI(\$A\$1:\$D\$5;A12)			
13	9	1	=CONTAR.SI(\$A\$1:\$D\$5;A13)			
14	10	4	=CONTAR.SI(\$A\$1:\$D\$5;A14)			
15	Total	20	=SUMA(B8:B14)			
16	\bar{x}	7,2	=SUMAPRODUCTO(A8:A14;B8:B14)/B15			

3) Agrupando en intervalos empleado Excel:

	A	B	C	D	E	F	G
1	4	8	10	10			
2	5	10	9	8			
3	6	8	10	8			
4	5	7	4	4			
5	8	8	6	6			
6							
7	$X_{máx}$	10	=MAX(A1:D5)				
8	$X_{mín}$	4	=MIN(A1:D5)				
9	Rango	6	=B7-B8				
10	n	20	=CONTAR(A1:D5)				
11	n_i	5	=ENTERO(1+3,32*LOG(B10))				
12	i	1,2	=B9/B11				
13							
14	Intervalos	x_m	f	{=FRECUENCIA(A1:D5;B15:B18)}			
15	4	5	4,5	5			
16	6	7	6,5	4			
17	8	9	8,5	7			
18	10	11	10,5	4			
19				20	=SUMA(D15:D18)		
20							
21	\bar{x}	7,5	=SUMAPRODUCTO(C15:C18;D15:D18)/D19				

MEDIA ARITMÉTICA PONDERADA

Cuando los números $x_1, x_2, x_3, \dots, x_k$ se les asocian ciertos factores peso (o pesos) $p_1, p_2, p_3, \dots, p_k$, dependientes de la relevancia asignada a cada número, en tal caso se requiere calcular la media aritmética ponderada, la cual se calcula así:

$$\bar{x} = \frac{p_1 \cdot x_1 + p_2 \cdot x_2 + p_3 \cdot x_3 + \dots + p_k \cdot x_k}{p_1 + p_2 + p_3 + \dots + p_k} = \frac{\sum p \cdot x}{\sum p}$$

Ejemplo ilustrativo: Se tiene una información acerca de las utilidades por pan y cantidades vendidas de panes de tres tiendas. Calcular la media aritmética promedio de la utilidad por pan.

Tienda	Utilidad/pan	Cantidad vendida
1	1	2000
2	0,8	1800
3	0,9	2100

Solución:

Empleando Excel:

	A	B	C	D	E
1	Tienda	Utilidad/pan	Cantidad vendida		
2	1	1	2000		
3	2	0,8	1800		
4	3	0,9	2100		
5			5900	=SUMA(C2:C4)	
6	\bar{x}	0,9033898	=SUMAPRODUCTO(B2:B4;C2:C4)/C5		

Ejemplo ilustrativo de un problema:

Una estudiante de secundaria de Ecuador de la Unidad Educativa “Ibarra” obtiene en el primer quimestre, 6 en la primera parcial, 9 en la segunda parcial, 6 en la tercera parcial. Si el promedio del quimestre es de 7,2, ¿cuál fue la calificación del examen?. Recuerde que el sistema educativo ecuatoriano secundario las tres parciales aportan al promedio con el 80% y la nota del examen con el 20%

Solución

Evaluación	Calificación(x)	Ponderación(p)	$p \cdot x$
1ra parcial	6	80/3	160
2da parcial	9	80/3	240
3ra parcial	6	80/3	160
examen	x	20	20x
Total		100	560 + 20x

$$\bar{x} = \frac{\sum p \cdot x}{\sum p} = 7,2 = \frac{560 + 20x}{100} \Rightarrow 100 \cdot 7,2 = 560 + 20x \Rightarrow 720 - 560 = 20x \Rightarrow 160 = 20x$$

$$x = \frac{160}{20} \Rightarrow x = 8$$

LA MEDIANA

La mediana, llamada algunas veces media posicional, es el valor del término medio que divide una distribución de datos ordenados en dos partes iguales, es decir, el 50% de los datos se ubican sobre la mediana o hacia los puntajes altos y el 50% restante hacia los puntajes bajos.

a) Para datos no tabulados

1) Si el número n de datos es impar, la mediana es el dato que se encuentra a la mitad de la lista. Para calcular su posición se aplica la siguiente ecuación:

$$Md = x_{\frac{n+1}{2}} = x_{\frac{n+1}{2}}$$

Ejemplo ilustrativo:

Calcular la mediana de las siguientes calificaciones del curso de Estadística evaluadas sobre diez: 10, 8, 6, 4, 9, 7, 10, 9 y 6


Solución:

Empleando Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	10	8	6	4	9	7	10	6
2								
3	Md	7,5	=MEDIANA(A1:H1)					

Empleando GeoGebra:

Escribir los datos: Mediana[10,8,6,4,9,7,10,6]. Enter



2) Si el número n de datos es par, la mediana es la media aritmética de los dos datos que se encuentran a la mitad de la lista. Para calcular su posición se aplica la siguiente ecuación:

$$Md = \frac{x_{\frac{n}{2}} + x_{\frac{n}{2}+1}}{2}$$

b) Para datos ordenados en tablas de frecuencia

Para calcular la posición de la mediana se aplica la siguiente ecuación:

$$Md = \frac{n + 1}{2}$$

Ejemplo ilustrativo:

Dados los siguientes 20 números: 1, 3, 3, 5, 5, 5, 5, 2, 2, 2, 6, 6, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5

Agrupar los datos en tabla de frecuencia y calcular la mediana.

Solución:

Agrupando en frecuencias

x	f
1	1
2	3
3	2
4	4
5	8
6	2
Total	20

Calculando la posición de la mediana se obtiene:

$$Md = \frac{n + 1}{2} = \frac{20 + 1}{2} = 10,5$$

Como la posición de la mediana es 10,5, su valor es el promedio de los datos décimo y undécimo. Para observar con claridad cuáles son los datos décimo y undécimo se aconseja calcular la frecuencia acumulada.

x	f	fa
1	1	1
2	3	4
3	2	6
4	4	10
5	8	18
6	2	20
Total	20	

Se observa que el décimo dato es 4 y el undécimo es 5, por lo tanto:

$$Md = \frac{4 + 5}{2} = 4,5$$

c) Para datos agrupados en intervalos

$$Md = Li_{md} + \left(\frac{\frac{n}{2} - Fa}{f_{md}} \right) \cdot i$$

En donde:

Li_{md} = Límite inferior del intervalo de clase de la mediana

n = Número total de datos

Fa = Frecuencia acumulada del intervalo de clase que antecede al intervalo de clase de la mediana.

f_{md} = Frecuencia absoluta del intervalo de clase de la mediana

i = Ancho del intervalo

Ejemplo ilustrativo: Calcular la mediana empleando la fórmula y mediante un histograma de frecuencias acumuladas.

Se calcula la frecuencia acumulada como se muestra en la siguiente tabla:

Intervalos	f	fa
[45,55)	6	6
[55,65)	10	16
[65,75)	19	35
[75,85)	11	46
[85,95)	4	50

Solución:

Se calcula la posición de la mediana de la siguiente manera:


$$\frac{n}{2} = \frac{50}{2} = 25$$

Por lo tanto el intervalo o clase de la mediana es [65,75).

Al aplicar la ecuación respectiva se obtiene:

$$Md = Li_{md} + \left(\frac{\frac{n}{2} - Fa}{f_{md}}\right) \cdot i \Rightarrow Md = 65 + \left(\frac{25 - 16}{19}\right) \cdot 10 = 65 + \left(\frac{9}{19}\right) \cdot 10 = 65 + \frac{90}{19} = 69,737$$

Resolviendo de manera gráfica



Observando el gráfico se determina que $Md = 65 + AE$

Los triángulos ABC y AED son semejantes, por lo que se cumple:

$$\frac{AB}{CB} = \frac{AE}{DE}$$


$$\frac{75 - 65}{35 - 16} = \frac{AE}{25 - 16} \Rightarrow \frac{10}{19} = \frac{AE}{9}$$

Despejando AE se obtiene:

$$\frac{10}{19} \cdot 9 = AE \Rightarrow AE = \frac{90}{19} = 4,737$$

Entonces, $Md = 65 + AE = 65 + 4,737 = \rightarrow Md = 69,737$

CUARTILES.- Son cada uno de los 3 valores Q_1, Q_2, Q_3 que dividen a la distribución de los datos en 4 partes iguales.



Nota: $Q_2 = Md$

a) Para Datos No Agrupados

La posición o ubicación de los cuartiles se encuentra aplicando la siguiente ecuación:

$$Q_k = X_{\left[\frac{n \cdot k + 1}{4}\right]} = X_{\left[\frac{n \cdot k + 2}{4}\right]}$$

Donde:

n = número total de datos

k = número del cuartil

Ejemplo ilustrativo: Encuentre los cuartiles dada la siguiente distribución: 6, 9, 9, 12, 12, 12, 15 y 17

Solución:

Para calcular los cuartiles se ordena los datos de menor a mayor

6	9	9	12	12	12	15	17
x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8

Aplicando la ecuación para el cuartil uno se obtiene:

$$Q_k = X_{\left[\frac{n \cdot k + 2}{4}\right]} = X_{\left[\frac{n+2}{4}\right]} = X_{\left[\frac{8+2}{4}\right]} = X_{\left[\frac{10}{4}\right]} = X_{2,5}$$

Como la posición del cuartil 1 es 2,5, su valor es el promedio de los datos segundo y tercero

$$Q_1 = X_{2,5} = \frac{x_2 + x_3}{2} = \frac{9 + 9}{2} = 9$$

O también la posición 2,5 dice que el cuartil 1 está ubicado al 50% del trayecto comprendido entre el segundo dato, que es 9 y el tercer dato que es 9, es decir, $Q_1 = 9 + 0,5(9-9) = 9$

Interpretación: Este resultado indica que el 25% de los datos es inferior a 9

Empleando Excel:

	A	B	C	D
1	6			
2	9			
3	9			
4	12			
5	12			
6	12			
7	15			
8	17			
9				
10	Q_1	9	=CUARTIL.INC(A1:A8;1)	

Empleando GeoGebra:

Aplicando la ecuación para el cuartil dos se obtiene:

$$Q_k = X_{\left[\frac{n \cdot k + 2}{4}\right]} \Rightarrow Q_2 = X_{\left[\frac{n \cdot 2 + 2}{4}\right]} = X_{\left[\frac{2n+2}{4}\right]} = X_{\left[\frac{2 \cdot 8 + 2}{4}\right]} = X_{\left[\frac{16+2}{4}\right]} = X_{4,5} = \frac{x_4 + x_5}{2} = \frac{12 + 12}{2} = 12$$

O también la posición 4,5 dice que el cuartil 2 está ubicado al 50% del trayecto comprendido entre el cuarto dato, que es 12 y el quinto dato que también es 12, es decir,

$$Q_2 = 12 + 0,5(12 - 12) = 12$$


Interpretación: Este resultado indica que el 50% de los datos es inferior a 12

Empleando Excel:

	A	B	C	D
1	6			
2	9			
3	9			
4	12			
5	12			
6	12			
7	15			
8	17			
9				
10	Q ₂	12	=CUARTIL.INC(A1:A8;2)	

Empleando GeoGebra

Para calcular el cuartil 2 se repite los pasos para calcular la Mediana:



Aplicando la ecuación para el cuartil tres se obtiene:


$$Q_k = X_{\lceil \frac{n \cdot k + 2}{4} \rceil} \Rightarrow Q_3 = X_{\lceil \frac{3n + 2}{4} \rceil} = X_{\lceil \frac{3 \cdot 8 + 2}{4} \rceil} = X_{\lceil \frac{24 + 2}{4} \rceil} = X_{\frac{26}{4}} = X_{6,5} = \frac{x_6 + x_7}{2} = \frac{12 + 15}{2} = 13,5$$

O también la posición 6,5 dice que el cuartil 2 está ubicado al 50% del trayecto comprendido entre el doceavo dato, que es 12 y el quinceavo dato que es 15, es decir, $Q_3 = 12 + 0,5(15 - 12)$

$$Q_3 = 12 + 0,5(3) = 12 + 1,5 = 13,5$$

Interpretación: Este resultado indica que el 75% de los datos es inferior a 13,5

Empleando GeoGebra



Empleando Excel:

Repetir los pasos para el cuartil 1, y en la opción de cuartil escribir 3.

	A	B	C	D
1	6			
2	9			
3	9			
4	12			
5	12			
6	12			
7	15			
8	17			
9				
10	Q ₃	12,75	=CUARTIL.INC(A1:A8;3)	

Notas importantes:

-Los cálculos empleando Excel para un número impar de datos coinciden con los cálculos realizados con las ecuaciones.

-Para un número par de datos, aunque en ciertas ocasiones coinciden, suele existir diferencias en los cálculos del Q₁ y Q₃ realizados Empleando Excel. Este error de cálculo es: $e = 0,25d$, en donde d es la distancia de separación de los datos

-Para el Q₁ se resta el error al valor obtenido Empleando Excel

-Para el Q₃ se suma el error al valor obtenido Empleando Excel

En nuestro ejemplo $e = 0,25(x_7 - x_6) = 0,25(15 - 12) = 0,25(3) = 0,75$. Al sumar el error al valor Q₃ inicialmente calculado Empleando Excel se obtiene el valor correcto como se muestra en la siguiente figura:

	A	B	C	D	E
1	6				
2	9				
3	9				
4	12				
5	12				
6	12				
7	15				
8	17				
9					
10	Q ₃	13,5	=CUARTIL.INC(A1:A8;3)+0,25*(A7-A6)		

Diagrama de caja y bigotes


Un diagrama de caja y bigotes es una representación gráfica que ayuda a visualizar una distribución de datos: caja desde Q₁ a Q₃ (50% de los datos), y bigotes el recorrido (distancia desde valor mínimo hasta el valor máximo). De acuerdo al ejemplo ilustrativo del cálculo de cuartiles para datos sin agrupar de la distribución de datos 6, 9, 9, 12, 12, 12, 15 y 17 se obtienen:

Valor mínimo = 6

Q₁ = 9; Q₂ = 12; Q₃ = 13,5

Valor máximo = 17

Por lo tanto el diagrama de caja y bigotes es:



b) Para datos ordenados en tablas de frecuencias

Se aplica la misma ecuación empleada para el cálculo en los datos no agrupados

Ejemplo ilustrativo: Dada la siguiente tabla, calcular el cuartil 2:

x	f
6	1
9	2
12	3
15	1
17	1

Solución:

1) Cálculo del cuartil 2

Aplicando la primera ecuación para el cuartil dos se obtiene:

$$Q_k = X_{\left[\frac{n \cdot k + 2}{4}\right]} \Rightarrow Q_2 = X_{\left[\frac{n \cdot 2 + 2}{4}\right]} = X_{\left[\frac{2(n+1)}{4}\right]} = X_{\left[\frac{n+1}{2}\right]} = X_{\left[\frac{8+1}{2}\right]} = X_{\left[\frac{9}{2}\right]} = X_{4,5}$$

Como la posición del cuartil 2 es 4,5, su valor es el promedio de los datos cuarto y quinto

Para observar con claridad cuáles son los datos cuarto y quinto se aconseja calcular la frecuencia acumulada

x	f	fa
6	1	1
9	2	3
12	3	6
15	1	7
17	1	8

Se observa que el cuarto dato es 12 y el quinto dato es 12, por lo tanto

$$Q_2 = X_{4,5} = \frac{x_4 + x_5}{2} = \frac{12 + 12}{2} = 12$$

c) Para datos agrupados en intervalos

Se emplea la siguiente ecuación:

$$Q_k = Li_Q + \left(\frac{\frac{nk}{4} - Fa}{f_Q} \right) \cdot i$$

Donde:

Li_Q = Límite inferior del intervalo de clase del cuartil

n = Número total de datos

Fa = Frecuencia acumulada del intervalo de clase que antecede al intervalo de clase del cuartil

f_Q = Frecuencia absoluta del intervalo de clase del cuartil

i = Ancho del intervalo de clase del cuartil

Ejemplo ilustrativo: Dado los siguientes datos sobre pesos de un grupo de 50 personas:

Intervalos	f
45- 55	6
55- 65	10
65- 75	19
75- 85	11
85- 95	4

- 1) Calcular el cuartil 1 empleando la ecuación
- 2) Calcular los cuartiles empleando un histograma para $f_{ra}(\%)$ (Frecuencia relativa acumulada mediada en porcentajes)

Solución:

- 1) Cálculo del primer cuartil

Primero se calcula $nk/4$ y después se averigua el intervalo en el que está el cuartil, este intervalo recibe el nombre de intervalo o clase del primer cuartil. Para averiguar el intervalo en el que están los cuartiles se aconseja calcular la frecuencia acumulada

$$\frac{n \cdot k}{4} = \frac{50 \cdot 1}{4} = 12,5$$

Intervalos	f	f_a
45- 55	6	6
55- 65	10	16
65- 75	19	35
75- 85	11	46
85- 95	4	50
n	50	

Por lo tanto en este ejemplo:

El intervalo del segundo cuartil es 55-65.

El número total de datos es $n = 10$

Se observa que 6 valores están por debajo del valor 55, es decir $F_a = 6$.

La frecuencia absoluta f_Q del intervalo del cuartil es 10

El ancho del intervalo del cuartil es $c = 65-55 = 10$.

Al aplicar la ecuación se obtiene:

$$Q_k = Li_Q + \left(\frac{\frac{nk}{4} - F_a}{f_Q} \right) \cdot i = 55 + \left(\frac{\frac{50 \cdot 1}{4} - 6}{10} \right) \cdot 10 = 55 + \left(\frac{\frac{50}{4} - 6}{10} \right) \cdot 10$$


$$Q_1 = 55 + \left(\frac{13}{20} \right) \cdot 10 = 55 + 6,5 = 61,5$$

- 2) Cálculo de los cuartiles empleando un histograma para $f_{ra}(\%)$

2.1) Calculando la $f_{ra}(\%)$ se obtiene:

Intervalos	f	f_a	fr	$f_{ra}(\%)$
45- 55	6	6	0,12	12
55- 65	10	16	0,20	32
65- 75	19	35	0,38	70
75- 85	11	46	0,22	92
85- 95	4	50	0,08	100
N	50			

2.2) Elaborando el histograma empleando Excel y en Paint se obtiene la siguiente figura:



2.3) Cálculo del primer cuartil

Observando en gráfico tenemos que el $Q_1 = 55 + AE$

Los triángulos ABC y AED son semejantes, por lo que se cumple:

$$\frac{AB}{CB} = \frac{AE}{DE}$$

$$\frac{65 - 55}{32 - 12} = \frac{AE}{25 - 12} \Rightarrow \frac{10}{20} = \frac{AE}{13}$$

Despejando AE se obtiene:

$$\frac{10}{20} \cdot 13 = AE \Rightarrow AE = 6,5$$

Entonces, $Q_1 = 55 + 6,5 = 61,5$

2.3) Cálculo del segundo cuartil

Observando en gráfico tenemos que el $Q_2 = 65 + CI$

Los triángulos CFG y CIH son semejantes, por lo que se cumple:

$$\frac{CF}{FG} = \frac{CI}{HI} \Rightarrow \frac{75 - 65}{70 - 32} = \frac{CI}{50 - 32} \Rightarrow \frac{10}{38} = \frac{CI}{18}$$

Despejando CI se obtiene:

$$\frac{10}{38} \cdot 18 = AE \Rightarrow AE = 4,737$$

Entonces, $Q_2 = 65 + 4,737 = 69,737$

2.3) Cálculo del tercer cuartil

Observando en gráfico tenemos que el $Q_3 = 75 + GM$

Los triángulos GJK y GML son semejantes, por lo que se cumple:

$$\frac{GJ}{JK} = \frac{GM}{ML} \Rightarrow \frac{85 - 75}{92 - 70} = \frac{CI}{75 - 70} \Rightarrow \frac{10}{22} = \frac{CI}{5}$$

Despejando CI se obtiene:

$$\frac{10}{22} \cdot 5 = CI \Rightarrow CI = 2,273$$

$$\text{Entonces, } Q_3 = 75 + 2,273 = 77,273$$

B) PERCENTILES O CENTILES

Son cada uno de los 99 valores $P_1, P_2, P_3, \dots, P_{99}$ que dividen a la distribución de los datos en 100 partes iguales.

Nota: $P_{25} = Q_1; P_{50} = Q_2; P_{75} = Q_3$

a) Para datos no tabulados

La posición o ubicación de los percentiles se encuentra aplicando la siguiente ecuación:

$$P_k = X_{\left[\frac{n \cdot k + 1}{100}\right]} = X_{\left[\frac{n \cdot k + 50}{100}\right]}$$

Donde:

n = número total de datos

k = número del percentil

Ejemplo ilustrativo: Calcular los percentiles de orden 20 del peso de diez personas que pesan (en kg) 80, 78, 65, 73, 65, 67, 72, 68, 70 y 72

Solución:

Empleando Excel se obtiene un valor aproximado insertando la función PERCENTIL.INC(A1:A10;0,2) como se muestra en la siguiente figura:

	A	B	C	D	E
1	65				
2	65				
3	67				
4	68				
5	70				
6	72				
7	72				
8	73				
9	78				
10	80				
11					
12	P_{20}	66,6	=PERCENTIL.INC(A1:A10;0,2)		

b) Para datos ordenados en tablas de frecuencia

Se emplea la misma ecuación utilizada en el cálculo de los percentiles para datos sin tabular.

c) Para datos agrupados en intervalos

Se emplea la ecuación:

$$P_k = Li_p + \left(\frac{\frac{nk}{100} - Fa}{f_p} \right) \cdot i$$

Donde:

Li_p = Límite inferior del intervalo de clase del percentil.

n = número total de datos.


F_a = Frecuencia acumulada del intervalo de clase que antecede al intervalo de clase del percentil.

f_p = Frecuencia absoluta del intervalo de clase del percentil.

i = Ancho del intervalo de clase del percentil.

C) DECILES

Son cada uno de los 9 valores $D_1, D_2, D_3, D_4, D_5, D_6, D_7, D_8, D_9$ que dividen a la distribución de los datos en 10 partes iguales.



Nota:

$$D_1 = P_{10}; D_2 = P_{20}; D_3 = P_{30}; D_4 = P_{40}$$

$$D_5 = P_{50} = Q_2 = Md$$

$$D_6 = P_{60}; D_7 = P_{70}; D_8 = P_{80}; D_9 = P_{90}$$

a) Para datos no tabulados

La posición o ubicación de los deciles se encuentra aplicando la siguiente ecuación:

$$D_k = X_{\left[\frac{n \cdot k}{10} + \frac{1}{2} \right]} = X_{\left[\frac{n \cdot k + 5}{10} \right]}$$

Donde:

n = número total de datos.

k = número del decil.

Ejemplo ilustrativo: Calcular el quinto decil de la siguiente distribución: 6, 9, 9, 12, 12, 12, 15 y 17

Solución:

Empleando Excel: Como D_5 es igual a P_{50} :

	A	B	C	D	E
1	6				
2	9				
3	9				
4	12				
5	12				
6	12				
7	15				
8	17				
9					
10	$D_5 = P_{50}$	12	=PERCENTIL.INC(A1:A8;0,5)		

b) Para datos ordenados en tablas de frecuencia

Se emplea la misma ecuación utilizada en el cálculo de los deciles para datos sin tabular.

c) Para datos agrupados en intervalos

Se emplea la siguiente ecuación:

$$D_k = Li_D + \left(\frac{\frac{nk}{10} - Fa}{f_D} \right) \cdot i$$

Donde:

Li_D = Límite inferior del intervalo de clase del decil.


n = número total de datos.

F_a = Frecuencia acumulada del intervalo de clase que antecede al intervalo de clase del decil.

f_D = Frecuencia absoluta del intervalo de clase del decil.

i = Ancho del intervalo de clase del decil.

D) QUINTILES.- Son cada uno de los 4 valores *Quintil 1, Quintil 2, Quintil 3, Quintil 4* que dividen a la distribución de los datos en 5 partes iguales.



Nota:

Quintil 1 = $D_2 = P_{20}$

Quintil 2 = $D_4 = P_{40}$

Quintil 3 = $D_6 = P_{60}$

Quintil 4 = $D_8 = P_{80}$

Para calcular los quintiles se emplean las fórmulas de los deciles o de los Percentiles

MODA

a) Para datos no tabulados

Se observa el dato que tiene mayor frecuencia

Ejemplo ilustrativo N° 1: Determinar la moda del conjunto de datos 2, 4, 6, 8, 8 y 10

Solución: $Mo = 8$, porque es el dato que ocurre con mayor frecuencia. A este conjunto de datos se le llama unimodal

En Excel:

	A	B	C	D
1	2			
2	4			
3	6			
4	8			
5	8			
6	10			
7	Mo	8	=MODA.UNO(A1:A6)	

Ejemplo ilustrativo N° 2: Determinar la moda del conjunto de datos: 2, 4, 6, 8 y 10

Solución: Este conjunto de datos no tiene moda, porque todos los datos tienen la misma frecuencia.

Ejemplo ilustrativo N° 3: Determinar la moda del conjunto de datos: 8, 4, 6, 6, 8, 2 y 10

Solución: Este conjunto de datos tiene dos modas, 8 y 6, y se llama bimodal.

Empleando Excel: Se inserta la función MODA.VARIOS, la cual debe especificarse como fórmula de matriz, para lo cual se selecciona las celdas donde aparecerá la respuesta (B9:B10). Luego se inserta la función MODA.VARIOS, se selecciona las celdas respectivas (A1:A7). Finalmente, se presiona Ctrl+Blog Mayús+Enter.

	A	B	C
1	8		
2	4		
3	6		
4	6		
5	8		
6	2		
7	10		
8	Mo	8	
9		6	

b) Para datos ordenados en tablas de frecuencia

Se observa el dato tiene mayor frecuencia

c) Para datos agrupados en intervalos

Se halla en el intervalo o clase que tenga la frecuencia más alta, llamada intervalo o clase modal. Se emplea la siguiente ecuación:

$$Mo = L_{Mo} + \left(\frac{D_a}{D_a + D_b} \right) \cdot i$$

L_{Mo} = Límite inferior de la clase modal.

D_a = Diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal y la clase que la antecede.

D_b = Diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal y la clase que le sigue.

i = ancho de la clase modal.

VARIANZA Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR

El teorema de Chebyshev, de autoría del matemático ruso Pafnuty Lvovich Chebyshev, establece que para todo conjunto de datos, por lo menos $1 - 1/k^2$ de las observaciones están dentro de k desviaciones estándar de la media, en donde k es cualquier número mayor que 1. Este teorema se expresa de la siguiente manera:

$$1 - \frac{1}{k^2}$$

Así por ejemplo, si se forma una distribución de datos con $k = 3$ desviaciones estándar por debajo de la media hasta 3 desviaciones estándar por encima de la media, entonces por lo menos

$$1 - \frac{1}{3^2} = 1 - \frac{1}{9} = \frac{9 - 1}{9} = \frac{8}{9} = 0,8889 = 88,89\%$$

Interpretación: El 88,89% de todas las observaciones estarán dentro ± 3 desviaciones de la media.

a) Para datos no tabulados

La varianza para una población se calcula con:

$$\sigma^2 = \frac{\sum(x_i - \mu)^2}{N}$$

Donde:

x_i = observaciones individuales de la población

μ = media aritmética poblacional

N = número de observaciones de la población

La desviación estándar poblacional se calcula con:

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{\frac{\sum(x_i - \mu)^2}{N}}$$

La varianza de la muestra se calcula con:

$$s^2 = \frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$

Donde:

x_i = observaciones individuales de la muestra

\bar{x} = media aritmética de la muestra

n = número de observaciones de la muestra

La desviación estándar de una muestra se calculó con:

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

Ejemplo ilustrativo: Considere que los siguientes datos corresponden al sueldo de una población: \$350, \$400, \$500, \$700 y \$1000

1) Calcular la desviación estándar.

2) ¿Cuál es el intervalo que está dentro de $k = 2$ desviaciones estándar de la media?. ¿Qué porcentaje de las observaciones se encuentran dentro de ese intervalo?

Solución:

Empleando Excel:

	A	B	C	D
1	350			
2	400			
3	500			
4	700			
5	1000			
6	σ	237,49	=DESVESTP(A1:A5)	

2) Cálculo del intervalo de $k = 2$ desviaciones estándar de la media.

Se transportan 2 desviaciones estándar ($2 \times \$ 237,4868$) = \$ 474,97 por encima y por debajo de la media $\mu = \$590$

Por lo tanto se tiene un intervalo desde \$ 590 - \$474,97 = \$ 115,03 hasta \$ 590 + \$474,97 = \$ 1064,97

Aplicando el Teorema de Chebyshev

$$1 - \frac{1}{k^2} = 1 - \frac{1}{2^2} = 1 - \frac{1}{4} = \frac{4 - 1}{4} = \frac{3}{4} = 0,75 = 75\%$$

Interpretación: Se puede afirmar de que por lo menos el 75% los sueldos están entre \$ 115,03 y \$ 1064,97

b) Para datos ordenados en tablas de frecuencia

La varianza para una población se calcula con:

$$\sigma^2 = \frac{\sum f(x_i - \mu)^2}{N}$$

Donde:

f = frecuencia absoluta.

La desviación estándar poblacional se calcula con:

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{\frac{\sum f(x_i - \mu)^2}{N}}$$

La varianza de la muestra se calcula con:

$$s^2 = \frac{\sum f(x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$

La desviación estándar de una muestra se calcula con:

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{\sum f(x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

c) Para datos agrupados en intervalos

La varianza para una población se calcula con:

$$\sigma^2 = \frac{\sum f(xm_i - \mu)^2}{N}$$

Donde:

$f = \text{frecuencia absoluta}$; $xm = \text{marca de clase}$

La desviación estándar poblacional se calcula con:

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{\frac{\sum f(xm_i - \mu)^2}{N}}$$

La varianza de la muestra se calcula con:

$$s^2 = \frac{\sum f(xm_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$

La desviación estándar de una muestra se calcula con:

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{\sum f(xm_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

Ejemplo ilustrativo: Calcular la desviación estándar de los siguientes datos correspondientes a una muestra.

Intervalo	f
60-65	5
65-70	20
70-75	40
80-85	27
85-90	8
Total	100

Solución: Se llena la siguiente tabla:

Intervalo	f	xm	$f \cdot xm$
60-65	5	62,5	312,5
65-70	20	67,5	1350
70-75	40	72,5	2900
80-85	27	82,5	2227,5
85-90	8	87,5	700
Total	100		7490

Se calcula la media aritmética.

$$\bar{x} = \frac{\sum f \cdot xm}{n} = \frac{7490}{100} = 74,9$$

Se llena la siguiente tabla:

Intervalo	f	xm	f · xm	xm _i - \bar{x}	(xm _i - \bar{x}) ²	f(xm _i - \bar{x}) ²
60-65	5	62,5	312,5	-12,4	153,76	768,8
65-70	20	67,5	1350	-7,4	54,76	1095,2
70-75	40	72,5	2900	-2,4	5,76	230,4
80-85	27	82,5	2227,5	7,6	57,76	1559,52
85-90	8	87,5	700	12,6	158,76	1270,08
Total	100		7490			4924

Se calcula la desviación estándar.

$$s = \sqrt{\frac{4924}{100 - 1}} = \sqrt{\frac{4924}{99}} = \sqrt{49,737} = 7,052$$

AMPLITUD INTERCUARTÍLICA O RANGO INTERCURTIL

La amplitud intercuartílica es la distancia entre el tercer cuartil Q_3 y el primer cuartil Q_1 .

Amplitud intercuartílica = tercer cuartil - primer cuartil = $Q_3 - Q_1$

RANGO SEMI-INTERCUARTIL O DESVIACIÓN CUARTÍLICA

La desviación cuartílica es la mitad de la distancia entre el tercer cuartil y el primero

$$DQ = \frac{Q_3 - Q_1}{2}$$

Ejemplo ilustrativo: Si el tercer cuartil = 24 y el primer cuartil = 10. ¿Cuál es la desviación cuartílica?

Solución: La amplitud intercuartílica es $24 - 10 = 14$. Por lo tanto, la desviación cuartílica es:

$$DQ = \frac{14}{2}$$

RANGO PERCENTIL O AMPLITUD CUARTÍLICA

Cada conjunto de datos tiene 99 percentiles, que dividen el conjunto en 100 partes iguales.

La amplitud cuartílica es la distancia entre dos percentiles establecidos.

$$Rango\ percentil = P_{90} - P_{10}$$

DISPERSIÓN RELATIVA O COEFICIENTE DE VARIACIÓN

El Coeficiente de variación (CV) es una medida de la dispersión relativa de un conjunto de datos, que se obtiene dividiendo la desviación estándar del conjunto entre su media aritmética y se expresa generalmente en términos porcentuales. Para una población se emplea la siguiente fórmula:

$$CV = \frac{\sigma}{\mu} \cdot 100\%$$

Donde:

CV = Coeficiente de variación; σ = desviación estándar de la población

μ = media aritmética de la población

Para una muestra se emplea la siguiente fórmula:

$$CV = \frac{s}{\bar{x}} \cdot 100\%$$

Donde:

$CV =$ Coeficiente de variación; $s =$ desviación estándar de la muestra
 $\bar{x} =$ media aritmética de la muestra

Ejemplo ilustrativo: Mathías, un estudiante universitario, tiene las siguientes calificaciones en las 10 asignaturas que recibe en su carrera: 8, 7, 10, 9, 8, 7, 8, 10, 9 y 10. Emily, una compañero de Mathías, tiene las siguientes calificaciones: 8, 9, 8, 7, 8, 9, 10, 7, 8 y 10. ¿Cuál estudiante tiene menor variabilidad en sus calificaciones?

Solución: Como se está tomando en cuenta todas las asignaturas, se debe calcular el coeficiente de variación poblacional.

En Excel:

	A	B	C	D	E	F
1	Mathias				Emily	
2	8				7	
3	7				7	
4	10				8	
5	9				8	
6	8				8	
7	7				8	
8	8				9	
9	10				9	
10	9				10	
11	10				10	
12	μ	8,60	=PROMEDIO(A2:A11)		8,40	=PROMEDIO(E2:E11)
13	σ	1,11	=DESVESTP(A2:A11)		1,02	=DESVESTP(E2:E11)
14	CV	12,95	=(B13/B12)*100		12,14	=(E13/E12)*100

Agrupando los datos en tablas de frecuencias:

Para Mathías se obtiene:

Empleando Excel:

	A	B	C	D	E	F
1	x_i	f	$f(x_i - \mu)^2$			
2	7	2	5,12	=B2*(A2-\$B\$7)^2		
3	8	3	1,08	=B3*(A3-\$B\$7)^2		
4	9	2	0,32	=B4*(A4-\$B\$7)^2		
5	10	3	5,88	=B5*(A5-\$B\$7)^2		
6	Total	10	12,4	=SUMA(C2:C5)		
7	μ	8,6	=SUMAPRODUCTO(A2:A5;B2:B5)/SUMA(B2:B5)			
8						
9	σ	1,114	=RAIZ(C6/SUMA(B2:B5))			
10						
11	CV	12,948	=(B9/B7)*100			

Para Emily se obtiene:

Mgs. Mario Suárez

Formulario


Empleando Excel:

	A	B	C	D	E	F
1	x_i	f	$f(x_i - \mu)^2$			
2	7	2	3,92	=B2*(A2-\$B\$7)^2		
3	8	4	0,64	=B3*(A3-\$B\$7)^2		
4	9	2	0,72	=B4*(A4-\$B\$7)^2		
5	10	2	5,12	=B5*(A5-\$B\$7)^2		
6	Total	10	10,4	=SUMA(C2:C5)		
7	μ	8,4	=SUMAPRODUCTO(A2:A5;B2:B5)/SUMA(B2:B5)			
8						
9	σ	1,020	=RAIZ(C6/SUMA(B2:B5))			
10						
11	CV	12,141	=(B9/B7)*100			

Interpretación: Emily tiene menor variabilidad en sus calificaciones

ASIMETRÍA

Es una medida de forma de una distribución que permite identificar y describir la manera como los datos tiende a reunirse de acuerdo con la frecuencia con que se hallen dentro de la distribución. Permite identificar las características de la distribución de datos sin necesidad de generar el gráfico.



a) Coeficiente de Karl Pearson

$$As = \frac{3(\bar{x} - Md)}{s}$$

Donde: \bar{x} = media aritmética ; Md = Mediana ; s = desviación típica o estándar.

Nota:

El Coeficiente de Pearson varía entre -3 y 3

Si $As < 0$ → la distribución será asimétrica negativa.

Si $As = 0$ → la distribución será simétrica.

Si $As > 0$ → la distribución será asimétrica positiva.

b) Medida de Yule Bowley o Medida Cuartílica

$$As = \frac{Q_1 + Q_3 - 2Q_2}{Q_3 - Q_1}$$

Donde: Q_1 = Cuartil uno; Q_2 = Cuartil dos = Mediana; Q_3 = Cuartil tres.

Nota:

La Medida de Bowley varía entre -1 y 1

Si $As < 0$ → la distribución será asimétrica negativa.

Si $As = 0$ → la distribución será simétrica.

Si $As > 0$ → la distribución será asimétrica positiva.

c) Medida de Fisher

Para datos sin agrupar se emplea la siguiente fórmula:

$$As = \frac{\sum(x_i - \bar{x})^3}{n\sigma^3}$$

Para datos agrupados en tablas de frecuencias se emplea la siguiente fórmula:

$$As = \frac{\sum f(x_i - \bar{x})^3}{n\sigma^3}$$

Para datos agrupados en intervalos se emplea la siguiente fórmula:

$$As = \frac{\sum f(xm - \bar{x})^3}{n\sigma^3}$$

Donde:

x_i = cada uno de los valores; n = número de datos; \bar{x} = media aritmética; f = frecuencia absoluta
 σ^3 = cubo de la desviación estándar poblacional; xm = marca de clase

Nota:

Si $As < 0$ → Indica que existe presencia de la minoría de datos en la parte izquierda de la media Si $As = 0$ → la distribución será simétrica

Si $As > 0$ → Indica que existe presencia de la minoría de datos en la parte derecha de la media, aunque en algunos casos no necesariamente indicará que la distribución sea asimétrica positiva

Ejemplo ilustrativo: Calcular el Coeficiente de Pearson, Medida Cuartílica y la Medida de Fisher dada la siguiente distribución: 6, 9, 9, 12, 12, 12, 15 y 17


Solución: Empleando Excel:

	A	B	C	D	E	F
1	Datos	$(x_i - \bar{x})^3$				
2	6	-166,375				
3	9	-15,625				
4	9	-15,625				
5	12	0,125				
6	12	0,125				
7	12	0,125				
8	15	42,875				
9	17	166,375				
10	Total	12	=SUMA(B2:B9)			
11	n	8	=CONTAR(A2:A9)			
12	Media aritmética	11,5	=PROMEDIO(A2:A9)			
13	Desviación estándar	3,5050983	=DESVEST.M(A2:A9)			
14	Desviación poblacional	3,2787193	=DESVEST.P(A2:A9)			
15	Cuartil 1	9	=CUARTIL.INC(A2:A9;1)			
16	Cuartil 2	12	=CUARTIL.INC(A2:A9;2)			
17	Cuartil 3	13,5	=CUARTIL.INC(A2:A9;3)+0,25*(A8-A7)			
18	Coeficiente de Pearson					
19	$As = \frac{3(\bar{x} - Md)}{s}$	-0,4279481	=3*(B12-B16)/B13			
20						
21	Medida de Bowley					
22	$As = \frac{Q_1 + Q_3 - 2Q_2}{Q_3 - Q_1}$	-0,3333333	=(B15+B17-2*B16)/(B17-B15)			
23						
24	Medida de Fisher					
25	$As = \frac{\sum(x_i - \bar{x})^3}{n\sigma^3}$	0,0425577	=B10/(B11*B14^3)			
26						
27	Coeficiente de Asimetría en Excel		0,0530788	=COEFICIENTE.ASIMETRIA(A2:A9)		

Nota: El COEFICIENTE.ASIMETRIA(A2:A9) es un valor que tiene consideraciones semejantes a la Medida de Fisher

CURTOSIS O APUNTAMIENTO

La curtosis mide el grado de agudeza o achatamiento de una distribución con relación a la distribución normal, es decir, mide cuán puntiaguda es una distribución.



a) Medida de Fisher

Para datos sin agrupar se emplea la siguiente fórmula:

$$\alpha = \frac{\sum(x_i - \bar{x})^4}{n\sigma^4}$$

Para datos agrupados en tablas de frecuencias se emplea la siguiente fórmula:

$$\alpha = \frac{\sum f(x_i - \bar{x})^4}{n\sigma^4}$$

Para datos agrupados en intervalos se emplea la siguiente fórmula:

$$\alpha = \frac{\sum f(xm - \bar{x})^4}{n\sigma^4}$$

Donde: x_i = cada uno de los valores; n = número de datos; \bar{x} = media aritmética; σ^4 = Cuádruplo de la desviación estándar poblacional; f = frecuencia absoluta; xm = marca de clase

Nota: Si $\alpha < 3 \rightarrow$ la distribución es platicúrtica; Si $\alpha = 3 \rightarrow$ la distribución es normal o mesocúrtica
Si $\alpha > 3 \rightarrow$ la distribución es leptocúrtica

b) Medida basada en Cuartiles y Percentiles

$$\kappa = \frac{\text{Desviación cuartílica}}{\text{Amplitud cuartílica}} = \frac{Q_3 - Q_1}{P_{90} - P_{10}} = \frac{Q_3 - Q_1}{2(P_{90} - P_{10})}$$

κ (letra griega minúscula kappa) = Coeficiente percentil de curtosis

Nota: Si $\kappa < 0,263 \rightarrow$ la distribución es platicúrtica; Si $\kappa = 0,263 \rightarrow$ la distribución es normal o mesocúrtica; Si $\kappa > 0,263 \rightarrow$ la distribución es leptocúrtica

Ejemplo ilustrativo: Determinar qué tipo de curtosis tiene la siguiente distribución: 6, 9, 9, 12, 12, 12, 15 y 17. Emplear la medida de Fisher y el coeficiente percentil de curtosis.

Solución: *Empleando Excel:*

	A	B	C	D	E	F
1	Datos	$(x_i - \bar{x})^4$				
2	6	915,063				
3	9	39,063				
4	9	39,063				
5	12	0,063				
6	12	0,063				
7	12	0,063				
8	15	150,063				
9	17	915,063				
10	Total	2058,500	=SUMA(B2:B9)			
11	n	8	=CONTAR(A2:A9)			
12	Media aritmética	11,5	=PROMEDIO(A2:A9)			
13	Desviación poblacional	3,279	=DESVEST.P(A2:A9)			
14	Cuartil 1	9	=CUARTIL.INC(A2:A9;1)			
15	Cuartil 3	13,5	=CUARTIL.INC(A2:A9;3)+0,25*(A8-A7)			
16	$\alpha = \frac{\sum(x_i - \bar{x})^4}{n\sigma^4}$	2,226609	=B10/(B11*B13^4)			
17						
18	Perceltil 10	7,4	=PERCENTIL.INC(A2:A9;0,1)-0,25*(A3-A2)			
19	Perceltil 90	16,350	=PERCENTIL.INC(A2:A9;0,9)+0,25*(A8-A7)			
20	$\kappa = \frac{Q_3 - Q_1}{2(P_{90} - P_{10})}$	0,2500	=(B15-B14)/(2*(B19-B18))			
21						
22						
23	Curtosis en Excel	-0,224121	=CURTOSIS(A2:A9)			
24	Valor semejante a la α	2,7758789	=B23+3			

CORRELACIÓN Y REGRESIÓN

Cuando se estudian en forma conjunta dos características (variables estadísticas) de una población o muestra, se dice que estamos analizando una variable estadística bidimensional. La correlación es el grado de relación que existe entre ambas características, y la regresión es la forma de expresar matemáticamente dicha relación.

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE KARL PEARSON

Llamando también coeficiente de correlación producto-momento.

a) Para datos no agrupados se calcula aplicando la siguiente ecuación:

$$r = \frac{\sum xy}{\sqrt{(\sum x^2)(\sum y^2)}}$$

r = Coeficiente producto-momento de correlación lineal; $x = X - \bar{X}$; $y = Y - \bar{Y}$


Ejemplo ilustrativo: Con los datos sobre las temperaturas en dos días diferentes en una ciudad, determinar el tipo de correlación que existe entre ellas mediante el coeficiente de PEARSON.

X	18	17	15	16	14	12	9	15	16	14	16	18	$\Sigma X = 180$
Y	13	15	14	13	9	10	8	13	12	13	10	8	$\Sigma Y = 138$

Empleando Excel:

	A	B	C	D	E	F
1	X	Y				
2	18	13				
3	17	15				
4	15	14				
5	16	13				
6	14	9				
7	12	10				
8	9	8				
9	15	13				
10	16	12				
11	14	13				
12	16	10				
13	18	8				
14						
15	r	0,416	=COEF.DE.CORREL(A2:A13;B2:B13)			

Empleando GeoGebra



b) Para datos agrupados, el coeficiente de Correlación de Pearson se calcula aplicando la siguiente fórmula:

$$r = \frac{n \cdot \sum f \cdot dx \cdot dy - (\sum fx \cdot dx) (\sum fy \cdot dy)}{\sqrt{[n \cdot \sum fx \cdot dx^2 - (\sum fx \cdot dx)^2][n \cdot \sum fy \cdot dy^2 - (\sum fy \cdot dy)^2]}}$$

Donde:

n = número de datos; f = frecuencia de celda; fx = frecuencia de la variable X; fy = frecuencia de la variable Y; dx = valores codificados o cambiados para los intervalos de la variable X, procurando que al intervalo central le corresponda $dx = 0$, para que se hagan más fáciles los cálculos; dy = valores codificados o cambiados para los intervalos de la variable X, procurando que al intervalo central le corresponda $dy = 0$, para que se hagan más fáciles los cálculos.

Ejemplo ilustrativo: Con los siguientes datos sobre los Coeficientes Intellectuales (X) y de las calificaciones en una prueba de conocimiento (Y) de 50 estudiantes:

N° de estudiante	X	Y	N° de estudiante	X	Y
1	76	28	26	88	40
2	77	24	27	88	31
3	78	18	28	88	35
4	79	41	29	88	26
5	79	43	30	89	30
6	80	45	31	89	24
7	80	34	32	90	18
8	80	18	33	90	11
9	82	40	34	90	15
10	82	35	35	91	38
11	83	30	36	92	34
12	83	21	37	92	31
13	83	22	38	93	33
14	83	23	39	93	35
15	84	25	40	93	24
16	84	11	41	94	40
17	84	15	42	96	35
18	85	31	43	97	36
19	85	35	44	98	40
20	86	26	45	99	33
21	86	30	46	100	51
22	86	24	47	101	54
23	86	16	48	101	55
24	87	20	49	102	41
25	88	36	50	102	45

- 1) Elaborar una tabla de dos variables
- 2) Calcular el coeficiente de correlación

Solución: En la *tabla de frecuencias de dos variables*, cada recuadro de esta tabla se llama una *celda* y corresponde a un par de intervalos, y el número indicado en cada celda se llama *frecuencia de celda*. Todos los totales indicados en la última fila y en la última columna se llaman *totales marginales o frecuencias marginales*, y corresponden, respectivamente, a las frecuencias de intervalo de las distribuciones de frecuencia separadas de la variable X y Y.

Para elaborar la tabla se recomienda:

- Agrupar las variables X y Y en un igual número de intervalos.
- Los intervalos de la variable X se ubican en la parte superior de manera horizontal (fila) y en orden ascendente.
- Los intervalos de la variable Y se ubican en la parte izquierda de manera vertical (columna) y en orden descendente.

Para elaborar los intervalos se procede a realizar los cálculos respectivos:

En la variable X:

Calculando el Rango se obtiene:

$$R = x_{\text{máx}} - x_{\text{mín}} = 102 - 76 = 26$$

Calculando el número de intervalos se obtiene:

$$n_i = 1 + 3,32 \cdot \log(n) = 1 + 3,32 \cdot \log 50 = 6,6 = 7$$

Calculando el ancho se obtiene:

$$i = \frac{R}{n_i} = \frac{26}{6,6} = 3,93 = 4$$

En la variable Y:

Calculando el Rango se obtiene:

$$R = y_{máx} - y_{mín} = 55 - 11 = 44$$

Calculando el número de intervalos se obtiene:

$$n_i = 1 + 3,32 \cdot \log(n) = 1 + 3,32 \cdot \log 50 = 6,64 = 7$$

Calculando el ancho se obtiene:

$$i = \frac{R}{n_i} = \frac{44}{6,64} = 6,62 = 7$$

Nota: Para la variable X se tomará un ancho de intervalo igual a 4 y para la variable Y un ancho de intervalo igual a 7. Debe quedar igual número de intervalos para cada variable, que en este ejemplo es igual a 7.

Contando las frecuencias de celda para cada par de intervalos de las variables X y Y se obtiene la siguiente tabla de frecuencias de dos variables:

		Coeficientes Intelectuales (X)							fy
		76-79	80-83	84-87	88-91	92-95	96-99	100-103	
Calificaciones (Y)	53-59							2	2
	46-52							1	1
	39-45	2	2		1	1	1	2	9
	32-38		2	1	3	3	3		12
	25-31	1	1	4	3	1			10
	18-24	2	4	2	2	1			11
	11-17			3	2				5
	fx	5	9	10	11	6	4	5	50

Interpretación:

- El número 2 es la frecuencia de la celda correspondiente al par de intervalos 76-79 en Coeficiente Intelectual y 39-45 en Calificación obtenida en la prueba de conocimiento.
- El número 5 en la fila de fx es el total marginal o frecuencia marginal del intervalo 76-79 en Coeficiente Intelectual.
- El número 2 en la columna de fy es el total marginal o frecuencia marginal del intervalo 53-59 en Calificación obtenida en la prueba de conocimiento.
- El número 50 es total de frecuencias marginales y representa al número total de estudiantes.

$$r = \frac{n \cdot \sum f \cdot dx \cdot dy - (\sum fx \cdot dx)(\sum fy \cdot dy)}{\sqrt{[n \cdot \sum fx \cdot dx^2 - (\sum fx \cdot dx)^2][n \cdot \sum fy \cdot dy^2 - (\sum fy \cdot dy)^2]}}$$

$$r = \frac{50 \cdot 70 - (-14)(-30)}{\sqrt{[50 \cdot 158 - (-14)^2][50 \cdot 130 - (-30)^2]}} = \frac{3500 - 420}{\sqrt{[7900 - 196][6500 - 900]}} = \frac{3080}{\sqrt{[7704][5600]}}$$

$$r = \frac{3080}{\sqrt{43142400}} = \frac{3080}{6568,287448} = 0,469$$

Existe una correlación positiva moderada

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN POR RANGOS DE SPEARMAN

Este coeficiente se emplea cuando una o ambas escalas de medidas de las variables son ordinales, es decir, cuando una o ambas escalas de medida son posiciones. Ejemplo: Orden de llegada en una carrera y peso de los atletas. Se calcula aplicando la siguiente ecuación:

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum d^2}{n(n^2 - 1)}$$


r_s = Coeficiente de correlación por rangos de Spearman; d = Diferencia entre los rangos (X menos Y)
 n = número de datos

Ejemplo ilustrativo N° 1: La siguiente tabla muestra el rango u orden obtenido en la primera evaluación (X) y el rango o puesto obtenido en la segunda evaluación (Y) de 8 estudiantes universitarios en la asignatura de Estadística. Calcular el coeficiente de correlación por rangos de Spearman.

Estudiante	X	Y
Dyanita	1	3
Elizabeth	2	4
Mario	3	1
Orlando	4	5
Mathías	5	6
Josué	6	2
Emily	7	8
Monserrath	8	7

En Excel:

	A	B	C	D	E	F	G
1	Estudiante	X	Y				
2	Dyanita	1	3				
3	Elizabeth	2	4				
4	Mario	3	1				
5	Orlando	4	5				
6	Mathías	5	6				
7	Josué	6	2				
8	Emily	7	8				
9	Monserrat	8	7				
10				0,619	=COEF.DE.CORREL(B2:B9;C2:C9)		



Ejemplo ilustrativo N° 2: La siguiente tabla muestra las calificaciones de 8 estudiantes universitarios en las asignaturas de Matemática y Estadística. Calcular el coeficiente de correlación por rangos de Spearman.

N°	Estudiante	Matemática	Estadística
1	Dyana	10	8
2	Elizabeth	9	6
3	Mario	8	10
4	Orlando	7	9
5	Mathías	7	8
6	Josué	6	7
7	Emily	6	6
8	Monserath	4	9

Solución:

Para calcular el coeficiente de correlación por rangos de Spearman se procede a clasificar u ordenar los datos en rangos (X para Matemática y Y para Estadística) tomando en cuenta las siguientes observaciones:

En la asignatura de Matemática se observa:

- Dyana tiene la más alta calificación, ocupando el primer puesto, por lo que su rango es 1
- Elizabeth ocupa el segundo puesto, por lo que su rango es 2
- Mario se encuentra ubicado en el tercer lugar, por lo que su rango es 3
- Orlando y Mathías ocupan el cuarto y quinto puesto, por lo que su rango es la media aritmética de 4 y 5 que da por resultado 4,5
- Josué y Emily ocupan el sexto y séptimo lugar, por lo que su rango es la media aritmética de 6 y 7 que da por resultado 6,5
- Monserath se encuentra ubicada en el octavo lugar, por lo que su rango es 8

En la asignatura de Estadística se procede como en Matemática.

Los rangos X y Y se presentan en la siguiente tabla:

N°	Estudiante	Matemática	Estadística	X	Y
1	Dyana	10	8	1	4,5
2	Elizabeth	9	6	2	7,5
3	Mario	8	10	3	1
4	Orlando	7	9	4,5	2,5
5	Mathías	7	8	4,5	4,5
6	Josué	6	7	6,5	6
7	Emily	6	6	6,5	7,5
8	Monserath	4	9	8	2,5

Calculando d , d^2 y Σd^2 se obtiene los siguientes resultados:

Nº	Estudiante	Matemática	Estadística	X	Y	$d = X - Y$	$d^2 = (X - Y)^2$
1	Dyana	10	8	1	4,5	-3,5	12,25
2	Elizabeth	9	6	2	7,5	-5,5	30,25
3	Mario	8	10	3	1	2	4
4	Orlando	7	9	4,5	2,5	2	4
5	Mathías	7	8	4,5	4,5	0	0
6	Josué	6	7	6,5	6	0,5	0,25
7	Emily	6	6	6,5	7,5	-1	1
8	Monserrath	4	9	8	2,5	5,5	30,25
							$\Sigma d^2 = 82$

Aplicando la fórmula se obtiene:

$$r_s = 1 - \frac{6 \Sigma d^2}{n(n^2 - 1)} = 1 - \frac{6 \cdot 82}{8(8^2 - 1)} = 1 - \frac{492}{504} = \frac{504 - 492}{504} = \frac{12}{504} = 0,024$$

COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN

Revela qué porcentaje del cambio en Y se explica por un cambio en X. Se calcula elevando al cuadrado el coeficiente de correlación.

$$r = \frac{\Sigma xy}{\sqrt{(\Sigma x^2)(\Sigma y^2)}}$$

$x = X - \bar{X}$; $y = Y - \bar{Y}$; r = Coeficiente de correlación de Pearson; r^2 = Coeficiente de determinación

La ecuación del coeficiente producto-momento (Coeficiente de Pearson) $r = \frac{\Sigma xy}{\sqrt{(\Sigma x^2)(\Sigma y^2)}}$ puede escribirse en la forma equivalente:

$$\text{Coeficiente de Pearson} = r = \frac{N \Sigma XY - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{\sqrt{[N \Sigma X^2 - (\Sigma X)^2][N \Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2]}}$$

De donde coeficiente de determinación $= r^2 = (\text{Coeficiente de Pearson})^2$

Nota: El r^2 tiene significado sólo para las relaciones lineales. Dos variables pueden tener $r^2 = 0$ y sin embargo estar relacionadas en sentido curvilíneo. El valor de r^2 no se interpreta como si la variable Y fuera causado por un cambio de la variable X, ya que la correlación no significa causa.

ANÁLISIS DE REGRESIÓN

La regresión examina la relación entre dos variables, pero restringiendo una de ellas con el objeto de estudiar las variaciones de una variable cuando la otra permanece constante. En otras palabras, la regresión es un método que se emplea para predecir el valor de una variable en función de valores dados a la otra variable.

a) LA RECTA DE LOS MÍNIMOS CUADRADOS

Se llama línea de mejor ajuste y se define como la línea que hace mínima la suma de los cuadrados de las desviaciones respecto a ella de todos los puntos que corresponden a la información recogida.

La recta de los mínimos cuadrados que aproxima el conjunto de puntos $(X_1, Y_1), (X_2, Y_2), (X_3, Y_3), \dots \dots (X_N, Y_N)$ tomando en cuenta a Y como variable dependiente tiene por ecuación

$$Y = a_0 + a_1X$$

A esta ecuación suele llamarse recta de regresión de Y sobre X, y se usa para estimar los valores de Y para valores dados de X

Si a la recta de regresión $Y = a_0 + a_1X$ se le suma en ambos lados $\sum Y = \sum(a_0 + a_1X)$ se obtiene $\sum Y = a_0N + a_1 \sum X$

Si a la recta de regresión $Y = a_0 + a_1X$ se multiplica por X a ambos lados y luego se suma $\sum XY = \sum X(a_0 + a_1X)$ se obtiene $\sum XY = a_0 \sum X + a_1 \sum X^2$

Las constantes a_0 y a_1 quedan fijadas al resolver simultáneamente las ecuaciones anteriormente encontradas, es decir, al resolver el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} \sum Y = a_0N + a_1\sum X \\ \sum XY = a_0\sum X + a_1\sum X^2 \end{cases}$$

Que se llaman las ecuaciones normales para la recta de mínimos cuadrados.

Las constantes a_0 y a_1 de las anteriores ecuaciones también se pueden calcular empleando las siguientes fórmulas:

$$a_0 = \frac{\sum Y \cdot \sum X^2 - \sum X \cdot \sum XY}{N \sum X^2 - (\sum X)^2} \quad a_1 = \frac{N \sum XY - \sum X \cdot \sum Y}{N \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

Otra ecuación para los mínimos cuadrados para $x = X - \bar{X}$, $y = Y - \bar{Y}$ de la recta de regresión de Y sobre X es:

$$y = \left(\frac{\sum xy}{\sum x^2} \right) x$$

La recta de los mínimos cuadrados que aproxima el conjunto de puntos $(X_1, Y_1), (X_2, Y_2), (X_3, Y_3), \dots, (X_N, Y_N)$ tomando en cuenta a X como variable dependiente tiene por ecuación:

$$X = b_0 + b_1Y$$

A esta ecuación suele llamarse recta de regresión de X sobre Y , y se usa para estimar los valores de X para valores dados de Y . Las constantes b_0 y b_1 quedan fijadas al resolver el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} \sum X = b_0N + b_1\sum Y \\ \sum XY = b_0\sum Y + b_1\sum Y^2 \end{cases}$$

Las constantes b_0 y b_1 del sistema de ecuaciones anterior se pueden calcular empleando las siguientes fórmulas:

$$b_0 = \frac{\sum X \cdot \sum Y^2 - \sum Y \cdot \sum XY}{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2} \quad b_1 = \frac{N \sum XY - \sum X \cdot \sum Y}{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2}$$

Otra ecuación para los mínimos cuadrados para $x = X - \bar{X}$, $y = Y - \bar{Y}$ es:

$$x = \left(\frac{\sum xy}{\sum y^2} \right) y$$

El punto de intersección entre las rectas $Y = a_0 + a_1X$ con $X = b_0 + b_1Y$ se simboliza (\bar{X}, \bar{Y}) y se llama centroide o centro de gravedad

b) LA PARÁBOLA DE LOS MÍNIMOS CUADRADOS

La parábola de mínimos cuadrados que aproxima el conjunto de puntos $(X_1, Y_1), (X_2, Y_2), (X_3, Y_3), \dots (X_N, Y_N)$ tiene ecuación dada por $Y = a_0 + a_1X + a_2X^2$, donde las constantes a_0, a_1 y a_2 se determinan al resolver simultáneamente el sistema de ecuaciones que se forma al multiplicar la ecuación $Y = a_0 + a_1X + a_2X^2$ por $1, X, X^2$ sucesivamente, y sumando después.

$$\begin{cases} \Sigma Y = a_0N + a_1\Sigma X + a_2\Sigma X^2 \\ \Sigma XY = a_0\Sigma X + a_1\Sigma X^2 + a_2\Sigma X^3 \\ \Sigma X^2Y = a_0\Sigma X^2 + a_1\Sigma X^3 + a_2\Sigma X^4 \end{cases}$$

ERROR ESTÁNDAR DE ESTIMACIÓN

Es el grado de dispersión de los datos con respecto a la recta de regresión $Y = a_0 + a_1X$. El error estándar de estimación se calcula con la fórmula:

$$s_e = \sqrt{\frac{\Sigma(Y_i - Y_{est})^2}{N - 2}}$$

Donde:

Y_i = cada valor de Y

Y_{est} = valor estimado de Y a partir de la recta de regresión

N = número de datos

Otras ecuaciones para calcular el error estándar de estimación son:

$$s_e = \sqrt{\frac{\Sigma Y^2 - a_0 \Sigma Y - a_1 \Sigma XY}{N - 2}} \quad s_e = \sqrt{\frac{\Sigma y^2 - a_1 \Sigma xy}{N - 2}}$$

Donde:

a_0 = ordenada en el origen (punto de intersección de la recta con el eje y)

a_1 = pendiente de la recta (tangente del ángulo de inclinación de la recta)

$x = X - \bar{X}$

$y = Y - \bar{Y}$

Ejemplo ilustrativo: Calcular error estándar de estimación empleando las 3 fórmulas dadas, utilizando los datos de la tabla del ejemplo para ajustar la recta de mínimos cuadrados para Y como variable dependiente.

X	152	157	162	167	173	178	182	188
Y	56	61	67	72	70	72	83	92

Empleando exclusivamente Excel para calcular el error estándar de estimación se procede de la siguiente manera:

Se inserta la función ERROR.TÍPICO.XY. Se selecciona las celdas respectivas. Pulsar en Aceptar.

	A	B	C	D
1	X	Y		
2	152	56		
3	157	61		
4	162	67		
5	167	72		
6	173	70		
7	178	72		
8	182	83		
9	188	92		
10	4,06417	=ERROR.TÍPICO.XY(B2:B9;A2:A9)		

Interpretación: El valor de $s_e = 4,064$, significa que los puntos están dispersos a una distancia de 4,064 de la recta de regresión.

TABLAS DE DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD

Las siguientes tablas de probabilidad fueron elaboradas empleando Excel para los cálculos y Winstats para la gráficas

**TABLA N° 1
DISTRIBUCIÓN BINOMIAL**

Ejemplo: Para $n = 4$ y $p = 0,45 \Rightarrow P(X = 2) = 0,3675$


n	X	P									
		0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5
1	0	0,9500	0,9000	0,8500	0,8000	0,7500	0,7000	0,6500	0,6000	0,5500	0,5000
1	1	0,0500	0,1000	0,1500	0,2000	0,2500	0,3000	0,3500	0,4000	0,4500	0,5000
2	0	0,9025	0,8100	0,7225	0,6400	0,5625	0,4900	0,4225	0,3600	0,3025	0,2500
2	1	0,0950	0,1800	0,2550	0,3200	0,3750	0,4200	0,4550	0,4800	0,4950	0,5000
2	2	0,0025	0,0100	0,0225	0,0400	0,0625	0,0900	0,1225	0,1600	0,2025	0,2500
3	0	0,8574	0,7290	0,6141	0,5120	0,4219	0,3430	0,2746	0,2160	0,1664	0,1250
3	1	0,1354	0,2430	0,3251	0,3840	0,4219	0,4410	0,4436	0,4320	0,4084	0,3750
3	2	0,0071	0,0270	0,0574	0,0960	0,1406	0,1890	0,2389	0,2880	0,3341	0,3750
3	3	0,0001	0,0010	0,0034	0,0080	0,0156	0,0270	0,0429	0,0640	0,0911	0,1250
4	0	0,8145	0,6561	0,5220	0,4096	0,3164	0,2401	0,1785	0,1296	0,0915	0,0625
4	1	0,1715	0,2916	0,3685	0,4096	0,4219	0,4116	0,3845	0,3456	0,2995	0,2500
4	2	0,0135	0,0486	0,0975	0,1536	0,2109	0,2646	0,3105	0,3456	0,3675	0,3750
4	3	0,0005	0,0036	0,0115	0,0256	0,0469	0,0756	0,1115	0,1536	0,2005	0,2500
4	4	0,0000	0,0001	0,0005	0,0016	0,0039	0,0081	0,0150	0,0256	0,0410	0,0625
5	0	0,7738	0,5905	0,4437	0,3277	0,2373	0,1681	0,1160	0,0778	0,0503	0,0313
5	1	0,2036	0,3281	0,3915	0,4096	0,3955	0,3602	0,3124	0,2592	0,2059	0,1563
5	2	0,0214	0,0729	0,1382	0,2048	0,2637	0,3087	0,3364	0,3456	0,3369	0,3125
5	3	0,0011	0,0081	0,0244	0,0512	0,0879	0,1323	0,1811	0,2304	0,2757	0,3125
5	4	0,0000	0,0005	0,0022	0,0064	0,0146	0,0284	0,0488	0,0768	0,1128	0,1563
5	5	0,0000	0,0000	0,0001	0,0003	0,0010	0,0024	0,0053	0,0102	0,0185	0,0313
6	0	0,7351	0,5314	0,3771	0,2621	0,1780	0,1176	0,0754	0,0467	0,0277	0,0156
6	1	0,2321	0,3543	0,3993	0,3932	0,3560	0,3025	0,2437	0,1866	0,1359	0,0938
6	2	0,0305	0,0984	0,1762	0,2458	0,2966	0,3241	0,3280	0,3110	0,2780	0,2344
6	3	0,0021	0,0146	0,0415	0,0819	0,1318	0,1852	0,2355	0,2765	0,3032	0,3125
6	4	0,0001	0,0012	0,0055	0,0154	0,0330	0,0595	0,0951	0,1382	0,1861	0,2344
6	5	0,0000	0,0001	0,0004	0,0015	0,0044	0,0102	0,0205	0,0369	0,0609	0,0938
6	6	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0002	0,0007	0,0018	0,0041	0,0083	0,0156
7	0	0,6983	0,4783	0,3206	0,2097	0,1335	0,0824	0,0490	0,0280	0,0152	0,0078
7	1	0,2573	0,3720	0,3960	0,3670	0,3115	0,2471	0,1848	0,1306	0,0872	0,0547
7	2	0,0406	0,1240	0,2097	0,2753	0,3115	0,3177	0,2985	0,2613	0,2140	0,1641
7	3	0,0036	0,0230	0,0617	0,1147	0,1730	0,2269	0,2679	0,2903	0,2918	0,2734
7	4	0,0002	0,0026	0,0109	0,0287	0,0577	0,0972	0,1442	0,1935	0,2388	0,2734
7	5	0,0000	0,0002	0,0012	0,0043	0,0115	0,0250	0,0466	0,0774	0,1172	0,1641
7	6	0,0000	0,0000	0,0001	0,0004	0,0013	0,0036	0,0084	0,0172	0,0320	0,0547
7	7	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0002	0,0006	0,0016	0,0037	0,0078
8	0	0,6634	0,4305	0,2725	0,1678	0,1001	0,0576	0,0319	0,0168	0,0084	0,0039
8	1	0,2793	0,3826	0,3847	0,3355	0,2670	0,1977	0,1373	0,0896	0,0548	0,0313
8	2	0,0515	0,1488	0,2376	0,2936	0,3115	0,2965	0,2587	0,2090	0,1569	0,1094

8	3	0,0054	0,0331	0,0839	0,1468	0,2076	0,2541	0,2786	0,2787	0,2568	0,2188
8	4	0,0004	0,0046	0,0185	0,0459	0,0865	0,1361	0,1875	0,2322	0,2627	0,2734
8	5	0,0000	0,0004	0,0026	0,0092	0,0231	0,0467	0,0808	0,1239	0,1719	0,2188
8	6	0,0000	0,0000	0,0002	0,0011	0,0038	0,0100	0,0217	0,0413	0,0703	0,1094
8	7	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0004	0,0012	0,0033	0,0079	0,0164	0,0313
8	8	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0002	0,0007	0,0017	0,0039
n	X	P									
9	0	0,6302	0,3874	0,2316	0,1342	0,0751	0,0404	0,0207	0,0101	0,0046	0,0020
9	1	0,2985	0,3874	0,3679	0,3020	0,2253	0,1556	0,1004	0,0605	0,0339	0,0176
9	2	0,0629	0,1722	0,2597	0,3020	0,3003	0,2668	0,2162	0,1612	0,1110	0,0703
9	3	0,0077	0,0446	0,1069	0,1762	0,2336	0,2668	0,2716	0,2508	0,2119	0,1641
9	4	0,0006	0,0074	0,0283	0,0661	0,1168	0,1715	0,2194	0,2508	0,2600	0,2461
9	5	0,0000	0,0008	0,0050	0,0165	0,0389	0,0735	0,1181	0,1672	0,2128	0,2461
9	6	0,0000	0,0001	0,0006	0,0028	0,0087	0,0210	0,0424	0,0743	0,1160	0,1641
9	7	0,0000	0,0000	0,0000	0,0003	0,0012	0,0039	0,0098	0,0212	0,0407	0,0703
9	8	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0004	0,0013	0,0035	0,0083	0,0176
9	9	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0003	0,0008	0,0020
n	X	P									
10	0	0,5987	0,3487	0,1969	0,1074	0,0563	0,0282	0,0135	0,0060	0,0025	0,0010
10	1	0,3151	0,3874	0,3474	0,2684	0,1877	0,1211	0,0725	0,0403	0,0207	0,0098
10	2	0,0746	0,1937	0,2759	0,3020	0,2816	0,2335	0,1757	0,1209	0,0763	0,0439
10	3	0,0105	0,0574	0,1298	0,2013	0,2503	0,2668	0,2522	0,2150	0,1665	0,1172
10	4	0,0010	0,0112	0,0401	0,0881	0,1460	0,2001	0,2377	0,2508	0,2384	0,2051
10	5	0,0001	0,0015	0,0085	0,0264	0,0584	0,1029	0,1536	0,2007	0,2340	0,2461
10	6	0,0000	0,0001	0,0012	0,0055	0,0162	0,0368	0,0689	0,1115	0,1596	0,2051
10	7	0,0000	0,0000	0,0001	0,0008	0,0031	0,0090	0,0212	0,0425	0,0746	0,1172
10	8	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0004	0,0014	0,0043	0,0106	0,0229	0,0439
10	9	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0005	0,0016	0,0042	0,0098
10	10	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0003	0,0010
n	X	P									
11	0	0,5688	0,3138	0,1673	0,0859	0,0422	0,0198	0,0088	0,0036	0,0014	0,0005
11	1	0,3293	0,3835	0,3248	0,2362	0,1549	0,0932	0,0518	0,0266	0,0125	0,0054
11	2	0,0867	0,2131	0,2866	0,2953	0,2581	0,1998	0,1395	0,0887	0,0513	0,0269
11	3	0,0137	0,0710	0,1517	0,2215	0,2581	0,2568	0,2254	0,1774	0,1259	0,0806
11	4	0,0014	0,0158	0,0536	0,1107	0,1721	0,2201	0,2428	0,2365	0,2060	0,1611
11	5	0,0001	0,0025	0,0132	0,0388	0,0803	0,1321	0,1830	0,2207	0,2360	0,2256
11	6	0,0000	0,0003	0,0023	0,0097	0,0268	0,0566	0,0985	0,1471	0,1931	0,2256
11	7	0,0000	0,0000	0,0003	0,0017	0,0064	0,0173	0,0379	0,0701	0,1128	0,1611
11	8	0,0000	0,0000	0,0000	0,0002	0,0011	0,0037	0,0102	0,0234	0,0462	0,0806
11	9	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0005	0,0018	0,0052	0,0126	0,0269
11	10	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0002	0,0007	0,0021	0,0054
11	11	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0002	0,0002	0,0005
n	X	P									
12	0	0,5404	0,2824	0,1422	0,0687	0,0317	0,0138	0,0057	0,0022	0,0008	0,0002
12	1	0,3413	0,3766	0,3012	0,2062	0,1267	0,0712	0,0368	0,0174	0,0075	0,0029
12	2	0,0988	0,2301	0,2924	0,2835	0,2323	0,1678	0,1088	0,0639	0,0339	0,0161
12	3	0,0173	0,0852	0,1720	0,2362	0,2581	0,2397	0,1954	0,1419	0,0923	0,0537
12	4	0,0021	0,0213	0,0683	0,1329	0,1936	0,2311	0,2367	0,2128	0,1700	0,1208
12	5	0,0002	0,0038	0,0193	0,0532	0,1032	0,1585	0,2039	0,2270	0,2225	0,1934
12	6	0,0000	0,0005	0,0040	0,0155	0,0401	0,0792	0,1281	0,1766	0,2124	0,2256
12	7	0,0000	0,0000	0,0006	0,0033	0,0115	0,0291	0,0591	0,1009	0,1489	0,1934
12	8	0,0000	0,0000	0,0001	0,0005	0,0024	0,0078	0,0199	0,0420	0,0762	0,1208
12	9	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0004	0,0015	0,0048	0,0125	0,0277	0,0537
12	10	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0002	0,0008	0,0025	0,0068	0,0161
12	11	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0003	0,0010	0,0029
12	12	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0002
n	X	P									
13	0	0,5133	0,2542	0,1209	0,0550	0,0238	0,0097	0,0037	0,0013	0,0004	0,0001
13	1	0,3512	0,3672	0,2774	0,1787	0,1029	0,0540	0,0259	0,0113	0,0045	0,0016
13	2	0,1109	0,2448	0,2937	0,2680	0,2059	0,1388	0,0836	0,0453	0,0220	0,0095
13	3	0,0214	0,0997	0,1900	0,2457	0,2517	0,2181	0,1651	0,1107	0,0660	0,0349
13	4	0,0028	0,0277	0,0838	0,1535	0,2097	0,2337	0,2222	0,1845	0,1350	0,0873
13	5	0,0003	0,0055	0,0266	0,0691	0,1258	0,1803	0,2154	0,2214	0,1989	0,1571
13	6	0,0000	0,0008	0,0063	0,0230	0,0559	0,1030	0,1546	0,1968	0,2169	0,2095
13	7	0,0000	0,0001	0,0011	0,0058	0,0186	0,0442	0,0833	0,1312	0,1775	0,2095
13	8	0,0000	0,0000	0,0001	0,0011	0,0047	0,0142	0,0336	0,0656	0,1089	0,1571
13	9	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0009	0,0034	0,0101	0,0243	0,0495	0,0873
13	10	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0006	0,0022	0,0065	0,0162	0,0349
13	11	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0003	0,0012	0,0036	0,0095
13	12	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0005	0,0016
13	13	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001
n	X	P									
14	0	0,4877	0,2288	0,1028	0,0440	0,0178	0,0068	0,0024	0,0008	0,0002	0,0001
14	1	0,3593	0,3559	0,2539	0,1539	0,0832	0,0407	0,0181	0,0073	0,0027	0,0009

14	2	0,1229	0,2570	0,2912	0,2501	0,1802	0,1134	0,0634	0,0317	0,0141	0,0056
14	3	0,0259	0,1142	0,2056	0,2501	0,2402	0,1943	0,1366	0,0845	0,0462	0,0222
14	4	0,0037	0,0349	0,0998	0,1720	0,2202	0,2290	0,2022	0,1549	0,1040	0,0611
14	5	0,0004	0,0078	0,0352	0,0860	0,1468	0,1963	0,2178	0,2066	0,1701	0,1222
14	6	0,0000	0,0013	0,0093	0,0322	0,0734	0,1262	0,1759	0,2066	0,2088	0,1833
14	7	0,0000	0,0002	0,0019	0,0092	0,0280	0,0618	0,1082	0,1574	0,1952	0,2095
14	8	0,0000	0,0000	0,0003	0,0020	0,0082	0,0232	0,0510	0,0918	0,1398	0,1833
14	9	0,0000	0,0000	0,0000	0,0003	0,0018	0,0066	0,0183	0,0408	0,0762	0,1222
14	10	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0003	0,0014	0,0049	0,0136	0,0312	0,0611
14	11	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0002	0,0010	0,0033	0,0093	0,0222
14	12	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0005	0,0019	0,0056
14	13	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0002	0,0009
14	14	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001
n	X	P									
15	0	0,4633	0,2059	0,0874	0,0352	0,0134	0,0047	0,0016	0,0005	0,0001	0,0000
15	1	0,3658	0,3432	0,2312	0,1319	0,0668	0,0305	0,0126	0,0047	0,0016	0,0005
15	2	0,1348	0,2669	0,2856	0,2309	0,1559	0,0916	0,0476	0,0219	0,0090	0,0032
15	3	0,0307	0,1285	0,2184	0,2501	0,2252	0,1700	0,1110	0,0634	0,0318	0,0139
15	4	0,0049	0,0428	0,1156	0,1876	0,2252	0,2186	0,1792	0,1268	0,0780	0,0417
15	5	0,0006	0,0105	0,0449	0,1032	0,1651	0,2061	0,2123	0,1859	0,1404	0,0916
15	6	0,0000	0,0019	0,0132	0,0430	0,0917	0,1472	0,1906	0,2066	0,1914	0,1527
15	7	0,0000	0,0003	0,0030	0,0138	0,0393	0,0811	0,1319	0,1771	0,2013	0,1964
15	8	0,0000	0,0000	0,0005	0,0035	0,0131	0,0348	0,0710	0,1181	0,1647	0,1964
15	9	0,0000	0,0000	0,0001	0,0007	0,0034	0,0116	0,0298	0,0612	0,1048	0,1527
15	10	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0007	0,0030	0,0096	0,0245	0,0515	0,0916
15	11	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0006	0,0024	0,0074	0,0191	0,0417
15	12	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0004	0,0016	0,0052	0,0139
15	13	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0003	0,0010	0,0032
15	14	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0005
15	15	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
n	X	P									
16	0	0,4401	0,1853	0,0743	0,0281	0,0100	0,0033	0,0010	0,0003	0,0001	0,0002
16	1	0,3706	0,3294	0,2097	0,1126	0,0535	0,0228	0,0087	0,0030	0,0009	0,0018
16	2	0,1463	0,2745	0,2775	0,2111	0,1336	0,0732	0,0353	0,0150	0,0056	0,0085
16	3	0,0359	0,1423	0,2285	0,2463	0,2079	0,1465	0,0888	0,0468	0,0215	0,0278
16	4	0,0061	0,0514	0,1311	0,2001	0,2252	0,2040	0,1553	0,1014	0,0572	0,0667
16	5	0,0008	0,0137	0,0555	0,1201	0,1802	0,2099	0,2008	0,1623	0,1123	0,1222
16	6	0,0001	0,0028	0,0180	0,0550	0,1101	0,1649	0,1982	0,1983	0,1684	0,1746
16	7	0,0000	0,0004	0,0045	0,0197	0,0524	0,1010	0,1524	0,1889	0,1969	0,1964
16	8	0,0000	0,0001	0,0009	0,0055	0,0197	0,0487	0,0923	0,1417	0,1812	0,1746
16	9	0,0000	0,0000	0,0001	0,0012	0,0058	0,0185	0,0442	0,0840	0,1318	0,1222
16	10	0,0000	0,0000	0,0000	0,0002	0,0014	0,0056	0,0167	0,0392	0,0755	0,0667
16	11	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0002	0,0013	0,0049	0,0142	0,0337	0,0278
16	12	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0002	0,0011	0,0040	0,0115	0,0085
16	13	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0002	0,0008	0,0029	0,0018
16	14	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0005	0,0002
16	15	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0000
16	16	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
n	X	P									
17	0	0,4181	0,1668	0,0631	0,0225	0,0075	0,0023	0,0007	0,0002	0,0000	0,0010
17	1	0,3741	0,3150	0,1893	0,0957	0,0426	0,0169	0,0060	0,0019	0,0005	0,0052
17	2	0,1575	0,2800	0,2673	0,1914	0,1136	0,0581	0,0260	0,0102	0,0035	0,0182
17	3	0,0415	0,1556	0,2359	0,2393	0,1893	0,1245	0,0701	0,0341	0,0144	0,0472
17	4	0,0076	0,0605	0,1457	0,2093	0,2209	0,1868	0,1320	0,0796	0,0411	0,0944
17	5	0,0010	0,0175	0,0668	0,1361	0,1914	0,2081	0,1849	0,1379	0,0875	0,1484
17	6	0,0001	0,0039	0,0236	0,0680	0,1276	0,1784	0,1991	0,1839	0,1432	0,1855
17	7	0,0000	0,0007	0,0065	0,0267	0,0668	0,1201	0,1685	0,1927	0,1841	0,1855
17	8	0,0000	0,0001	0,0014	0,0084	0,0279	0,0644	0,1134	0,1606	0,1883	0,1484
17	9	0,0000	0,0000	0,0003	0,0021	0,0093	0,0276	0,0611	0,1070	0,1540	0,0944
17	10	0,0000	0,0000	0,0000	0,0004	0,0025	0,0095	0,0263	0,0571	0,1008	0,0472
17	11	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0005	0,0026	0,0090	0,0242	0,0525	0,0182
17	12	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0006	0,0024	0,0081	0,0215	0,0052
17	13	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0005	0,0021	0,0068	0,0010
17	14	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0004	0,0016	0,0001
17	15	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0003	0,0000
17	16	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
17	17	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001
n	X	P									
18	0	0,3972	0,1501	0,0536	0,0180	0,0056	0,0016	0,0004	0,0001	0,0000	0,0031
18	1	0,3763	0,3002	0,1704	0,0811	0,0338	0,0126	0,0042	0,0012	0,0003	0,0117
18	2	0,1683	0,2835	0,2556	0,1723	0,0958	0,0458	0,0190	0,0069	0,0022	0,0327
18	3	0,0473	0,1680	0,2406	0,2297	0,1704	0,1046	0,0547	0,0246	0,0095	0,0708
18	4	0,0093	0,0700	0,1592	0,2153	0,2130	0,1681	0,1104	0,0614	0,0291	0,1214
18	5	0,0014	0,0218	0,0787	0,1507	0,1988	0,2017	0,1664	0,1146	0,0666	0,1669

18	6	0,0002	0,0052	0,0301	0,0816	0,1436	0,1873	0,1941	0,1655	0,1181	0,1855
18	7	0,0000	0,0010	0,0091	0,0350	0,0820	0,1376	0,1792	0,1892	0,1657	0,1669
18	8	0,0000	0,0002	0,0022	0,0120	0,0376	0,0811	0,1327	0,1734	0,1864	0,1214
18	9	0,0000	0,0000	0,0004	0,0033	0,0139	0,0386	0,0794	0,1284	0,1694	0,0708
18	10	0,0000	0,0000	0,0001	0,0008	0,0042	0,0149	0,0385	0,0771	0,1248	0,0327
18	11	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0010	0,0046	0,0151	0,0374	0,0742	0,0117
18	12	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0002	0,0012	0,0047	0,0145	0,0354	0,0031
18	13	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0002	0,0012	0,0045	0,0134	0,0006
18	14	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0002	0,0011	0,0039	0,0001
18	15	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0002	0,0009	0,0000
18	16	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0000
18	17	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001
18	18	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0006
n	X	P									
19	0	0,3774	0,1351	0,0456	0,0144	0,0042	0,0011	0,0003	0,0001	0,0000	0,0074
19	1	0,3774	0,2852	0,1529	0,0685	0,0268	0,0093	0,0029	0,0008	0,0002	0,0222
19	2	0,1787	0,2852	0,2428	0,1540	0,0803	0,0358	0,0138	0,0046	0,0013	0,0518
19	3	0,0533	0,1796	0,2428	0,2182	0,1517	0,0869	0,0422	0,0175	0,0062	0,0961
19	4	0,0112	0,0798	0,1714	0,2182	0,2023	0,1491	0,0909	0,0467	0,0203	0,1442
19	5	0,0018	0,0266	0,0907	0,1636	0,2023	0,1916	0,1468	0,0933	0,0497	0,1762
19	6	0,0002	0,0069	0,0374	0,0955	0,1574	0,1916	0,1844	0,1451	0,0949	0,1762
19	7	0,0000	0,0014	0,0122	0,0443	0,0974	0,1525	0,1844	0,1797	0,1443	0,1442
19	8	0,0000	0,0002	0,0032	0,0166	0,0487	0,0981	0,1489	0,1797	0,1771	0,0961
19	9	0,0000	0,0000	0,0007	0,0051	0,0198	0,0514	0,0980	0,1464	0,1771	0,0518
19	10	0,0000	0,0000	0,0001	0,0013	0,0066	0,0220	0,0528	0,0976	0,1449	0,0222
19	11	0,0000	0,0000	0,0000	0,0003	0,0018	0,0077	0,0233	0,0532	0,0970	0,0074
19	12	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0004	0,0022	0,0083	0,0237	0,0529	0,0018
19	13	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0005	0,0024	0,0085	0,0233	0,0003
19	14	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0006	0,0024	0,0082	0,0000
19	15	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0005	0,0022	0,0000
19	16	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0005	0,0000
19	17	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0000
19	18	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0003
19	19	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0018
n	X	P									
20	0	0,3585	0,1216	0,0388	0,0115	0,0032	0,0008	0,0002	0,0000	0,0000	0,0148
20	1	0,3774	0,2702	0,1368	0,0576	0,0211	0,0068	0,0020	0,0005	0,0001	0,0370
20	2	0,1887	0,2852	0,2293	0,1369	0,0669	0,0278	0,0100	0,0031	0,0008	0,0739
20	3	0,0596	0,1901	0,2428	0,2054	0,1339	0,0716	0,0323	0,0123	0,0040	0,1201
20	4	0,0133	0,0898	0,1821	0,2182	0,1897	0,1304	0,0738	0,0350	0,0139	0,1602
20	5	0,0022	0,0319	0,1028	0,1746	0,2023	0,1789	0,1272	0,0746	0,0365	0,1762
20	6	0,0003	0,0089	0,0454	0,1091	0,1686	0,1916	0,1712	0,1244	0,0746	0,1602
20	7	0,0000	0,0020	0,0160	0,0545	0,1124	0,1643	0,1844	0,1659	0,1221	0,1201
20	8	0,0000	0,0004	0,0046	0,0222	0,0609	0,1144	0,1614	0,1797	0,1623	0,0739
20	9	0,0000	0,0001	0,0011	0,0074	0,0271	0,0654	0,1158	0,1597	0,1771	0,0370
20	10	0,0000	0,0000	0,0002	0,0020	0,0099	0,0308	0,0686	0,1171	0,1593	0,0148
20	11	0,0000	0,0000	0,0000	0,0005	0,0030	0,0120	0,0336	0,0710	0,1185	0,0046
20	12	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0008	0,0039	0,0136	0,0355	0,0727	0,0011
20	13	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0002	0,0010	0,0045	0,0146	0,0366	0,0002
20	14	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0002	0,0012	0,0049	0,0150	0,0000
20	15	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0003	0,0013	0,0049	0,0000
20	16	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0003	0,0013	0,0000
20	17	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0002	0,0000
20	18	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0002
20	19	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0011
20	20	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0046

**TABLA N° 2
DISTRIBUCIÓN DE POISSON**



Ejemplo: Para $\lambda = 1$ y $X = 0 \Rightarrow P(X = 0) = 0,3679$


		λ									
X	0,005	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	
0	0,9950	0,9900	0,9802	0,9704	0,9608	0,9512	0,9418	0,9324	0,9231	0,9139	
1	0,0050	0,0099	0,0196	0,0291	0,0384	0,0476	0,0565	0,0653	0,0738	0,0823	
2	0,0000	0,0000	0,0002	0,0004	0,0008	0,0012	0,0017	0,0023	0,0030	0,0037	
3	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0001	0,0001	
		λ									
X	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	
0	0,9048	0,8187	0,7408	0,6703	0,6065	0,5488	0,4966	0,4493	0,4066	0,3679	
1	0,0905	0,1637	0,2222	0,2681	0,3033	0,3293	0,3476	0,3681	0,3659	0,3679	
2	0,0045	0,0164	0,0333	0,0536	0,0758	0,0988	0,1217	0,1477	0,1647	0,1839	
3	0,0002	0,0011	0,0033	0,0072	0,0126	0,0198	0,0284	0,3896	0,0494	0,0613	
4	0,0000	0,0001	0,0003	0,0007	0,0016	0,0030	0,0050	0,0077	0,0111	0,0153	
5	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0002	0,0004	0,0007	0,0012	0,0020	0,0031	
6	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0002	0,0003	0,0005	
7	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	
		λ									
X	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2	
0	0,3329	0,3012	0,2725	0,2466	0,2231	0,2019	0,1827	0,1653	0,1496	0,1353	
1	0,3662	0,3614	0,3543	0,3452	0,3347	0,3230	0,3106	0,2975	0,2842	0,2707	
2	0,2014	0,2169	0,2303	0,2417	0,2510	0,2584	0,2640	0,2678	0,2700	0,2707	
3	0,0738	0,0867	0,0998	0,1128	0,1255	0,1378	0,1496	0,1607	0,1710	0,1804	
4	0,0203	0,0260	0,0324	0,0395	0,0471	0,0551	0,0636	0,0723	0,0812	0,0902	
5	0,0045	0,0062	0,0084	0,0111	0,0141	0,0176	0,0216	0,0260	0,0309	0,0361	
6	0,0008	0,0012	0,0018	0,0026	0,0035	0,0047	0,0061	0,0078	0,0098	0,0120	
7	0,0001	0,0002	0,0003	0,0005	0,0008	0,0011	0,0015	0,0020	0,0027	0,0034	
8	0,0000	0,0000	0,0001	0,0001	0,0001	0,0002	0,0003	0,0005	0,0006	0,0009	
9	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0001	0,0001	0,0002	
		λ									
X	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3	
0	0,1225	0,1108	0,1003	0,0907	0,0821	0,0743	0,0672	0,0608	0,0550	0,0498	
1	0,2572	0,2438	0,2306	0,2177	0,2052	0,1931	0,1815	0,1703	0,1596	0,1494	
2	0,2700	0,2681	0,2652	0,2613	0,2565	0,2510	0,2450	0,2384	0,2314	0,2240	
3	0,1890	0,1966	0,2033	0,2090	0,2138	0,2176	0,2205	0,2225	0,2237	0,2240	
4	0,0992	0,1082	0,1169	0,1254	0,1336	0,1414	0,1488	0,1557	0,1622	0,1680	
5	0,0417	0,0476	0,0538	0,0602	0,0668	0,0735	0,0804	0,0872	0,0940	0,1008	
6	0,0146	0,0174	0,0206	0,0241	0,0278	0,0319	0,0362	0,0407	0,0455	0,0504	
7	0,0044	0,0055	0,0068	0,0083	0,0099	0,0118	0,0139	0,0163	0,0188	0,0216	
8	0,0011	0,0015	0,0019	0,0025	0,0031	0,0038	0,0047	0,0057	0,0068	0,0081	
9	0,0003	0,0004	0,0005	0,0007	0,0009	0,0011	0,0014	0,0018	0,0022	0,0027	
10	0,0001	0,0001	0,0001	0,0002	0,0002	0,0003	0,0004	0,0005	0,0006	0,0008	
11	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0001	0,0001	0,0002	0,0002	
12	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	
		λ									
X	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	
0	0,0450	0,0408	0,0369	0,0334	0,0302	0,0273	0,0247	0,0224	0,0202	0,0183	
1	0,1397	0,1304	0,1217	0,1135	0,1057	0,0984	0,0915	0,0850	0,0789	0,0733	
2	0,2165	0,2087	0,2008	0,1929	0,1850	0,1771	0,1692	0,1615	0,1539	0,1465	
3	0,2237	0,2226	0,2209	0,2186	0,2158	0,2125	0,2087	0,2046	0,2001	0,1954	
4	0,1733	0,1781	0,1823	0,1858	0,1888	0,1912	0,1931	0,1944	0,1951	0,1954	
5	0,1075	0,1140	0,1203	0,1264	0,1322	0,1377	0,1429	0,1477	0,1522	0,1563	
6	0,0555	0,0608	0,0662	0,0716	0,0771	0,0826	0,0881	0,0936	0,0989	0,1042	
7	0,0246	0,0278	0,0312	0,0348	0,0385	0,0425	0,0466	0,0508	0,0551	0,0595	
8	0,0095	0,0111	0,0129	0,0148	0,0169	0,0191	0,0215	0,0241	0,0269	0,0298	
9	0,0033	0,0040	0,0047	0,0056	0,0066	0,0076	0,0089	0,0102	0,0116	0,0132	
10	0,0010	0,0013	0,0016	0,0019	0,0023	0,0028	0,0033	0,0039	0,0045	0,0053	
11	0,0003	0,0004	0,0005	0,0006	0,0007	0,0009	0,0011	0,0013	0,0016	0,0019	
12	0,0001	0,0001	0,0001	0,0002	0,0002	0,0003	0,0003	0,0004	0,0005	0,0006	

13	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0002	0,0002
14	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001
λ										
X	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5,0
0	0,0166	0,0150	0,0136	0,0123	0,0111	0,0101	0,0091	0,0082	0,0074	0,0067
1	0,0679	0,0630	0,0583	0,0540	0,0500	0,0462	0,0427	0,0395	0,0365	0,0337
2	0,1393	0,1323	0,1254	0,1188	0,1125	0,1063	0,1005	0,0948	0,0894	0,0842
3	0,1904	0,1852	0,1798	0,1743	0,1687	0,1631	0,1574	0,1517	0,1460	0,1404
4	0,1951	0,1944	0,1933	0,1917	0,1898	0,1875	0,1849	0,1820	0,1789	0,1755
5	0,1600	0,1633	0,1662	0,1687	0,1708	0,1725	0,1738	0,1747	0,1753	0,1755
6	0,1093	0,1143	0,1191	0,1237	0,1281	0,1323	0,1362	0,1398	0,1432	0,1462
7	0,0640	0,0686	0,0732	0,0778	0,0824	0,0869	0,0914	0,0959	0,1002	0,1044
8	0,0328	0,0360	0,0393	0,0428	0,0463	0,0500	0,0537	0,0575	0,0614	0,0653
9	0,0150	0,0168	0,0188	0,0209	0,0232	0,0255	0,0281	0,0307	0,0334	0,0363
10	0,0061	0,0071	0,0081	0,0092	0,0104	0,0118	0,0132	0,0147	0,0164	0,0181
11	0,0023	0,0027	0,0032	0,0037	0,0043	0,0049	0,0056	0,0064	0,0073	0,0082
12	0,0008	0,0009	0,0011	0,0013	0,0016	0,0019	0,0022	0,0026	0,0030	0,0034
13	0,0002	0,0003	0,0004	0,0005	0,0006	0,0007	0,0008	0,0009	0,0011	0,0013
14	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0002	0,0002	0,0003	0,0003	0,0004	0,0005
15	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0002
λ										
X	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9	6,0
0	0,0061	0,0055	0,0050	0,0045	0,0041	0,0037	0,0033	0,0030	0,0027	0,0025
1	0,0311	0,0287	0,0265	0,0244	0,0225	0,0207	0,0191	0,0176	0,0162	0,0149
2	0,0793	0,0746	0,0701	0,0659	0,0618	0,0580	0,0544	0,0509	0,0477	0,0446
3	0,1348	0,1293	0,1239	0,1185	0,1133	0,1082	0,1033	0,0985	0,0938	0,0892
4	0,1719	0,1681	0,1641	0,1600	0,1558	0,1515	0,1472	0,1428	0,1383	0,1339
5	0,1753	0,1748	0,1740	0,1728	0,1714	0,1697	0,1678	0,1656	0,1632	0,1606
6	0,1490	0,1515	0,1537	0,1555	0,1571	0,1584	0,1594	0,1601	0,1605	0,1606
7	0,1086	0,1125	0,1163	0,1200	0,1234	0,1267	0,1298	0,1326	0,1353	0,1377
8	0,0692	0,0731	0,0771	0,0810	0,0849	0,0887	0,0925	0,0962	0,0998	0,1033
9	0,0392	0,0423	0,0454	0,0486	0,0519	0,0552	0,0586	0,0620	0,0654	0,0688
10	0,0200	0,0220	0,0241	0,0262	0,0285	0,0309	0,0334	0,0359	0,0386	0,0413
11	0,0093	0,0104	0,0116	0,0129	0,0143	0,0157	0,0173	0,0190	0,0207	0,0225
12	0,0039	0,0045	0,0051	0,0058	0,0065	0,0073	0,0082	0,0092	0,0102	0,0113
13	0,0015	0,0018	0,0021	0,0024	0,0028	0,0032	0,0036	0,0041	0,0046	0,0052
14	0,0006	0,0007	0,0008	0,0009	0,0011	0,0013	0,0015	0,0017	0,0019	0,0022
15	0,0002	0,0002	0,0003	0,0003	0,0004	0,0005	0,0006	0,0007	0,0008	0,0009
16	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0002	0,0002	0,0002	0,0003	0,0003
17	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
λ										
X	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0
0	0,0022	0,0020	0,0018	0,0017	0,0015	0,0014	0,0012	0,0011	0,0010	0,0009
1	0,0137	0,0126	0,0116	0,0106	0,0098	0,0090	0,0082	0,0076	0,0070	0,0064
2	0,0417	0,0390	0,0364	0,0340	0,0318	0,0296	0,0276	0,0258	0,0240	0,0223
3	0,0848	0,0806	0,0765	0,0726	0,0688	0,0652	0,0617	0,0584	0,0552	0,0521
4	0,1294	0,1249	0,1205	0,1162	0,1118	0,1076	0,1034	0,0992	0,0952	0,0912
5	0,1579	0,1549	0,1519	0,1487	0,1454	0,1420	0,1385	0,1349	0,1314	0,1277
6	0,1605	0,1601	0,1595	0,1586	0,1575	0,1562	0,1546	0,1529	0,1511	0,1490
7	0,1399	0,1418	0,1435	0,1450	0,1462	0,1472	0,1480	0,1486	0,1489	0,1490
8	0,1066	0,1099	0,1130	0,1160	0,1188	0,1215	0,1240	0,1263	0,1284	0,1304
9	0,0723	0,0757	0,0791	0,0825	0,0858	0,0891	0,0923	0,0954	0,0985	0,1014
10	0,0441	0,0469	0,0498	0,0528	0,0558	0,0588	0,0618	0,0649	0,0679	0,0710
11	0,0244	0,0265	0,0285	0,0307	0,0330	0,0353	0,0377	0,0401	0,0426	0,0452
12	0,0124	0,0137	0,0150	0,0164	0,0179	0,0194	0,0210	0,0227	0,0245	0,0263
13	0,0058	0,0065	0,0073	0,0081	0,0089	0,0099	0,0108	0,0119	0,0130	0,0142
14	0,0025	0,0029	0,0033	0,0037	0,0041	0,0046	0,0052	0,0058	0,0064	0,0071
15	0,0010	0,0012	0,0014	0,0016	0,0018	0,0020	0,0023	0,0026	0,0029	0,0033
16	0,0004	0,0005	0,0005	0,0006	0,0007	0,0008	0,0010	0,0011	0,0013	0,0014
17	0,0001	0,0002	0,0002	0,0002	0,0003	0,0003	0,0004	0,0004	0,0005	0,0006
18	0,0000	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0002	0,0002	0,0002
19	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
λ										
X	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5	7,6	7,7	7,8	7,9	8,0
0	0,0008	0,0007	0,0007	0,0006	0,0006	0,0005	0,0005	0,0004	0,0004	0,0003
1	0,0059	0,0054	0,0049	0,0045	0,0041	0,0038	0,0035	0,0032	0,0029	0,0027
2	0,0208	0,0194	0,0180	0,0167	0,0156	0,0145	0,0134	0,0125	0,0116	0,0107
3	0,0492	0,0464	0,0438	0,0413	0,0389	0,0366	0,0345	0,0324	0,0305	0,0286
4	0,0874	0,0836	0,0799	0,0764	0,0729	0,0696	0,0663	0,0632	0,0602	0,0573
5	0,1241	0,1204	0,1167	0,1130	0,1094	0,1057	0,1021	0,0986	0,0951	0,0916
6	0,1468	0,1445	0,1420	0,1394	0,1367	0,1339	0,1311	0,1282	0,1252	0,1221
7	0,1489	0,1486	0,1481	0,1474	0,1465	0,1454	0,1442	0,1428	0,1413	0,1396
8	0,1321	0,1337	0,1351	0,1363	0,1373	0,1381	0,1388	0,1392	0,1395	0,1396
9	0,1042	0,1070	0,1096	0,1121	0,1144	0,1167	0,1187	0,1207	0,1224	0,1241

10	0,0740	0,0770	0,0800	0,0829	0,0858	0,0887	0,0914	0,0941	0,0967	0,0993
11	0,0478	0,0504	0,0531	0,0558	0,0585	0,0613	0,0640	0,0667	0,0695	0,0722
12	0,0283	0,0303	0,0323	0,0344	0,0366	0,0388	0,0411	0,0434	0,0457	0,0481
13	0,0154	0,0168	0,0181	0,0196	0,0211	0,0227	0,0243	0,0260	0,0278	0,0296
14	0,0078	0,0086	0,0095	0,0104	0,0113	0,0123	0,0134	0,0145	0,0157	0,0169
15	0,0037	0,0041	0,0046	0,0051	0,0057	0,0062	0,0069	0,0075	0,0083	0,0090
16	0,0016	0,0019	0,0021	0,0024	0,0026	0,0030	0,0033	0,0037	0,0041	0,0045
17	0,0007	0,0008	0,0009	0,0010	0,0012	0,0013	0,0015	0,0017	0,0019	0,0021
18	0,0003	0,0003	0,0004	0,0004	0,0005	0,0006	0,0006	0,0007	0,0008	0,0009
19	0,0001	0,0001	0,0001	0,0002	0,0002	0,0002	0,0003	0,0003	0,0003	0,0004
20	0,0000	0,0000	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0002
21	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0001
	λ									
X	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9	9,0
0	0,0003	0,0003	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0001	0,0001
1	0,0025	0,0023	0,0021	0,0002	0,0017	0,0016	0,0014	0,0013	0,0012	0,0011
2	0,0100	0,0092	0,0086	0,0000	0,0074	0,0068	0,0063	0,0058	0,0054	0,0050
3	0,0269	0,0252	0,0237	0,0000	0,0208	0,0195	0,0183	0,0171	0,0160	0,0150
4	0,0544	0,0517	0,0491	0,0000	0,0443	0,0420	0,0398	0,0377	0,0357	0,0337
5	0,0882	0,0849	0,0816	0,0000	0,0752	0,0722	0,0692	0,0663	0,0635	0,0607
6	0,1191	0,1160	0,1128	0,0000	0,1066	0,1034	0,1003	0,0972	0,0941	0,0911
7	0,1378	0,1358	0,1338	0,0000	0,1294	0,1271	0,1247	0,1222	0,1197	0,1171
8	0,1395	0,1392	0,1388	0,0000	0,1375	0,1366	0,1356	0,1344	0,1332	0,1318
9	0,1256	0,1269	0,1280	0,0000	0,1299	0,1306	0,1311	0,1315	0,1317	0,1318
10	0,1017	0,1040	0,1063	0,0000	0,1104	0,1123	0,1140	0,1157	0,1172	0,1186
11	0,0749	0,0776	0,0802	0,0000	0,0853	0,0878	0,0902	0,0925	0,0948	0,0970
12	0,0505	0,0530	0,0555	0,0000	0,0604	0,0629	0,0654	0,0679	0,0703	0,0728
13	0,0315	0,0334	0,0354	0,0000	0,0395	0,0416	0,0438	0,0459	0,0481	0,0504
14	0,0182	0,0196	0,0210	0,0000	0,0240	0,0256	0,0272	0,0289	0,0306	0,0324
15	0,0098	0,0107	0,0116	0,0000	0,0136	0,0147	0,0158	0,0169	0,0182	0,0194
16	0,0050	0,0055	0,0060	0,0000	0,0072	0,0079	0,0086	0,0093	0,0101	0,0109
17	0,0024	0,0026	0,0029	0,0000	0,0036	0,0040	0,0044	0,0048	0,0053	0,0058
18	0,0011	0,0012	0,0014	0,0000	0,0017	0,0019	0,0021	0,0024	0,0026	0,0029
19	0,0005	0,0005	0,0006	0,0000	0,0008	0,0009	0,0010	0,0011	0,0012	0,0014
20	0,0002	0,0002	0,0002	0,0000	0,0003	0,0004	0,0004	0,0005	0,0005	0,0006
21	0,0001	0,0001	0,0001	0,0000	0,0001	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0003
22	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
23	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
24	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	λ									
X	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7	9,8	9,9	10
0	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0000
1	0,0010	0,0009	0,0009	0,0008	0,0007	0,0007	0,0006	0,0005	0,0005	0,0005
2	0,0046	0,0043	0,0040	0,0037	0,0034	0,0031	0,0029	0,0027	0,0025	0,0023
3	0,0140	0,0131	0,0123	0,0115	0,0107	0,0100	0,0093	0,0087	0,0081	0,0076
4	0,0319	0,0302	0,0285	0,0269	0,0254	0,0240	0,0226	0,0213	0,0201	0,0189
5	0,0581	0,0555	0,0530	0,0506	0,0483	0,0460	0,0439	0,0418	0,0398	0,0378
6	0,0881	0,0851	0,0822	0,0793	0,0764	0,0736	0,0709	0,0682	0,0656	0,0631
7	0,1145	0,1118	0,1091	0,1064	0,1037	0,1010	0,0982	0,0955	0,0928	0,0901
8	0,1302	0,1286	0,1269	0,1251	0,1232	0,1212	0,1191	0,1170	0,1148	0,1126
9	0,1317	0,1315	0,1311	0,1306	0,1300	0,1293	0,1284	0,1274	0,1263	0,1251
10	0,1198	0,1210	0,1219	0,1228	0,1235	0,1241	0,1245	0,1249	0,1250	0,1251
11	0,0991	0,1012	0,1031	0,1049	0,1067	0,1083	0,1098	0,1112	0,1125	0,1137
12	0,0752	0,0776	0,0799	0,0822	0,0844	0,0866	0,0888	0,0908	0,0928	0,0948
13	0,0526	0,0549	0,0572	0,0594	0,0617	0,0640	0,0662	0,0685	0,0707	0,0729
14	0,0342	0,0361	0,0380	0,0399	0,0419	0,0439	0,0459	0,0479	0,0500	0,0521
15	0,0208	0,0221	0,0235	0,0250	0,0265	0,0281	0,0297	0,0313	0,0330	0,0347
16	0,0118	0,0127	0,0137	0,0147	0,0157	0,0168	0,0180	0,0192	0,0204	0,0217
17	0,0063	0,0069	0,0075	0,0081	0,0088	0,0095	0,0103	0,0111	0,0119	0,0128
18	0,0032	0,0035	0,0039	0,0042	0,0046	0,0051	0,0055	0,0060	0,0065	0,0071
19	0,0015	0,0017	0,0019	0,0021	0,0023	0,0026	0,0028	0,0031	0,0034	0,0037
20	0,0007	0,0008	0,0009	0,0010	0,0011	0,0012	0,0014	0,0015	0,0017	0,0019
21	0,0003	0,0003	0,0004	0,0004	0,0005	0,0006	0,0006	0,0007	0,0008	0,0009
22	0,0001	0,0001	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0003	0,0003	0,0004	0,0004
23	0,0000	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0002	0,0002
24	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0001	0,0001
25	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
26	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
27	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
28	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

**TABLA N° 3
DISTRIBUCIÓN NORMAL**

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$




Ejemplo:

$$P(Z \leq -1,96) = 0,0250$$

Z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
-3	0,0013	0,0013	0,0013	0,0012	0,0012	0,0011	0,0011	0,0011	0,0010	0,0010
-2,9	0,0019	0,0018	0,0018	0,0017	0,0016	0,0016	0,0015	0,0015	0,0014	0,0014
-2,8	0,0026	0,0025	0,0024	0,0023	0,0023	0,0022	0,0021	0,0021	0,0020	0,0019
-2,7	0,0035	0,0034	0,0033	0,0032	0,0031	0,0030	0,0029	0,0028	0,0027	0,0026
-2,6	0,0047	0,0045	0,0044	0,0043	0,0041	0,0040	0,0039	0,0038	0,0037	0,0036
-2,5	0,0062	0,0060	0,0059	0,0057	0,0055	0,0054	0,0052	0,0051	0,0049	0,0048
-2,4	0,0082	0,0080	0,0078	0,0075	0,0073	0,0071	0,0069	0,0068	0,0066	0,0064
-2,3	0,0107	0,0104	0,0102	0,0099	0,0096	0,0094	0,0091	0,0089	0,0087	0,0084
-2,2	0,0139	0,0136	0,0132	0,0129	0,0125	0,0122	0,0119	0,0116	0,0113	0,0110
-2,1	0,0179	0,0174	0,0170	0,0166	0,0162	0,0158	0,0154	0,0150	0,0146	0,0143
-2	0,0228	0,0222	0,0217	0,0212	0,0207	0,0202	0,0197	0,0192	0,0188	0,0183
-1,9	0,0287	0,0281	0,0274	0,0268	0,0262	0,0256	0,0250	0,0244	0,0239	0,0233
-1,8	0,0359	0,0351	0,0344	0,0336	0,0329	0,0322	0,0314	0,0307	0,0301	0,0294
-1,7	0,0446	0,0436	0,0427	0,0418	0,0409	0,0401	0,0392	0,0384	0,0375	0,0367
-1,6	0,0548	0,0537	0,0526	0,0516	0,0505	0,0495	0,0485	0,0475	0,0465	0,0455
-1,5	0,0668	0,0655	0,0643	0,0630	0,0618	0,0606	0,0594	0,0582	0,0571	0,0559
-1,4	0,0808	0,0793	0,0778	0,0764	0,0749	0,0735	0,0721	0,0708	0,0694	0,0681
-1,3	0,0968	0,0951	0,0934	0,0918	0,0901	0,0885	0,0869	0,0853	0,0838	0,0823
-1,2	0,1151	0,1131	0,1112	0,1093	0,1075	0,1056	0,1038	0,1020	0,1003	0,0985
-1,1	0,1357	0,1335	0,1314	0,1292	0,1271	0,1251	0,1230	0,1210	0,1190	0,1170
-1	0,1587	0,1562	0,1539	0,1515	0,1492	0,1469	0,1446	0,1423	0,1401	0,1379
-0,9	0,1841	0,1814	0,1788	0,1762	0,1736	0,1711	0,1685	0,1660	0,1635	0,1611
-0,8	0,2119	0,2090	0,2061	0,2033	0,2005	0,1977	0,1949	0,1922	0,1894	0,1867
-0,7	0,2420	0,2389	0,2358	0,2327	0,2296	0,2266	0,2236	0,2206	0,2177	0,2148
-0,6	0,2743	0,2709	0,2676	0,2643	0,2611	0,2578	0,2546	0,2514	0,2483	0,2451
-0,5	0,3085	0,3050	0,3015	0,2981	0,2946	0,2912	0,2877	0,2843	0,2810	0,2776
-0,4	0,3446	0,3409	0,3372	0,3336	0,3300	0,3264	0,3228	0,3192	0,3156	0,3121
-0,3	0,3821	0,3783	0,3745	0,3707	0,3669	0,3632	0,3594	0,3557	0,3520	0,3483
-0,2	0,4207	0,4168	0,4129	0,4090	0,4052	0,4013	0,3974	0,3936	0,3897	0,3859
-0,1	0,4602	0,4562	0,4522	0,4483	0,4443	0,4404	0,4364	0,4325	0,4286	0,4247
0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990


TABLA N° 4
DISTRIBUCIÓN t DE STUDENT



Ejemplos:
Para $n-1 = 10$ grados de libertad
 $P(t \geq 1,812) = 0,05$
 $P(t \leq -1,812) = 0,05$

α n-1	0,25	0,2	0,15	0,1	0,05	0,025	0,01	0,005	0,0005
1	1,0000	1,3764	1,9626	3,0777	6,3138	12,7062	31,8205	63,6567	636,6192
2	0,8165	1,0607	1,3862	1,8856	2,9200	4,3027	6,9646	9,9248	31,5991
3	0,7649	0,9785	1,2498	1,6377	2,3534	3,1824	4,5407	5,8409	12,9240
4	0,7407	0,9410	1,1896	1,5332	2,1318	2,7764	3,7469	4,6041	8,6103
5	0,7267	0,9195	1,1558	1,4759	2,0150	2,5706	3,3649	4,0321	6,8688
6	0,7176	0,9057	1,1342	1,4398	1,9432	2,4469	3,1427	3,7074	5,9588
7	0,7111	0,8960	1,1192	1,4149	1,8946	2,3646	2,9980	3,4995	5,4079
8	0,7064	0,8889	1,1081	1,3968	1,8595	2,3060	2,8965	3,3554	5,0413
9	0,7027	0,8834	1,0997	1,3830	1,8331	2,2622	2,8214	3,2498	4,7809
10	0,6998	0,8791	1,0931	1,3722	1,8125	2,2281	2,7638	3,1693	4,5869
11	0,6974	0,8755	1,0877	1,3634	1,7959	2,2010	2,7181	3,1058	4,4370
12	0,6955	0,8726	1,0832	1,3562	1,7823	2,1788	2,6810	3,0545	4,3178
13	0,6938	0,8702	1,0795	1,3502	1,7709	2,1604	2,6503	3,0123	4,2208
14	0,6924	0,8681	1,0763	1,3450	1,7613	2,1448	2,6245	2,9768	4,1405
15	0,6912	0,8662	1,0735	1,3406	1,7531	2,1314	2,6025	2,9467	4,0728
16	0,6901	0,8647	1,0711	1,3368	1,7459	2,1199	2,5835	2,9208	4,0150
17	0,6892	0,8633	1,0690	1,3334	1,7396	2,1098	2,5669	2,8982	3,9651
18	0,6884	0,8620	1,0672	1,3304	1,7341	2,1009	2,5524	2,8784	3,9216
19	0,6876	0,8610	1,0655	1,3277	1,7291	2,0930	2,5395	2,8609	3,8834
20	0,6870	0,8600	1,0640	1,3253	1,7247	2,0860	2,5280	2,8453	3,8495
21	0,6864	0,8591	1,0627	1,3232	1,7207	2,0796	2,5176	2,8314	3,8193
22	0,6858	0,8583	1,0614	1,3212	1,7171	2,0739	2,5083	2,8188	3,7921
23	0,6853	0,8575	1,0603	1,3195	1,7139	2,0687	2,4999	2,8073	3,7676
24	0,6848	0,8569	1,0593	1,3178	1,7109	2,0639	2,4922	2,7969	3,7454
25	0,6844	0,8562	1,0584	1,3163	1,7081	2,0595	2,4851	2,7874	3,7251
26	0,6840	0,8557	1,0575	1,3150	1,7056	2,0555	2,4786	2,7787	3,7066
27	0,6837	0,8551	1,0567	1,3137	1,7033	2,0518	2,4727	2,7707	3,6896
28	0,6834	0,8546	1,0560	1,3125	1,7011	2,0484	2,4671	2,7633	3,6739
29	0,6830	0,8542	1,0553	1,3114	1,6991	2,0452	2,4620	2,7564	3,6594
30	0,6828	0,8538	1,0547	1,3104	1,6973	2,0423	2,4573	2,7500	3,6460
40	0,6807	0,8507	1,0500	1,3031	1,6839	2,0211	2,4233	2,7045	3,5510
50	0,6794	0,8489	1,0473	1,2987	1,6759	2,0086	2,4033	2,6778	3,4960
60	0,6786	0,8477	1,0455	1,2958	1,6706	2,0003	2,3901	2,6603	3,4602
70	0,6780	0,8468	1,0442	1,2938	1,6669	1,9944	2,3808	2,6479	3,4350
80	0,6776	0,8461	1,0432	1,2922	1,6641	1,9901	2,3739	2,6387	3,4163
90	0,6772	0,8456	1,0424	1,2910	1,6620	1,9867	2,3685	2,6316	3,4019
100	0,6770	0,8452	1,0418	1,2901	1,6602	1,9840	2,3642	2,6259	3,3905
110	0,6767	0,8449	1,0413	1,2893	1,6588	1,9818	2,3607	2,6213	3,3812
120	0,6765	0,8446	1,0409	1,2886	1,6577	1,9799	2,3578	2,6174	3,3735
100000	0,6745	0,8416	1,0364	1,2816	1,6449	1,9600	2,3264	2,5758	3,2905

**TABLA N° 5
DISTRIBUCIÓN F DE FISHER**



Ejemplos:

Para $n_1 = 9$; $n_2 = 12$ grados de libertad

$P(F > 2,80) = 0,05 = 5\%$

$P(F > 4,39) = 0,01 = 1\%$

5% (normal) y 1% (negritas)


n_1 = grados de libertad del numerador

n_2 = grados de libertad del denominador

$n_1 \backslash n_2$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	20	25	50	100
1	161,45 4052,2	199,50 4999,5	215,71 5403,4	224,58 5624,6	230,16 5763,6	233,99 5859,0	236,77 5928,4	238,88 5981,1	240,54 6022,5	241,88 6055,8	245,95 6157,3	248,01 6208,7	249,26 6239,8	251,77 6302,5	253,04 6334,1
2	18,51 98,50	19,00 99,00	19,16 99,17	19,25 99,25	19,30 99,30	19,33 99,33	19,35 99,36	19,37 99,37	19,38 99,39	19,40 99,40	19,43 99,43	19,45 99,45	19,46 99,46	19,48 99,48	19,49 99,49
3	10,13 34,12	9,55 30,82	9,28 29,46	9,12 28,71	9,01 28,24	8,94 27,91	8,89 27,67	8,85 27,49	8,81 27,35	8,79 27,23	8,70 26,87	8,66 26,69	8,63 26,58	8,58 26,35	8,55 26,24
4	7,71 21,20	6,94 18,00	6,59 16,69	6,39 15,98	6,26 15,52	6,16 15,21	6,09 14,98	6,04 14,80	6,00 14,66	5,96 14,55	5,86 14,20	5,80 14,02	5,77 13,91	5,70 13,69	5,66 13,58
5	6,61 16,26	5,79 13,27	5,41 12,06	5,19 11,39	5,05 10,97	4,95 10,67	4,88 10,46	4,82 10,29	4,77 10,16	4,74 10,05	4,62 9,72	4,56 9,55	4,52 9,45	4,44 9,24	4,41 9,13
6	5,99 13,75	5,14 10,92	4,76 9,78	4,53 9,15	4,39 8,75	4,28 8,47	4,21 8,26	4,15 8,10	4,10 7,98	4,06 7,87	3,94 7,56	3,87 7,40	3,83 7,30	3,75 7,09	3,71 6,99
7	5,59 12,25	4,74 9,55	4,35 8,45	4,12 7,85	3,97 7,46	3,87 7,19	3,79 6,99	3,73 6,84	3,68 6,72	3,64 6,62	3,51 6,31	3,44 6,16	3,40 6,06	3,32 5,86	3,27 5,75
8	5,32 11,26	4,46 8,65	4,07 7,59	3,84 7,01	3,69 6,63	3,58 6,37	3,50 6,18	3,44 6,03	3,39 5,91	3,35 5,81	3,22 5,52	3,15 5,36	3,11 5,26	3,02 5,07	2,97 4,96
9	5,12 10,56	4,26 8,02	3,86 6,99	3,63 6,42	3,48 6,06	3,37 5,80	3,29 5,61	3,23 5,47	3,18 5,35	3,14 5,26	3,01 4,96	2,94 4,81	2,89 4,71	2,80 4,52	2,76 4,41
10	4,96 10,04	4,10 7,56	3,71 6,55	3,48 5,99	3,33 5,64	3,22 5,39	3,14 5,20	3,07 5,06	3,02 4,94	2,98 4,85	2,85 4,56	2,77 4,41	2,73 4,31	2,64 4,12	2,59 4,01
11	4,84 9,65	3,98 7,21	3,59 6,22	3,36 5,67	3,20 5,32	3,09 5,07	3,01 4,89	2,95 4,74	2,90 4,63	2,85 4,54	2,72 4,25	2,65 4,10	2,60 4,01	2,51 3,81	2,46 3,71
12	4,75 9,33	3,89 6,93	3,49 5,95	3,26 5,41	3,11 5,06	3,00 4,82	2,91 4,64	2,85 4,50	2,80 4,39	2,75 4,30	2,62 4,01	2,54 3,86	2,50 3,76	2,40 3,57	2,35 3,47
13	4,67 9,07	3,81 6,70	3,41 5,74	3,18 5,21	3,03 4,86	2,92 4,62	2,83 4,44	2,77 4,30	2,71 4,19	2,67 4,10	2,53 3,82	2,46 3,66	2,41 3,57	2,31 3,38	2,26 3,27
14	4,60 8,86	3,74 6,51	3,34 5,56	3,11 5,04	2,96 4,69	2,85 4,46	2,76 4,28	2,70 4,14	2,65 4,03	2,60 3,94	2,46 3,66	2,39 3,51	2,34 3,41	2,24 3,22	2,19 3,11
15	4,54 8,68	3,68 6,36	3,29 5,42	3,06 4,89	2,90 4,56	2,79 4,32	2,71 4,14	2,64 4,00	2,59 3,89	2,54 3,80	2,40 3,52	2,33 3,37	2,28 3,28	2,18 3,08	2,12 2,98
16	4,49 8,53	3,63 6,23	3,24 5,29	3,01 4,77	2,85 4,44	2,74 4,20	2,66 4,03	2,59 3,89	2,54 3,78	2,49 3,69	2,35 3,41	2,28 3,26	2,23 3,16	2,12 2,97	2,07 2,86
17	4,45 8,40	3,59 6,11	3,20 5,18	2,96 4,67	2,81 4,34	2,70 4,10	2,61 3,93	2,55 3,79	2,49 3,68	2,45 3,59	2,31 3,31	2,23 3,16	2,18 3,07	2,08 2,87	2,02 2,76
18	4,41 8,29	3,55 6,01	3,16 5,09	2,93 4,58	2,77 4,25	2,66 4,01	2,58 3,84	2,51 3,71	2,46 3,60	2,41 3,51	2,27 3,23	2,19 3,08	2,14 2,98	2,04 2,78	1,98 2,68
19	4,38 8,18	3,52 5,93	3,13 5,01	2,90 4,50	2,74 4,17	2,63 3,94	2,54 3,77	2,48 3,63	2,42 3,52	2,38 3,43	2,23 3,15	2,16 3,00	2,11 2,91	2,00 2,71	1,94 2,60
20	4,35 8,10	3,49 5,85	3,10 4,94	2,87 4,43	2,71 4,10	2,60 3,87	2,51 3,70	2,45 3,56	2,39 3,46	2,35 3,37	2,20 3,09	2,12 2,94	2,07 2,84	1,97 2,64	1,91 2,54
21	4,32 8,02	3,47 5,78	3,07 4,87	2,84 4,37	2,68 4,04	2,57 3,81	2,49 3,64	2,42 3,51	2,37 3,40	2,32 3,31	2,18 3,03	2,10 2,88	2,05 2,79	1,94 2,58	1,88 2,48
22	4,30 7,95	3,44 5,72	3,05 4,82	2,82 4,31	2,66 3,99	2,55 3,76	2,46 3,59	2,40 3,45	2,34 3,35	2,30 3,26	2,15 2,98	2,07 2,83	2,02 2,73	1,91 2,53	1,85 2,42
23	4,28 7,95	3,42 5,72	3,03 4,82	2,80 4,31	2,64 3,99	2,53 3,76	2,44 3,59	2,37 3,45	2,32 3,35	2,27 3,26	2,13 2,98	2,05 2,83	2,00 2,73	1,88 2,53	1,82 2,42

	7,88	5,66	4,76	4,26	3,94	3,71	3,54	3,41	3,30	3,21	2,93	2,78	2,69	2,48	2,37
24	4,26	3,40	3,01	2,78	2,62	2,51	2,42	2,36	2,30	2,25	2,11	2,03	1,97	1,86	1,80
	7,82	5,61	4,72	4,22	3,90	3,67	3,50	3,36	3,26	3,17	2,89	2,74	2,64	2,44	2,33
25	4,24	3,39	2,99	2,76	2,60	2,49	2,40	2,34	2,28	2,24	2,09	2,01	1,96	1,84	1,78
	7,77	5,57	4,68	4,18	3,85	3,63	3,46	3,32	3,22	3,13	2,85	2,70	2,60	2,40	2,29
26	4,23	3,37	2,98	2,74	2,59	2,47	2,39	2,32	2,27	2,22	2,07	1,99	1,94	1,82	1,76
	7,72	5,53	4,64	4,14	3,82	3,59	3,42	3,29	3,18	3,09	2,81	2,66	2,57	2,36	2,25
27	4,21	3,35	2,96	2,73	2,57	2,46	2,37	2,31	2,25	2,20	2,06	1,97	1,92	1,81	1,74
	7,68	5,49	4,60	4,11	3,78	3,56	3,39	3,26	3,15	3,06	2,78	2,63	2,54	2,33	2,22
28	4,20	3,34	2,95	2,71	2,56	2,45	2,36	2,29	2,24	2,19	2,04	1,96	1,91	1,79	1,73
	7,64	5,45	4,57	4,07	3,75	3,53	3,36	3,23	3,12	3,03	2,75	2,60	2,51	2,30	2,19
29	4,18	6,94	4,76	6,39	4,39	6,16	4,21	6,04	4,10	5,96	4,62	5,80	4,52	5,70	4,41
	7,60	5,42	4,54	4,04	3,73	3,50	3,33	3,20	3,09	3,00	2,73	2,57	2,48	2,27	2,16
30	4,17	3,32	2,92	2,69	2,53	2,42	2,33	2,27	2,21	2,16	2,01	1,93	1,88	1,76	1,70
	7,56	5,39	4,51	4,02	3,70	3,47	3,30	3,17	3,07	2,98	2,70	2,55	2,45	2,25	2,13
32	4,15	3,29	2,90	2,67	2,51	2,40	2,31	2,24	2,19	2,14	1,99	1,91	1,85	1,74	1,67
	7,50	5,34	4,46	3,97	3,65	3,43	3,26	3,13	3,02	2,93	2,65	2,50	2,41	2,20	2,08
36	4,11	3,26	2,87	2,63	2,48	2,36	2,28	2,21	2,15	2,11	1,95	1,87	1,81	1,69	1,62
	7,40	5,25	4,38	3,89	3,57	3,35	3,18	3,05	2,95	2,86	2,58	2,43	2,33	2,12	2,00
42	4,07	3,22	2,83	2,59	2,44	2,32	2,24	2,17	2,11	2,06	1,91	1,83	1,77	1,65	1,57
	7,28	5,15	4,29	3,80	3,49	3,27	3,10	2,97	2,86	2,78	2,50	2,34	2,25	2,03	1,91
45	4,06	3,20	2,81	2,58	2,42	2,31	2,22	2,15	2,10	2,05	1,89	1,81	1,75	1,63	1,55
	7,23	5,11	4,25	3,77	3,45	3,23	3,07	2,94	2,83	2,74	2,46	2,31	2,21	2,00	1,88
54	4,02	3,17	2,78	2,54	2,39	2,27	2,18	2,12	2,06	2,01	1,86	1,77	1,71	1,58	1,51
	7,13	5,02	4,17	3,69	3,38	3,16	2,99	2,86	2,76	2,67	2,39	2,24	2,14	1,92	1,79
56	4,01	3,16	2,77	2,54	2,38	2,27	2,18	2,11	2,05	2,00	1,85	1,76	1,70	1,57	1,50
	7,11	5,01	4,15	3,67	3,36	3,14	2,98	2,85	2,74	2,66	2,38	2,22	2,12	1,90	1,78
57	4,01	3,16	2,77	2,53	2,38	2,26	2,18	2,11	2,05	2,00	1,85	1,76	1,70	1,57	1,49
	7,10	5,00	4,15	3,67	3,36	3,14	2,97	2,84	2,74	2,65	2,37	2,22	2,12	1,90	1,77
70	3,98	3,13	2,74	2,50	2,35	2,23	2,14	2,07	2,02	1,97	1,81	1,72	1,66	1,53	1,45
	7,01	4,92	4,07	3,60	3,29	3,07	2,91	2,78	2,67	2,59	2,31	2,15	2,05	1,83	1,70
72	3,97	3,12	2,73	2,50	2,34	2,23	2,14	2,07	2,01	1,96	1,81	1,72	1,66	1,53	1,44
	7,00	4,91	4,07	3,59	3,28	3,06	2,90	2,77	2,66	2,58	2,30	2,14	2,04	1,82	1,69
76	3,97	3,12	2,72	2,49	2,33	2,22	2,13	2,06	2,01	1,96	1,80	1,71	1,65	1,52	1,43
	6,98	4,90	4,05	3,58	3,27	3,05	2,88	2,75	2,65	2,56	2,28	2,13	2,03	1,80	1,67
84	3,95	3,11	2,71	2,48	2,32	2,21	2,12	2,05	1,99	1,95	1,79	1,70	1,64	1,50	1,42
	6,95	4,87	4,02	3,55	3,24	3,02	2,86	2,73	2,63	2,54	2,26	2,10	2,00	1,78	1,64
87	3,95	3,10	2,71	2,48	2,32	2,20	2,12	2,05	1,99	1,94	1,78	1,69	1,63	1,50	1,41
	6,94	4,86	4,02	3,54	3,24	3,02	2,85	2,72	2,62	2,53	2,25	2,10	1,99	1,77	1,63
95	3,94	3,09	2,70	2,47	2,31	2,20	2,11	2,04	1,98	1,93	1,77	1,68	1,62	1,48	1,40
	6,91	4,84	3,99	3,52	3,22	3,00	2,83	2,70	2,60	2,51	2,23	2,08	1,98	1,75	1,61
96	3,94	3,09	2,70	2,47	2,31	2,19	2,11	2,04	1,98	1,93	1,77	1,68	1,62	1,48	1,40
	6,91	4,83	3,99	3,52	3,21	3,00	2,83	2,70	2,60	2,51	2,23	2,07	1,97	1,74	1,61
116	3,92	3,07	2,68	2,45	2,29	2,18	2,09	2,02	1,96	1,91	1,75	1,66	1,60	1,46	1,37
	6,86	4,79	3,96	3,49	3,18	2,96	2,80	2,67	2,56	2,48	2,20	2,04	1,94	1,71	1,57
120	3,92	3,07	2,68	2,45	2,29	2,18	2,09	2,02	1,96	1,91	1,75	1,66	1,60	1,46	1,37
	6,85	4,79	3,95	3,48	3,17	2,96	2,79	2,66	2,56	2,47	2,19	2,03	1,93	1,70	1,56
145	3,91	3,06	2,67	2,43	2,28	2,16	2,07	2,00	1,94	1,90	1,74	1,64	1,58	1,44	1,35
	6,81	4,75	3,92	3,45	3,15	2,93	2,76	2,64	2,53	2,45	2,16	2,01	1,90	1,67	1,53
200	3,89	3,04	2,65	2,42	2,26	2,14	2,06	1,98	1,93	1,88	1,72	1,62	1,56	1,41	1,32
	6,76	4,71	3,88	3,41	3,11	2,89	2,73	2,60	2,50	2,41	2,13	1,97	1,87	1,63	1,48

**TABLA N° 6
DISTRIBUCIÓN χ^2**



Ejemplo:
Para 10 grados de libertad
 $P(\chi^2 > 15,987) = 0,10 = 10\%$

	0,995	0,990	0,975	0,950	0,900	0,750	0,500	0,250	0,100	0,050	0,025	0,010	0,005
1	0,000	0,000	0,001	0,004	0,016	0,102	0,455	1,323	2,706	3,841	5,024	6,635	7,879
2	0,010	0,020	0,051	0,103	0,211	0,575	1,386	2,773	4,605	5,991	7,378	9,210	10,597
3	0,072	0,115	0,216	0,352	0,584	1,213	2,366	4,108	6,251	7,815	9,348	11,345	12,838
4	0,207	0,297	0,484	0,711	1,064	1,923	3,357	5,385	7,779	9,488	11,143	13,277	14,860
5	0,412	0,554	0,831	1,145	1,610	2,675	4,351	6,626	9,236	11,070	12,833	15,086	16,750
6	0,676	0,872	1,237	1,635	2,204	3,455	5,348	7,841	10,645	12,592	14,449	16,812	18,548
7	0,989	1,239	1,690	2,167	2,833	4,255	6,346	9,037	12,017	14,067	16,013	18,475	20,278
8	1,344	1,646	2,180	2,733	3,490	5,071	7,344	10,219	13,362	15,507	17,535	20,090	21,955
9	1,735	2,088	2,700	3,325	4,168	5,899	8,343	11,389	14,684	16,919	19,023	21,666	23,589
10	2,156	2,558	3,247	3,940	4,865	6,737	9,342	12,549	15,987	18,307	20,483	23,209	25,188
11	2,603	3,053	3,816	4,575	5,578	7,584	10,341	13,701	17,275	19,675	21,920	24,725	26,757
12	3,074	3,571	4,404	5,226	6,304	8,438	11,340	14,845	18,549	21,026	23,337	26,217	28,300
13	3,565	4,107	5,009	5,892	7,042	9,299	12,340	15,984	19,812	22,362	24,736	27,688	29,819
14	4,075	4,660	5,629	6,571	7,790	10,165	13,339	17,117	21,064	23,685	26,119	29,141	31,319
15	4,601	5,229	6,262	7,261	8,547	11,037	14,339	18,245	22,307	24,996	27,488	30,578	32,801
16	5,142	5,812	6,908	7,962	9,312	11,912	15,338	19,369	23,542	26,296	28,845	32,000	34,267
17	5,697	6,408	7,564	8,672	10,085	12,792	16,338	20,489	24,769	27,587	30,191	33,409	35,718
18	6,265	7,015	8,231	9,390	10,865	13,675	17,338	21,605	25,989	28,869	31,526	34,805	37,156
19	6,844	7,633	8,907	10,117	11,651	14,562	18,338	22,718	27,204	30,144	32,852	36,191	38,582
20	7,434	8,260	9,591	10,851	12,443	15,452	19,337	23,828	28,412	31,410	34,170	37,566	39,997
21	8,034	8,897	10,283	11,591	13,240	16,344	20,337	24,935	29,615	32,671	35,479	38,932	41,401
22	8,643	9,542	10,982	12,338	14,041	17,240	21,337	26,039	30,813	33,924	36,781	40,289	42,796
23	9,260	10,196	11,689	13,091	14,848	18,137	22,337	27,141	32,007	35,172	38,076	41,638	44,181
24	9,886	10,856	12,401	13,848	15,659	19,037	23,337	28,241	33,196	36,415	39,364	42,980	45,559
25	10,520	11,524	13,120	14,611	16,473	19,939	24,337	29,339	34,382	37,652	40,646	44,314	46,928
26	11,160	12,198	13,844	15,379	17,292	20,843	25,336	30,435	35,563	38,885	41,923	45,642	48,290
27	11,808	12,879	14,573	16,151	18,114	21,749	26,336	31,528	36,741	40,113	43,195	46,963	49,645
28	12,461	13,565	15,308	16,928	18,939	22,657	27,336	32,620	37,916	41,337	44,461	48,278	50,993
29	13,121	14,256	16,047	17,708	19,768	23,567	28,336	33,711	39,087	42,557	45,722	49,588	52,336
30	13,787	14,953	16,791	18,493	20,599	24,478	29,336	34,800	40,256	43,773	46,979	50,892	53,672
40	20,707	22,164	24,433	26,509	29,051	33,660	39,335	45,616	51,805	55,758	59,342	63,691	66,766
50	27,991	29,707	32,357	34,764	37,689	42,942	49,335	56,334	63,167	67,505	71,420	76,154	79,490
60	35,534	37,485	40,482	43,188	46,459	52,294	59,335	66,981	74,397	79,082	83,298	88,379	91,952
70	43,275	45,442	48,758	51,739	55,329	61,698	69,334	77,577	85,527	90,531	95,023	100,425	104,215
80	51,172	53,540	57,153	60,391	64,278	71,145	79,334	88,130	96,578	101,879	106,629	112,329	116,321
90	59,196	61,754	65,647	69,126	73,291	80,625	89,334	98,650	107,565	113,145	118,136	124,116	128,299
100	67,328	70,065	74,222	77,929	82,358	90,133	99,334	109,141	118,498	124,342	129,561	135,807	140,169
110	75,550	78,458	82,867	86,792	91,471	99,666	109,334	119,608	129,385	135,480	140,917	147,414	151,948
120	83,852	86,923	91,573	95,705	100,624	109,220	119,334	130,055	140,233	146,567	152,211	158,950	163,648

BIBLIOGRAFÍA

- Daza, Jorge. (2006). *Estadística Aplicada con Microsoft Excel*. Lima, Perú: Grupo Editorial Megabyte
- Govinden, Lincoyán. (1985). *Introducción a la Estadística*. Bogotá, Colombia: Ed. McGraw Hill. Interamericana Editores S.A.
- Shao, Stephen. (1980). *Estadística para Economistas y Administradores de Empresas*. México DF: Ed. Herrero Hnos.
- Spiegel, Murray. (2000). *Estadística*. Serie de Compendios Schaum. México: Ed. McGraw-Hill
- Suárez, Mario. (2004). *Interaprendizaje Holístico de Matemática*. Ibarra, Ecuador: Imprenta GRÁFICAS PLANETA
- Suárez, Mario. (2004). *Hacia un Interaprendizaje Holístico de Álgebra y Geometría*. Ibarra, Ecuador: Imprenta GRÁFICAS PLANETA
- Suárez, Mario. & Tapia, Fausto. (2012). *Interaprendizaje de Estadística Básica*. Ibarra, Ecuador: Universidad Técnica de Norte
- Suárez, Mario. (2012). *Interaprendizaje de Probabilidades y Estadística Inferencial Empleando Excel, Winstats y Graph*. Ibarra, Ecuador: Imprenta M&V Gráfico.
- Webster, Allen, (2000), *Estadística Aplicada a los Negocios y a la Economía*, Ed. McGraw Hill.
- Suárez, Mario. (2013). *Distribuciones de Poisson Empleando Excel, Winstats y Geogebra*. Recuperado de <http://es.scribd.com/doc/158851173/DISTRIBUCION-DE-POISSON-CON-EXCEL-WINSTATS-Y-GEOGEBRA-pdf>
- Suárez, Mario. (2013). *Conceptos básicos de probabilidades y Estadística Inferencial*. Recuperado de <http://es.scribd.com/doc/129480693/Conceptos-basicos-de-Probabilidades-y-Estadistica-Inferencial>
- Suárez, Mario. (2013). *Conceptos básicos de estadística descriptiva e inferencial*. Recuperado de <http://www.monografias.com/trabajos96/conceptos-basicos-estadistica-descriptiva-e-inferencial/conceptos-basicos-estadistica-descriptiva-e-inferencial.shtml>
- Suárez, Mario. (2014). *Coefficiente de correlación de Karl Pearson Empleando Excel, Graph y GeoGebra*. Recuperado de <http://www.monografias.com/trabajos-pdf5/coeficiente-correlacion-pearson-excel-graph-y-geogebra/coeficiente-correlacion-pearson-excel-graph-y-geogebra.shtml>
- Suárez, Mario. (2014). *La recta de los mínimos cuadrados Empleando Excel y GeoGebra*. Recuperado de <http://www.monografias.com/trabajos-pdf5/recta-minimos-cuadrados-excel-y-geogebra/recta-minimos-cuadrados-excel-y-geogebra.shtml>
- Suárez, Mario. (2015). *Teoría de Conjuntos*. Recuperado de <http://es.scribd.com/doc/281247737/Teoria-de-Conjuntos#logout>
- Suárez, Mario. (2017). *Gráficas de control de la Calidad con Minitab*. Recuperado de <https://es.scribd.com/document/342041362/Graficas-de-Control-de-La-Calidad-Con-Minitab>

DATOS BIOGRÁFICOS DEL AUTOR

MARIO ORLANDO SUÁREZ IBUJÉS

Nació el 24 de marzo de 1978 en la ciudad de Ibarra, Imbabura-Ecuador. Sus primeros estudios los realizó en la Escuela Fiscal Mixta “Alejandro Pasquel Monge”, del Barrio “La Florida” de la ciudad de Ibarra, en la cual fue Abanderado del Estandarte de la Escuela, Abanderado del Pabellón Nacional y Mejor Egresado.

Sus estudios secundarios los realizó en la Unidad Educativa “Teodoro Gómez de la Torre” de la ciudad de Ibarra, en el cual fue el Mejor Alumno en Matemática durante los tres últimos años, Abanderado del Estandarte del Colegio y Mejor Egresado.

Sus estudios de tercer nivel los realizó en la Universidad Técnica del Norte (UTN), en la cual siendo el Mejor Egresado obtiene el título de Licenciado en Física y Matemática. Sus estudios de cuarto nivel los realizó en la UTN en convenio con la Asociación de Facultades Ecuatorianas de Filosofía y Ciencias de la Educación (AFEFC), en la cual obtiene el título de Magíster en Gerencia de Proyectos Educativos y Sociales.

EXPERIENCIA DOCENTE:

- Profesor de Geometría en la Escuela Alejandro Pasquel Monge (1998-2001)
- Profesor de Matemática en el Colegio Universitario UTN (2003-2004)
- Profesor de Matemática en la Academia Militar San Diego (2004-2008)
- Profesor de Matemática del Bachillerato General Unificado (BGU) y del Bachillerato Internacional (BI) en la Unidad Educativa Teodoro Gómez de la Torre (1998-2011)
- Profesor de Matemática en la Unidad Educativa Mariano Suárez Veintimilla (2011-2013)
- Profesor de Matemática del BGU y del BI en la Unidad Educativa Ibarra (2013-2017)
- Asesor Educativo en la Coordinación Zonal 1-Educación (2017-continúa)
- Profesor de Matemática y Estadística en la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas en la Universidad Técnica del Norte (2007-continúa)

LIBROS PUBLICADOS:

- Unidades para Producir Medios Instruccionales en Educación (coautor a los 24 años)
- Interaprendizaje Holístico de Matemática (autor)
- Hacia un Interaprendizaje Holístico de Álgebra y Geometría (autor)
- Matemática Recreativa (coautor)
- Interaprendizaje de Probabilidades y Estadística Inferencial Empleando Excel, Winstats y Graph (autor)
- Interaprendizaje de Estadística Básica (coautor)
- Probabilidades y Estadística empleando las TIC (autor)
- Matemática y sus aplicaciones empleando las TIC (coautor)
- Los Poliprismas y su aplicación en la enseñanza de la Matemática (Autor)

OBRAS ARTÍSTICAS INÉDITAS:

- Poliprisma 3.0
- Poliprisma 4.0
- Poliprisma 7.0
- Poliprisma 9.0
- Poliprisma 9.1

Se trata de rompecabezas tridimensionales bicolors integrados de partes prismáticas con su respectiva guía didáctica, los cuales tienen derecho de autor registrado en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI)

TEMAS DIDÁCTICOS PUBLICADOS EN INTERNET:

160 temas sobre Estadística, Aritmética, Álgebra, Geometría, Trigonometría, Lógica Proposicional, Teoría de Conjuntos, Cálculo Diferencial e Integral y planificaciones didácticas se encuentran publicados en:

- <http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/760>
- http://www.monografias.com/usuario/perfiles/mario_suarez_7/monografias
- <http://es.scribd.com/mariosuarezibujes>
- <https://docentesinnovadores.net/Usuarios/Ver/29591>
- <http://articulosmatematica.blogspot.com>






PRINCIPALES RECONOCIMIENTOS PROFESIONALES:

- Diploma de reconocimiento por el aporte a la investigación científica y tecnológica al haber contribuido con publicaciones científicas durante el año 2017. Universidad Técnica del Norte. Ecuador- Ibarra, año 2018.
- Estatuilla “Nöus” por ser el ganador del VI Concurso Nacional y I Internacional de Excelencia Educativa, premio otorgando por la Fundación para la Integración y Desarrollo de América Latina (FIDAL) y la Revista Edu@news. Ecuador-Quito, año 2014.
- Premio a la Excelencia Docente “Rita Lecumberri” en la categoría Educador Innovador, Premio Nacional otorgando por el Ministerio de Educación del Ecuador. Ecuador-Cuenca, año 2013.
- Diploma y placa de reconocimiento por la excelente trayectoria como docente investigador y destacado profesor universitario. Universidad Técnica del Norte. Asociación de Profesores de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas. Ecuador- Ibarra, año 2013.
- Estatuilla “El Pensador” al Mérito Académico. Asociación General de Profesores de la Universidad Técnica del Norte. Ecuador-Ibarra, año 2013.
- Diploma como Profesor tutor de estudiantes ganadores de Concursos Intercolegiales de Matemática. Academia Militar “San Diego”. Ecuador-Ibarra, año 2008.
- Diploma de Honor por haber aportado positivamente al desarrollo académico de Academia Militar “San Diego”. Academia Militar “San Diego”. Ecuador-Ibarra, año 2005.
- Diploma como Asesor de proyectos ganadores en la Primera Feria Binacional de Ciencia y Tecnología Ecuador-Colombia. Unidad Educativa Experimental “Teodoro Gómez de la Torre”. Ecuador-Ibarra, año 2005.
- Mejor Trabajo de Investigación. Certificado de la UTN-Centro Universitario de Investigación Científica y Tecnológica, por haber presentado la Tesis “Interaprendizaje de poliedros irregulares de bases paralelas empleando al Multiprisma” en la Casa Abierta. Ecuador- Ibarra, año 2003.
- Mención Especial en Ciencias Básicas (Matemática), Premio Nacional otorgado por la VI Feria de Ciencia y Tecnología por haber triunfado con el Proyecto Multiprisma (Un rompecabezas tridimensional bicolor integrado por partes prismáticas). Ecuador-Quito, año 2001.

MÉRITOS ESTUDIANTILES



LIBROS PUBLICADOS



MÉRITOS PROFESIONALES

